

【传染病学】

伤寒患者皮疹开始出现的时间是

- A. 热退以后
- B. 病程的第 1 天
- C. 病程的第 3 天
- D. 病程的第 7 天
- E. 日期不定

学员提问：为什么选 D?

答案及解析：本题答案为 D。

伤寒部分患者于病程第 7~14 日皮肤出现暗红色小斑丘疹，称为玫瑰疹，散在分布于前胸和上腹部。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

【方剂学】

血府逐瘀汤的组成药物除“桃红四物”和甘草外，其余的是

- A. 柴胡、桔梗、枳壳、牛膝
- B. 官桂、干姜、蒲黄、五灵脂
- C. 香附、牛膝、没药、五灵脂
- D. 麝香、没药、葱白、鲜生姜
- E. 乌药、香附、枳壳、延胡索

学员提问：为什么选 A?

答案及解析：本题答案为 A。

血府逐瘀汤组成是桃仁、红花、当归、生地、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草。方歌：血府逐瘀生地桃，红花当归草赤芍；桔梗枳壳柴芍膝，血化下行免作劳。桃红四物汤的组成是熟地、当归、白芍、川芎、桃仁、红花。【医学教育网原创】故本题答案选 A。

【内科学】

原发免疫性血小板减少症血小板破坏的主要场所是

- A. 脾脏
- B. 外周血
- C. 骨髓

- D. 肝脏
- E. 血管内

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

脾是原发免疫性血小板减少症产生血小板相关抗体的主要场所, 同时使巨噬细胞介导的血小板破坏增多。所以, 原发免疫性血小板减少症血小板破坏的主要场所是脾脏。【医学教育网原创】故本题答案选 A。

【针灸学】

若辨证为热痹, 应对证选用

- A. 肝俞、太冲
- B. 膈俞、血海
- C. 肾俞、关元
- D. 大椎、曲池
- E. 合谷、内庭

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

痹证的处方

主穴 阿是穴、局部经穴

配穴 行痹配膈俞、血海; 痛痹配肾俞、关元; 着痹配阴陵泉、足三里; 热痹配大椎、曲池。另可根据疼痛的部位循经配穴。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

【诊断学基础】

管癌 X 线钡剂造影可见

- A. 黏膜皱襞明显增宽、迂曲
- B. 管腔狭窄
- C. 肿瘤区蠕动消失
- D. 形如硬管状
- E. 以上都不是

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

食管癌 X 线钡剂造影可见: ①黏膜皱襞改变: 由于肿瘤破坏黏膜层, 使正常皱襞消失、

中断、破坏, 形成表面杂乱的不规则影像。②管腔狭窄。③腔内充盈缺损。④不规则的龛影, 早期较浅小, 较大者表现为长径与食管长轴一致的长形龛影。⑤受累食管呈局限性僵硬。【医学教育网原创】故本题答案选 B。

