

号。关注本公众号，好处多多：



2021年中西医执业医师期中模考测评卷 600题

第一单元

一、A1

1. 天地万物相互联系的中介是

- A. 天气
- B. 地气
- C. 精气
- D. 阴阳
- E. 阳气

【正确答案】C

【答案解析】精气是天地万物相互联系的中介。精气分阴阳，以成天地。天地交感，以生万物。天地万物相互联系，相互作用，天地万物之间充斥着无形之精气，并相互作用，且这些无形之精气还能渗入于有形的实体，并与已构成有形实体的精气进行着各种形式的交换和感应，因而，精气又是天地万物之间相互联系、相互作用的中介性物质。其精气的中介作用，主要表现为维系着天地万物之联系，并使万物得以相互感应。

2. 精气学说的基本内容包括

- A. 精气是构成宇宙的本原
- B. 精气的运动与变化
- C. 精气是天地万物的中介
- D. 天地精气化生为人
- E. 以上皆是

【正确答案】E

【答案解析】精气学说的基本内容包括：精气是构成宇宙的本原；精气的运动与变化；精气是天地万物的中介；天地精气化生为人。

3. “益火之源，以消阴翳”指的是

- A. 阴病治阳
- B. 阳病治阴
- C. 热者寒之
- D. 寒者热之
- E. 阳中求阴

【正确答案】A

【答案解析】阳虚则生内寒，出现虚寒证，系阳虚无以制阴而致阴盛，须用“益火（目的或者根本）之源，以消阴翳（临床上虚寒证属阴的范畴）”，补阳以制阴，《内经》称之为“阴病治阳”。

4. 五行中具有“曲直”特性的是

- A. 金
- B. 水
- C. 木
- D. 火
- E. 土

【正确答案】C

【答案解析】《尚书·洪范》言：“水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡”是对五行特性的经典性概括。

5. 五行关系中“见肝之病，知肝传脾”是指

- A. 木生土
- B. 木克土
- C. 木侮土
- D. 木乘土
- E. 木疏土

【正确答案】D

【答案解析】《难经》说的“见肝之病，则知肝当传之于脾，故先实其脾气”和《金匮要略》说的“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”，是指根据五行学说指导控制疾病的传变。肝的病变传及于脾，属于木乘土。

6. 五行中，“土”的“所胜”之行是

- A. 木
- B. 火
- C. 土
- D. 金
- E. 水

【正确答案】E

【答案解析】“我克者为我之所胜，克我者为我之所不胜”。土克水，故土之“所胜”为水。

7. 具有“主治节”功能的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【正确答案】D

【答案解析】肺主治节：治节，即治理调节。肺主治节是指肺气具有治理调节肺之呼吸及全身气、血、水的作用。是对肺的主要生理机能的高度概括。

8. 具有“喜燥恶湿”生理特性的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾

D. 肺

E. 肾

【正确答案】 C

【答案解析】脾具有运化水饮的生理功能,脾气健旺,运化水饮正常,才能将水液布散全身,无痰饮水湿的停聚。而脾气升运的条件之一就是脾体干燥而不被痰饮水湿所困。故脾喜燥而恶湿。

9. 具有“主神明”生理特性的脏是

A. 肝

B. 心

C. 脾

D. 肺

E. 肾

【正确答案】 B

【答案解析】心主神明,指心脉以通畅为主,心神以清明为要。

10. 促进机体滋润、宁静、制约阳热功能的物质是

A. 肾精

B. 肾气

C. 肾阴

D. 肾阳

E. 肾血

【正确答案】 C

【答案解析】肾阴是肾气中具有凉润、宁静、抑制等作用的部分。肾阴与肾阳协调共济,则合化为冲和之肾气,推动和调控肾的各种功能活动。

11. 化生“天癸”的物质基础是

A. 肝血

B. 肾精

C. 脾气

D. 肺阴

E. 心血

【正确答案】 B

【答案解析】天癸,是肾精肾气充盈到一定程度时体内出现的一种精微物质,有促进生殖器官发育成熟、女子月经来潮及排卵、男子精气溢泻,因而具备生殖能力的作用。

12. 戴阳证患者的表现为

A. 面黄隐隐

B. 面色红赤

C. 面色淡白

D. 面色淡青

E. 面色苍白,颧颊部嫩红如妆

【正确答案】 E

【答案解析】久病重病患者面色苍白,却颧颊部嫩红如妆,游移不定者,属戴阳证。

13. 面色淡黄,枯槁无华称为

A. 黄胖

B. 萎黄

C. 阴黄

- D. 阳黄
- E. 黄疸

【正确答案】 B

【答案解析】 (1) 面色淡黄, 枯槁无华, 称“萎黄”。常见于脾胃气虚, 气血不足者。

(2) 面色淡黄而虚浮, 称为“黄胖”。属脾气虚弱, 湿邪内盛。

(3) 若面目一身俱黄, 称为“黄疸”。黄而鲜明如橘子色者, 属“阳黄”, 乃湿热熏蒸为患; 黄而晦暗如烟熏者, 属“阴黄”, 乃寒湿郁滞所致。

14. 假神最主要的病理机制是

- A. 气血不足, 精津亏损
- B. 机体阴阳失调
- C. 脏腑虚衰, 功能低下
- D. 阴盛于内, 格阳于外
- E. 精气衰竭, 虚阳外越

【正确答案】 E

【答案解析】 假神, 是垂危病人出现的精神暂时好转的假象, 又称回光返照。如久病、重病者, 突然精神转佳, 目光转亮, 言语不休, 声音洪亮, 面部颧赤如妆, 食欲增强等。因为脏腑精气极度衰竭, 正气将脱, 阴不敛阳, 虚阳外越, 阴阳即将离决所致, 古人比作“回光返照”或“残灯复明”, 常是危重病人临终前的征兆。阴盛于内, 格阳于外, 是格阳证, 不属于假神。答案应选 E。

15. 小儿食指络脉浅淡而纤细者属

- A. 表证
- B. 里证
- C. 虚证
- D. 实证
- E. 寒证

【正确答案】 C

【答案解析】 食指络脉浅淡而纤细者, 多属虚证。因气血不足, 脉络不充所致。食指络脉色深暗者, 多属实证。因邪正相争, 气血壅滞所致。

16. 舌苔脱落处舌面不光滑, 仍有新生苔质颗粒者称

- A. 花剥苔
- B. 地图舌
- C. 镜面舌
- D. 光滑舌
- E. 类剥苔

【正确答案】 E

【答案解析】 类剥苔: 剥脱处并不光滑, 似有新生颗粒。花剥苔: 舌苔多处剥脱, 剥脱处光滑无苔, 余处斑斑驳驳地残存舌苔, 界限明显。地图舌: 舌苔不规则地大片脱落, 边缘厚, 舌苔界限清楚, 形似地图。光剥苔: 舌苔全部脱落, 舌面光洁如镜(又称为镜面舌或光滑舌)。根据题干要求, 最佳的选项是 E。

17. 舌质胖大淡嫩并有齿痕多见于

- A. 血虚
- B. 气虚
- C. 肾虚
- D. 寒湿壅盛

E. 湿热痰浊

【正确答案】 D

【答案解析】 舌淡胖大润而有齿痕：多属寒湿壅盛，或阳虚水湿内停。

18. 喘证的临床表现应除外哪一项

- A. 呼吸困难
- B. 鼻翼煽动
- C. 张口抬肩
- D. 喉中痰鸣
- E. 难以平卧

【正确答案】 D

【答案解析】 喘即气喘，指呼吸困难、急迫，张口抬肩，甚至鼻翼煽动，难以平卧。常由肺、心病变及白喉、急喉风等导致，而辨证还与脾、肾有关。喘有虚实之分。喉中痰鸣是哮证的临床表现，而非喘证的临床表现。故此题的最佳选项是 D。

19. 突发耳鸣，声大如潮，按之不减者属

- A. 肾精亏损
- B. 阴虚火旺
- C. 肝肾阴虚
- D. 肝胆火盛
- E. 肝血不足

【正确答案】 D

【答案解析】 突发耳鸣，声大如雷，按之鸣声不减，或新病暴聋者，多属实证。可因肝胆火盛、肝阳上亢、痰火壅结、气血瘀阻、风邪上袭，或药毒损伤耳窍等所致。

20. 自汗的病机是

- A. 气虚
- B. 阴虚
- C. 血虚
- D. 痰盛
- E. 气滞

【正确答案】 A

【答案解析】 自汗指患者经常日间汗出，活动后尤甚的症状。兼见畏寒肢冷、神疲、乏力等症，多见于气虚证和阳虚证。因阳气亏虚，不能固护肌表，玄府不密，津液外泄所致。故此题的最佳选项是 A。

21. 厌食油腻，脘闷呕恶，便溏不爽多见于

- A. 湿热蕴脾
- B. 食滞胃脘
- C. 肝胆湿热
- D. 妊娠反应
- E. 以上都不是

【正确答案】 A

【答案解析】 厌食指患者厌恶食物，或恶闻食味的症状。

(1) 厌食，兼脘腹胀满，暖气酸腐，舌苔厚腻者，多属食滞胃脘。

(2) 厌食油腻之物，兼脘腹痞闷，呕恶便溏，肢体困重者，多属湿热蕴脾。

(3) 厌食油腻厚味，伴胁肋胀痛灼热，口苦泛呕，身目发黄者，为肝胆湿热。

22. 以神疲、乏力、气短、脉虚为主要表现的是

- A. 气陷证
- B. 气虚证
- C. 气脱证
- D. 气滞证
- E. 气不固证

【正确答案】 B

【答案解析】 气虚证辩证要点: 病体虚弱, 以神疲、乏力、气短、脉虚为主要表现。

23. 以下哪项不是沉降药物的作用

- A. 止咳平喘
- B. 收敛固涩
- C. 平肝潜阳
- D. 开窍
- E. 镇惊安神

【正确答案】 D

【答案解析】 一般而言, 发表、透疹、升阳、涌吐、开窍等药具有升浮作用, 收敛固涩、泻下、利水、潜阳、镇惊安神、止咳平喘、止呕等药具有沉降作用。

24. 确定药物寒热、温凉的依据是

- A. 神农氏尝百草的体会
- B. 《素问》“寒者热之, 热者寒之”
- C. 《本经》“疗寒以热药, 疗热以寒药”
- D. 药物作用于人体的反应
- E. 口尝的滋味

【正确答案】 D

【答案解析】 药物的寒热温凉是由药物作用于人体所产生的不同反应和所获得的不同疗效而总结出来的, 它与所治疗疾病的性质是相对而言的。

25. 生姜能减轻或清除生半夏的毒性, 这种配伍关系称为

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相杀
- D. 相恶
- E. 相反

【正确答案】 C

【答案解析】 相杀: 就是一种药物能够减轻或消除另一种药物的毒副作用。如生姜能减轻或消除生半夏和生南星的毒性或副作用, 所以说生姜杀生半夏和生南星的毒。

26. 既能宣通鼻窍, 又能发散风寒, 祛风湿, 止痛的药物是

- A. 独活
- B. 羌活
- C. 防风
- D. 苍耳子
- E. 辛夷

【正确答案】 D

【答案解析】 苍耳子功效: 发散风寒, 通鼻窍, 祛风湿, 止痛。

27. 下列哪组药物是辛凉解表药

- A. 薄荷、桑叶、荆芥

- B. 蝉蜕、柴胡、菊花
- C. 柴胡、淡豆豉、防风
- D. 牛蒡子、苍耳子、升麻
- E. 蔓荆子、辛夷、葛根

【正确答案】B

【答案解析】解表药根据其性味和临床功效的不同，可分为发散风寒药和发散风热药两类。发散风寒药多属辛温，故又名辛温解表药，适用于风寒表证，代表药物有麻黄、桂枝、荆芥、防风等；发散风热药多属辛凉，故又名辛凉解表药，适用于风热表证，代表药物有柴胡、葛根、牛蒡子、薄荷、蝉蜕、菊花等。

28. 既能发汗解表，又能温中止呕，温肺止咳的药物是

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 紫苏
- D. 生姜
- E. 白芷

【正确答案】D

【答案解析】生姜功效：解表散寒，温中止呕，温肺止咳。

29. 既能清热燥湿，又能退虚热除蒸，解毒疗疮的药物是

- A. 银柴胡
- B. 苦参
- C. 黄芩
- D. 黄连
- E. 黄柏

【正确答案】E

【答案解析】黄柏功效：清热燥湿，泻火解毒，除骨蒸。本品主入肾经而善泻相火、退骨蒸，用治阴虚火旺，潮热盗汗、腰酸遗精，常与知母相须为用。

30. 夏枯草的功效是

- A. 清心火，利小便
- B. 清热泻火，明目，散结消肿
- C. 清热泻火，润肠通便
- D. 清肺热，止咳喘
- E. 清胃热，降血压

【正确答案】B

【答案解析】夏枯草功效：清热泻火，明目，散结消肿。

31. 治疗肝经风热，目赤肿痛宜选用

- A. 柴胡、桑叶
- B. 牛蒡子、葛根
- C. 蝉蜕、升麻
- D. 桑叶、夏枯草
- E. 菊花、白芷

【正确答案】D

【答案解析】桑叶、夏枯草苦寒入肝经能泻肝热，且甘润益阴以明目尤其适合肝火上炎的目赤。

夏枯草

性能: 辛、苦, 寒。归肝、胆经。

功效: 清热泻火, 明目, 散结消肿。

应用: (1) 目赤肿痛, 头痛眩晕, 目珠夜痛。本品苦寒主入肝经, 善泻肝火以明目。用治肝火上炎, 目赤肿痛, 可配桑叶、菊花、决明子等药用。(2) 瘰疬, 癭瘤。(3) 乳痈肿痛。

桑叶

功效: 疏散风热, 清肺润燥, 平抑肝阳, 清肝明目。

应用: (1) 风热感冒, 温病初起。(2) 肺热咳嗽、燥热咳嗽。(3) 肝阳上亢。(4) 目赤昏花。(5) 血热妄行之咯血、吐血、衄血。

32. 可用于养血安胎的药物是

- A. 狗脊
- B. 砂仁
- C. 乌梢蛇
- D. 五加皮
- E. 桑寄生

【正确答案】E

【答案解析】桑寄生功效: 祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 安胎。用于治疗崩漏经多, 妊娠漏血, 胎动不安。能补肝肾, 养血而固冲任, 安胎。故此题的正确选项是E。

33. 芳香化湿药的主治证是

- A. 水湿内停
- B. 水湿泄泻
- C. 湿痹拘挛
- D. 湿疹湿疮
- E. 湿阻中焦

【正确答案】E

【答案解析】芳香化湿药辛香温燥, 主入脾、胃经, 能促进脾胃运化, 消除湿浊, 解除因湿浊引起的脾胃气滞, 主治湿浊内阻, 脾为湿困, 运化失常所致的脘腹痞满、呕吐泛酸、大便溏薄、食少体倦、舌苔白腻等症, 此外, 有芳香解暑之功, 也可用于湿温、暑湿等证。因此根据题干要求, 最符合的选项是E。

34. 对传染病预防起关键性作用的是

- A. 尽早隔离患者
- B. 儿童计划免疫
- C. 必要的空气消毒
- D. 坚决捕杀有害动物
- E. 改善营养、锻炼身体

【正确答案】B

【答案解析】儿童计划免疫对传染病预防起关键性的作用。

35. 病原体侵入机体后, 引起机体发生免疫应答, 同时通过病原体本身的作用或机体的变态反应, 导致组织损伤, 引起病理改变与临床表现。此种表现属于

- A. 隐性感染
- B. 显性感染
- C. 重复感染
- D. 潜伏性感染
- E. 机会性感染

【正确答案】B

【答案解析】显性感染又称临床感染,即传染病发病。感染后不但引起机体免疫应答,还导致组织损伤,引起病理改变和临床表现。

36. 艾滋病期消化系统最常见的病原菌为

- A. 白色念珠菌
- B. 结核杆菌
- C. 疱疹病毒
- D. 隐孢子虫
- E. 肺孢子菌

【正确答案】D

【答案解析】消化系统并发症:念珠菌(假丝酵母菌)食道炎,巨细胞病毒性食道炎、肠炎,沙门菌、痢疾杆菌、空肠弯曲菌及隐孢子虫性肠炎。其中肠道隐孢子虫感染较为常见。

37. 急性肝炎出现黄疸最早见于

- A. 口腔黏膜
- B. 巩膜
- C. 四肢皮肤
- D. 面部皮肤
- E. 手掌脚掌皮肤

【正确答案】B

【答案解析】急性肝炎继尿色加深之后,巩膜首先出现黄染,继及皮肤,多于数日至2周达高峰,随后逐渐下降。

38. 流行性出血热的早期诊断依据是

- A. 鼠类接触史
- B. 全身感染中毒症状
- C. “三痛”和“三红”征
- D. 特异性IgM抗体滴度升高
- E. 异型淋巴细胞增多

【正确答案】D

【答案解析】流行性出血热发病第2日即能检出特异性抗体IgM,为临床常用的早期诊断依据。

39. 狂犬病患者呼吸变慢及不整,心搏微弱,神志不清,此期持续时间为

- A. 1~3日
- B. 2~4日
- C. 3~4日
- D. 4~7日
- E. 6~18小时

【正确答案】E

【答案解析】痉挛减少或停止,患者逐渐安静,出现弛缓性瘫痪,尤以肢体软瘫为多见。呼吸变慢及不整,心搏微弱,神志不清,最终因呼吸麻痹和循环衰竭而死亡。本期持续6~18小时。

40. 流行性出血热引起急性肾功能不全的最主要原因是

- A. 肾小球滤过率下降和缺血性肾小管变性、坏死
- B. 肾小球微血栓形成和缺血性坏死
- C. 病毒直接破坏肾小管
- D. 肾间质水肿压迫肾小管

E. 肾素、血管紧张素的激活

【正确答案】 A

【答案解析】 流行性出血热的肾脏损害与肾血流量不足、免疫复合物沉积、肾间质水肿致使肾小管被压受阻、肾素、血管紧张素 II 的激活等因素有关, 致使肾小球滤过率下降, 肾小管重吸收功能受损。

41. 乙脑最常见和最早出现的症状是

- A. 高热
- B. 头痛
- C. 呕吐
- D. 颈项强直
- E. 意识障碍

【正确答案】 B

【答案解析】 头痛是乙脑最常见和最早出现的症状, 疼痛部位不定。

42. 人禽流感早期发热体温大多持续在

- A. 37℃以上
- B. 38℃以上
- C. 39℃以上
- D. 40℃以上
- E. 41℃以上

【正确答案】 C

【答案解析】 人禽流感急性起病, 早期表现类似流感。主要为发热, 体温大多持续在 39℃ 以上。

43. 目前我国流脑流行的主要菌群是

- A. A 群
- B. B 群和 C 群
- C. D 群
- D. X 群和 Y 群
- E. Z 群

【正确答案】 A

【答案解析】 流脑以 A、B、C 三群最常见。在我国长期流行菌群为 A 群, B 群和 C 群散发。

44. 细菌性痢疾传播途径是

- A. 呼吸道传播
- B. 接触传播
- C. 消化道传播
- D. 虫媒传播
- E. 血液传播

【正确答案】 C

【答案解析】 细菌性痢疾主要经粪-口途径传播。

45. 关于治疗霍乱补液原则下列哪项是错误的

- A. 轻、中型患者可予以口服补液
- B. 中型患者 24 小时补液量为 4000~8000ml
- C. 静脉补液以 5: 4: 1 溶液
- D. 重型患者治疗应早期快速静脉补液
- E. 重型患者应积极补钾

【正确答案】 E

【答案解析】 霍乱补液的原则是早期、快速、足量，先盐后糖，先快后慢，纠酸补钙，见尿补钾。

46. 怀疑流脑时为明确诊断应做

- A. 血常规检查
- B. 头颅 X 光片
- C. 头颅 CT
- D. 脑脊液检查
- E. 使用抗菌药物

【正确答案】 D

【答案解析】 脑脊液检查：明确诊断的重要方法，脑脊液压力升高，外观混浊，白细胞明显增高，蛋白质增高，而糖及氯化物明显降低。

47. 细菌性痢疾的主要预防措施是

- A. 隔离及治疗现症患者
- B. 流行季节预防服药
- C. 及时发现、治疗带菌者
- D. 口服痢疾活菌苗
- E. 切断传播途径

【正确答案】 E

【答案解析】 菌痢的预防应采用以切断传播途径为主的综合预防措施。

48. 关于结核病的叙述，错误的是

- A. 除少数可急性起病外，临床上多呈慢性过程
- B. 痰中排菌者称为传染性肺结核
- C. 以肺结核最为常见
- D. 是由结核分枝杆菌引起的慢性感染性疾病
- E. 临床表现为高热、咳痰、咯血

【正确答案】 E

【答案解析】 肺结核患者多数为长期低热，而不是高热。

49. 试管凝集试验阳性的判定标准是滴度大于或等于

- A. 1:500++
- B. 1:50++
- C. 1:50+++
- D. 1:100+
- E. 1:100++

【正确答案】 E

【答案解析】 试管凝集试验：滴度为 1:100(++)及以上；或病程 1 年以上，滴度 1:50(++)及以上；或半年内有布鲁菌疫苗接种史，滴度达 1:100(++)及以上者为阳性。

50. 空洞性肺结核有巨大空洞时的听诊时可闻及

- A. 带金属调的空瓮音
- B. 局限性哮鸣音
- C. 呼吸音降低
- D. 细湿啰音
- E. 支气管呼吸音

【正确答案】 A

【答案解析】巨大空洞可闻及带金属调的空瓮音。

51. 血浆药物浓度下降一半所需的时间指的是

- A. 生物利用度
- B. 血浆半衰期
- C. 稳态血浓度
- D. 治疗指数
- E. 坪值

【正确答案】 B

【答案解析】血药浓度下降一半所需要的时间,称为血浆半衰期,用 $t_{1/2}$ 表示。

52. 阿托品阻断虹膜环状肌上M受体,使环状肌松弛,瞳孔扩大,属于

- A. 药物效应
- B. 量效关系
- C. 药物效能
- D. 药物强度
- E. 药物的选择性

【正确答案】 A

【答案解析】药物作用也称药物效应,药物效应是指药物原发作用引起的机体机能或形态的改变。如阿托品对眼的作用是阻断虹膜环状肌上的M受体,其效应是阻断受体后产生的环状肌松弛及瞳孔扩大。药物作用有时也称生物活性或药物反应。

53. 毛果芸香碱属于哪类药物

- A. M受体阻滞药
- B. M受体兴奋药
- C. 抗胆碱酯酶药
- D. 阿托品类药物
- E. 胆碱酯酶复活药

【正确答案】 B

【答案解析】毛果芸香碱为M受体兴奋(激动)药,又称节后拟胆碱药,主要激动M受体,产生M样作用。

54. 有机磷酸酯类中毒常见的死亡原因主要是

- A. 心力衰竭
- B. 感染性休克
- C. 呼吸麻痹
- D. 败血症
- E. 急性肾功能衰竭

【正确答案】 C

【答案解析】有机磷酸酯类轻度中毒以M样症状为主;中度中毒时除M样症状加重外,还出现N样症状;严重中毒者除M样和N样症状外,还出现中枢神经系统症状。死亡原因主要是呼吸麻痹。

55. 青霉素过敏性休克,经地塞米松等一系列治疗措施后,还应给予下列哪种药物抢救

- A. 肾上腺素
- B. 去甲肾上腺素
- C. 异丙肾上腺素
- D. 多巴胺
- E. 间羟胺

【正确答案】A

【答案解析】药物或输液等引起的过敏性休克，表现为心肌收缩力减弱，小血管扩张和毛细血管通透性增强，循环血量降低，血压下降，同时伴有支气管痉挛及黏膜水肿，出现呼吸困难等症状。肾上腺素激动 α 受体，收缩小动脉和毛细血管，消除黏膜水肿，激动 β 受体，改善心功能，升高血压，缓解支气管痉挛，减少过敏介质释放，可迅速缓解过敏性休克的临床症状，为治疗过敏性休克的首选药。

56. 去甲肾上腺素的不良反应是

- A. 高血糖
- B. 脑溢血
- C. 高血压
- D. 阵发性室上性心动过速
- E. 局部组织缺血坏死

【正确答案】E

【答案解析】去甲肾上腺素的不良反应有局部组织缺血坏死、急性肾功能衰竭、停药后血压下降。

57. 酚妥拉明治疗休克常与下列哪味药物合用

- A. 去甲肾上腺素
- B. 肾上腺素
- C. 糖皮质激素
- D. 多巴胺
- E. 异丙肾上腺素

【正确答案】A

【答案解析】酚妥拉明能扩张血管，降低外周阻力，增加心输出量，故可改善休克时的内脏血液灌注，解除微循环障碍，并能降低肺循环阻力，防止肺水肿的发生，但用药前必须补足血容量。目前主张与NA合用，以对抗NA兴奋 α 受体的收缩血管的作用，保留其 β 受体兴奋心脏、增加血输出量的作用，也可防止酚妥拉明扩张血管过度，血压过低。

58. 有关地西洋的叙述，错误的是

- A. 抗焦虑作用时间长，是临床上常用的抗焦虑药
- B. 是一种长效催眠药物
- C. 抗癫痫作用强，可用于治疗癫痫小发作
- D. 在临床上可用于治疗中枢性肌肉强直
- E. 抗惊厥作用强，可用于治疗破伤风

【正确答案】C

【答案解析】地西洋是长效苯二氮（卓）类药物，小于镇静剂量即可选择性地缓和焦虑患者的精神紧张、忧虑、恐惧等症状；适用于睡眠持续障碍者；能缓解、消除惊厥或癫痫症状，用于小儿高热、破伤风、子痫和药物中毒所致的惊厥；能够缓解由中枢神经系统病变引起的肌张力增强（中枢性肌肉强直）。地西洋静脉注射用于癫痫持续状态起效快、安全性大，是首选药物，故C是错误的。

59. “冬眠合剂”是指下述哪一组药物

- A. 苯巴比妥+异丙嗪+吗啡
- B. 氯丙嗪+异丙嗪+哌替啶
- C. 苯巴比妥+氯丙嗪+吗啡
- D. 氯丙嗪+异丙嗪+吗啡
- E. 氯丙嗪+阿托品+哌替啶

【正确答案】 B

【答案解析】 氯丙嗪、异丙嗪和哌替啶合用,组成冬眠合剂,用于严重感染、高热惊厥及休克等病症的辅助治疗。

60. 减少左旋多巴的用量和提高左旋多巴的疗效,加快左旋多巴起效时间的药物是

- A. 苯海索
- B. 溴隐亭
- C. 金刚烷胺
- D. 卡比多巴
- E. 苯扎托品

【正确答案】 D

【答案解析】 卡比多巴有较强的脱羧酶抑制作用,和左旋多巴合用,可减少左旋多巴在外周组织的脱羧作用,使较多的左旋多巴进入中枢而发挥作用。不仅可减少左旋多巴的用量和提高左旋多巴的疗效,加快左旋多巴起效时间,还可明显减轻和防止左旋多巴外周的副作用。

61. 下列关于阿司匹林作用的描述,错误的是

- A. 具有解热作用
- B. 减少出血倾向
- C. 中毒剂量呼吸兴奋
- D. 可出现耳鸣、眩晕
- E. 减少炎症组织 PG 生成

【正确答案】 B

【答案解析】 阿司匹林能抑制血小板聚集,延长出血时间,大剂量(5g/d以上)或长期服用,还能抑制凝血酶原形成,延长凝血酶原时间。

62. 下列疾病中,不属于氢氯噻嗪适应证的是

- A. 尿崩症
- B. 糖尿病
- C. 轻度高血压
- D. 心源性水肿
- E. 特发性高钙尿症

【正确答案】 B

【答案解析】 氢氯噻嗪适用于轻、中度水肿,是心性水肿的首选药,适用于轻、中度高血压,尿崩症及特发性高钙尿症和肾结石。

63. 左心室肥厚并伴有阵发性室上性心律失常,宜选择下列何种降压药

- A. 吗啡
- B. 利血平
- C. 尼莫地平
- D. 维拉帕米
- E. 硝苯地平

【正确答案】 D

【答案解析】 维拉帕米是钙通道阻滞药,是阵发性室上性心动过速急性发作的首选药,可逆转高血压患者的心肌肥厚。

64. 钙通道阻滞剂的作用特点叙述错误的是

- A. 降压时不减少心、脑、肾的血流
- B. 逆转高血压患者的心肌肥厚,但比 ACEI 好
- C. 有排钠利尿作用,与直接扩血管药合用

- D. 一般不影响脂质代谢及葡萄糖耐量
E. 高血压合并心肌梗死患者长期使用维拉帕米可降低死亡率

【正确答案】 B

【答案解析】 钙通道阻滞剂作用特点为：①降压时不减少心、脑、肾的血流，尼莫地平、尼索地平还能增加脑、冠脉血流。②逆转高血压患者的心肌肥厚，但效果不如ACEI，高血压合并心肌梗死患者长期使用维拉帕米可降低死亡率。③有排钠利尿作用，与直接扩血管药合用，在降压时不引起水钠潴留。④一般不影响脂质代谢及葡萄糖耐量，依拉地平、尼群地平还可轻度提高HDL，代表药物是硝苯地平。

65. 治疗强心苷中毒引起的快速型心律失常的最佳药物是

- A. 胺碘酮
B. 普萘洛尔
C. 苯妥英钠
D. 利多卡因
E. 奎尼丁

【正确答案】 C

【答案解析】 对于快速型心律失常，如室性早搏、室性心动过速，应及时补钾，轻者可口服氯化钾，重者可在心电图及血钾监测下缓慢静脉滴注氯化钾（肾功能不全、高钾血症、严重房室传导阻滞者不宜用钾盐），并可选用苯妥英钠、利多卡因等抗心律失常药。

苯妥英钠治疗室性心律失常，对强心苷中毒所致室性心律失常疗效显著；治疗癫痫强直-阵挛发作和局限性发作的首选药；还用于周围神经痛。

66. 硝酸酯类与 β 受体阻断药联合应用抗心绞痛的药理依据是

- A. 缩短射血时间
B. 消除反射性心率加快
C. 降低室壁肌张力
D. 作用机制不同产生协同作用
E. 以上都是

【正确答案】 E

【答案解析】 硝酸酯类抗心绞痛的作用机制有：降低心肌耗氧量、改善缺血区心肌供血； β 受体阻滞药抗心绞痛的作用机制是：降低心肌耗氧量、改善心肌代谢、增加缺血区血液供应、促进氧合血红蛋白解离。

硝酸酯类扩张血管后血压降低所致的反射性心率加快和心肌收缩力增加，可增加心肌耗氧量，心率加快所致的心脏舒张期冠脉灌注时间缩短不利于心绞痛治疗，合用 β 受体阻滞药可对抗之。

应用 β 受体阻滞药后，其 β 受体的阻断作用可使心率减慢，心脏舒张期延长而增加冠脉灌注时间；抑制心肌收缩力，减少心脏做功，降低心肌耗氧量而发挥抗心绞痛作用。但心肌收缩力减弱，使射血时间延长，心排血不完全，左室舒张末压升高，心室容积扩大又可增加心肌耗氧量，与硝酸酯类药物合用可提高疗效，减少不良反应。

67. 肝素过量引起的自发性出血的对抗药是

- A. 氨甲环酸
B. 维生素K
C. 氨甲苯酸
D. 硫酸鱼精蛋白
E. 以上都不是

【正确答案】 D

【答案解析】自发性出血表现为皮肤瘀点或瘀斑、血肿、咯血、血尿、呕血、便血以及颅内出血等，严重出血需缓慢静脉注射硫酸鱼精蛋白解救，1mg 硫酸鱼精蛋白约中和 1mg 肝素，每次用量不能超过 50mg。

68. 治疗十二指肠溃疡，首选的药物是

- A. 雷尼替丁
- B. 阿司咪唑
- C. 阿托品
- D. 胃舒平
- E. Al(OH)₃ 凝胶

【正确答案】A

【答案解析】雷尼替丁 H₂受体阻滞药，能选择性阻断胃壁细胞 H₂受体抑制胃酸分泌，拮抗组胺引起的胃酸分泌。对基础胃酸、夜间胃酸和各种刺激引起的胃酸分泌均有抑制，还可减少胃蛋白酶分泌。对促胃液素、胰液、胆汁的分泌和胃的排空速率无影响。且选择性更高，抑制肝药酶作用较轻。可缓解溃疡症状，促进溃疡愈合，减少溃疡复发。

69. 氨茶碱平喘作用的主要机制是

- A. 加强支气管反应性
- B. 抑制腺酸环化酶，降低平滑肌细胞内 cAMP 浓度
- C. 激活腺酸环化酶，增加平滑肌细胞内 cAMP 浓度
- D. 激活磷酸二酯酶活性，增加平滑肌细胞内 cGMP 浓度
- E. 抑制磷酸二酯酶活性，升高气道平滑肌细胞内 cAMP 水平

【正确答案】E

【答案解析】氨茶碱舒张支气管的作用机制，主要是抑制磷酸二酯酶活性，升高气道平滑肌细胞内 cAMP 水平。

70. 小剂量糖皮质激素替代疗法用于治疗

- A. 肾上腺皮质癌
- B. 肾病综合征
- C. 肾主腺嗜铬细胞瘤
- D. 垂体肿瘤
- E. 垂体前叶功能减退

【正确答案】E

【答案解析】糖皮质激素可用于肾上腺皮质功能不全，小剂量替代疗法适用于腺垂体功能减退症、肾上腺皮质功能减退症（艾迪生病）、肾上腺危象和肾上腺次全切除术后。

71. 胰岛素治疗糖尿病的使用注意错误的是

- A. 首次大剂量应用，达到稳定血糖后减量
- B. 1型糖尿病需终身用药，不得自行停用
- C. 坚持血糖监测，适时调整治疗方案
- D. 熟悉胰岛素的种类、主要给药途径，以便根据病情选择合适的制剂及给药途径
- E. 了解胰岛素主要不良反应的表现及其防治方法，将药物的有害作用降到最低

【正确答案】A

【答案解析】胰岛素治疗糖尿病时应注意：①治疗剂量因人而异，从小剂量开始逐渐增至血糖、尿糖控制满意。②1型糖尿病需终身用药，不得自行停用。③熟悉胰岛素的种类、主要给药途径，以便根据病情选择合适的制剂及给药途径。④了解胰岛素主要不良反应的表现及其防治方法，将药物的有害作用降到最低。⑤坚持血糖监测，适时调整治疗方案，使糖尿病得到理想控制。

72. 甲硝唑引起的不良反应最多见的是

- A. 肝损害
- B. 过敏反应
- C. 心脏毒性
- D. 软骨损害
- E. 消化道反应

【正确答案】 E

【答案解析】 甲硝唑引起的不良反应: 消化道不良反应多见, 如口腔金属味、恶心、呕吐、厌食、腹泻、腹痛等; 大剂量见头痛、头晕等神经系统症状, 偶有感觉异常、肢体麻木、共济失调和多发性神经炎等; 少数人发生荨麻疹、皮肤潮红、瘙痒等变态反应及排尿困难、黑尿。不良反应停药后均可自行消退。

73. 下列属于养生方法的是

- A. 法于阴阳
- B. 和于术数
- C. 食饮有节
- D. 起居有常
- E. 以上都是

【正确答案】 E

【答案解析】 养生具体方法包括五个方面: 一是法于阴阳, 顺应四时, 调养身心; 二是和于术数, 锻炼身体, 保精养神; 三是食饮有节, 五味和调, 滋养气血, 日常饮食有节制、有规律; 四是起居有常, 按时作息, 睡眠充足, 怡养神气; 五是不妄作劳, 劳逸结合, 保养形气。如此则保全精神, 达到祛病延年, 健康长寿的养生目的。

74. 劳风的治疗是

- A. 利肺散邪排出痰液
- B. 行气泄热
- C. 祛瘀清热
- D. 通调腑气
- E. 消导积滞

【正确答案】 A

【答案解析】 劳风的治疗宜利肺散邪以救俯仰, 排出痰液以通气道; 治则为针刺太阳以引经气。

75. 清代林佩琴在《类证治裁》中指出, 经病入脏, 邪胜正虚, 发为五脏痹。治疗用

- A. 乌头汤
- B. 薏苡仁汤
- C. 防风汤
- D. 宣痹汤
- E. 五痹汤

【正确答案】 E

【答案解析】 清代林佩琴在《类证治裁》中指出, 经病入脏, 邪胜正虚, 发为五脏痹。治疗用五痹汤为主。

76. 患者太阳病发汗后, 表现为脉浮, 微热, 口渴多饮, 小便不利, 宜选用的方剂是

- A. 麻杏甘石汤
- B. 桂枝汤
- C. 五苓散

D. 葛根黄芩黄连汤

E. 小建中汤

【正确答案】C

【答案解析】太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若脉浮，小便不利，微热消渴者，五苓散主之。

77. 阳明病，无汗，小便不利，渴引水浆者，治宜选用

A. 防己黄芪汤

B. 八正散

C. 五苓散

D. 茵陈蒿汤

E. 猪苓汤

【正确答案】D

【答案解析】此证为茵陈蒿汤证。阳明病，发热汗出者，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。

78. 太阴受病必见的主症是

A. 便溏

B. 腹泻

C. 腹满

D. 恶寒

E. 下利

【正确答案】C

【答案解析】脾主运化，脾虚邪入，则运化无权，故太阴病多见腹满，《内经》有“诸湿肿满，皆属于脾”，腹满是太阴受病必见的主症。

79. 下列关于黄芪桂枝五物汤中各药物的配伍意义，叙述正确的是

A. 黄芪通阳行痹

B. 桂枝益气固表

C. 芍药温通经脉

D. 生姜、大枣缓急止痛

E. 生姜助桂枝通阳行痹

【正确答案】E

【答案解析】黄芪桂枝五物汤即桂枝汤去甘草，倍生姜，加黄芪组成。本方以黄芪益气固表为君，桂枝通阳行痹为臣，佐以生姜助桂通阳行痹，芍药敛阴和营兼除血痹，姜枣调和营卫，共为使药。

80. 下列可以用半夏厚朴汤治疗的证候表现是

A. 头昏目眩，郁闷不舒，但头汗出，呕不能食，大便难，脉微弱

B. 少腹里急，腹满或疼痛拒按，月经后期、量少甚或闭经，经期腹痛

C. 自觉咽中阻塞不适，如有异物，吞之不下，咯之不出，饮食无碍

D. 无故悲伤欲哭，频频欠伸，神疲乏力，心烦失眠，情绪易于波动

E. 小腹急痛，小便不通，烦热不得卧，倚息

【正确答案】C

【答案解析】梅核气表现为以咽中异物梗塞感，咯之不出，吞之不下为主症，但饮食及吞咽正常。治以半夏厚朴汤。

二、A2

81. 男，24岁。腹泻半天来诊。腹泻30多次，开始为稀便，后为水样便，继之多次呕吐。

查体: T36.5℃, P110次/min, BP60/40mmHg, 神志清楚, 皮肤干燥, 弹性差。腹软, 无压痛。粪常规: 水样便, 镜检 WBC0~3个/HP, RBC0~2个/HP。最可能的诊断是

- A. 胃肠型细菌性食物中毒
- B. 阿米巴痢疾
- C. 急性细菌性痢疾
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 霍乱

【正确答案】 E

【答案解析】 凡有典型临床症状, 如剧烈腹泻, 水样便(黄水样、清水样、米泔样或血水样), 伴有呕吐, 迅速出现脱水, 循环衰竭及肌肉痉挛(特别是腓肠肌)的首发病例, 在病原学检查尚未肯定前, 应诊断为疑似霍乱。A项疾病多发于夏季, 常有饮食提示, 且腹泻、腹痛、黏液脓血便。B项为果酱样暗红色便。C项有腹痛、腹泻、里急后重, 黏液脓血便。D项黏液脓血便、腹泻、腹痛。

82. 患者高热3天, 头痛, 伴呕吐。检查: 颈项强直, 克氏征阳性, 脑脊液外观混浊, 细胞数 $2000 \times 10^6/L$, 以中性粒细胞为主。应首先考虑的是

- A. 结核性脑膜炎
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 伤寒
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 中毒型菌痢

【正确答案】 B

【答案解析】 流行性脑脊髓膜炎有上呼吸道感染病史, 突发高热, 头痛, 频繁呕吐, 皮肤瘀点, 瘀斑。查体: 颈项强直, 克氏征阳性, 脑脊液检查外观混浊, 白细胞计数升高。

83. 某患者由印尼入境后2天, 频繁腹泻, 腹泻数次后大便呈米泔水样, 无发热、腹痛及里急后重, 伴有呕吐。最重要的检查是

- A. 血常规
- B. 尿常规
- C. 电解质
- D. 泻吐物悬滴检查
- E. 以上均非

【正确答案】 D

【答案解析】 患者短时间内出现频繁腹泻, 但无腹痛及里急后重, 同时有呕吐, 并且患者由印尼入境, 根据症状表现及患者来自于霍乱高发地, 可以考虑霍乱的可能性比较大, 需要进行进一步的检查来确诊。泻吐物悬滴检查可以用于快速诊断霍乱, 故选D。

84. 患者, 女, 26岁, 被诊断为艾滋病, 现处于急性感染期, 与其相符的表现为

- A. 以发热最为常见, 可伴有头痛、咽痛、恶心、呕吐、腹泻、皮疹、关节痛、淋巴结肿大以及神经系统症状
- B. 临床上没有任何症状, 但血清中能检出HIV以及HIV核心蛋白和包膜蛋白的抗体, 具有传染性
- C. 持续性全身淋巴结肿大
- D. 出现头痛、记忆力下降、性格改变
- E. 合并出现卡波西肉瘤、慢性淋巴性间质性肺炎

【正确答案】 A

【答案解析】 艾滋病少数急性感染(感染后平均2~4周)者有临床症状, 通常持续数日到数

周后自然消失,平均为1~2周,以发热最为常见,可伴有头痛、咽痛、恶心、呕吐、腹泻、皮疹、关节痛、淋巴结肿大以及神经系统症状。

三、B

- A. 八纲辨证
- B. 精气血津液辨证
- C. 脏腑辨证
- D. 整体观念
- E. 辨证论治

85. 中医学理论体系的指导思想是

【正确答案】 D

【答案解析】 中医学理论体系的指导思想是整体观念。

86. 中医学的治疗特点是

【正确答案】 E

【答案解析】 中医学的治疗特点是辨证论治。

- A. 筋
- B. 脉
- C. 肉
- D. 皮
- E. 骨

87. 属于“金”的体是

【正确答案】 D

【答案解析】 形体对应五行分别为:筋属木,脉属火,肉属土,皮属金,骨属水。

88. 属于“木”的体是

【正确答案】 A

【答案解析】 形体对应五行分别为:筋属木,脉属火,肉属土,皮属金,骨属水。

- A. 脾胃
- B. 肝胆
- C. 心肾
- D. 肝肾
- E. 肝肺

89. 与气机调节关系密切的是

【正确答案】 E

【答案解析】 肺与肝的生理联系,主要表现在人体气机的升降调节方面。肝气以升发为宜,肺气以肃降为顺。此为肝肺气机升降的特点所在。肝升肺降,升降协调,对全身气机的调畅、气血的调和具有重要的调节作用。

90. 气机升降之枢指的是

【正确答案】 A

【答案解析】 脾胃为人体气机升降之枢纽。枢纽所司,则当升者升,当降者降,以维持精微的运化与敷布及其全身的气机升降运动,因此脾胃为枢是生命活动的重要环节。

- A. 足厥阴肝经
- B. 足阳明胃经
- C. 足太阳膀胱经
- D. 手太阴肺经
- E. 足少阳胆经

91. 起于中焦的经脉是

【正确答案】 D

【答案解析】 手太阴肺经，起于中焦，下络大肠，还循胃口（下口幽门，上口贲门），通过膈肌，属肺，从肺系横出腋下，沿上肢内侧前缘下行，过肘窝，入寸口，上鱼际，直出拇指桡侧端（少商穴）。

92. 起于目内眦的经脉是

【正确答案】 C

【答案解析】 足太阳膀胱经，起于目内眦，向上到达额部，左右交会于头顶。

- A. 四诊合参
- B. 整体审察
- C. 见微知著
- D. 病证结合
- E. 司外揣内

93. 医生利用四诊收集的病情资料，综合判断病情的方法属于

【正确答案】 A

【答案解析】 “四诊合参”，是指四诊并重，诸法参用，综合收集病情资料。

94. 中医上将辨病与辨证相结合来进行疾病诊断的方法属于

【正确答案】 D

【答案解析】 病证结合：中医的诊断结论由病名和证名组成。病与证是疾病诊断的两个不同的侧重点，辨病是探求病变全过程总的发展规律，认识贯穿疾病始终的基本矛盾；而辨证则是识别疾病某一阶段的主要病理环节，抓住当前疾病的主要矛盾。中医在诊断时，辨病与辨证常交织在一起，它既要求从纵的方面去辨别该病全过程的病机变化规律及临床特点，又要求从横的方面去辨别患者现阶段的证候类型。故正确的选项是 D。

- A. 咳声不扬，痰黄质稠
- B. 咳声重浊紧闷
- C. 干咳少痰或无痰
- D. 咳有痰声，痰多易咯
- E. 咳声如犬吠，声音嘶哑

95. 痰湿阻肺的特征是

【正确答案】 D

【答案解析】 咳声不扬，痰稠色黄，不易咯出，多属热证，多因热邪犯肺，肺津被灼所致。咳有痰声，痰多易咯，多属痰湿阻肺所致。干咳无痰或少痰，多属燥邪犯肺或阴虚肺燥所致。故此题的最佳选项是 D。

96. 燥邪犯肺的特征是

【正确答案】 C

【答案解析】 咳声不扬，痰稠色黄，不易咯出，多属热证，多因热邪犯肺，肺津被灼所致。咳有痰声，痰多易咯，多属痰湿阻肺所致。干咳无痰或少痰，多属燥邪犯肺或阴虚肺燥所致。

- A. 肝阳上亢
- B. 痰湿内阻
- C. 气血亏虚
- D. 肾精不足
- E. 肝火上炎

97. 头晕昏沉，痰多苔腻多为

【正确答案】 B

【答案解析】头晕目重，如物裹缠，痰多苔腻者多因痰湿内阻所致。

98. 头晕目眩，神疲乏力多为

【正确答案】C

【答案解析】头晕面白，神疲乏力，舌淡，脉细弱者，多因气血亏虚。

- A. 举之有余，按之不足
- B. 浮大中空，如按葱管
- C. 浮细无力而软
- D. 沉细无力而软
- E. 浮散无根，节律不齐

99. 元气离散，脏腑精气衰败脉象多见

【正确答案】E

【答案解析】散脉浮取散漫，中候似无，沉取不应，伴节律不齐或脉力不匀。多见于元气离散，脏腑精气衰败，尤其是心、肾之气将绝的危重病证。

100. 突然大出血时脉象多见

【正确答案】B

【答案解析】芤脉浮大中空，如按葱管；常见于大量失血、伤阴之际。

- A. 面色（白光）白
- B. 烦躁不安
- C. 呼吸气短
- D. 少气懒言
- E. 脉细无力

101. 寒证可见

【正确答案】A

【答案解析】寒证常见的临床表现有恶寒，畏寒，冷痛，喜暖，口淡不渴，肢冷蜷卧，痰、涎、涕清稀，小便清长，大便稀溏，面色（白光）白，舌淡，苔白而润，脉紧迟等。

102. 阳证可见

【正确答案】B

【答案解析】阳证的特征性表现有：面色赤，恶寒发热，肌肤灼热，烦躁不安，语声高亢，呼吸气粗，喘促痰鸣，口干渴饮，小便短赤涩痛，大便秘结奇臭，舌红绛，苔黄黑生芒刺，脉浮数、洪大、滑实。

- A. 肺气虚证
- B. 脾肺气虚证
- C. 肺肾气虚证
- D. 肺肾阴虚证
- E. 心肺气虚证

103. 症见心悸咳喘无力，胸闷气短，舌淡脉弱者属

【正确答案】E

【答案解析】心肺气虚证临床表现：胸闷，咳嗽，气短而喘，心悸，动则尤甚，吐痰清稀，神疲乏力，声低懒言，自汗，面色淡白，舌淡苔白，或唇舌淡紫，脉弱或结或代。

104. 症见气短而喘，咯痰清稀，食少，腹胀，便溏者属

【正确答案】B

【答案解析】脾肺气虚证临床表现：食欲不振，食少，腹胀，便溏，久咳不止，气短而喘，咯痰清稀，面部虚浮，下肢微肿，声低懒言，神疲乏力，面白无华，舌淡，苔白滑，脉弱。

A. 四气

- B. 五味
- C. 升降浮沉
- D. 归经
- E. 毒性

105. 表示药物作用部位的中药性能是

【正确答案】 D

【答案解析】 归经指药物对于机体某部分的选择性作用, 即某药对某些脏腑经络有特殊的亲和作用, 因而对这些部位的病变起着主要的或特殊的治疗作用, 药物归经不同, 其治疗作用也不同。

106. 反映药物作用安全程度的中药性能是

【正确答案】 E

【答案解析】 毒性指药物对机体所产生的不良影响及损害性。毒性反应与副作用不同, 它对人体的危害性较大, 甚至可危及生命。

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 另煎
- E. 烊化

107. 钩藤入汤剂宜

【正确答案】 B

【答案解析】 有些药物虽不属芳香药, 但久煎也能破坏其有效成分, 如钩藤、大黄、番泻叶等属后下之列。

108. 西洋参入汤剂宜

【正确答案】 D

【答案解析】 另煎: 又称另炖, 主要是指某些贵重药材, 为了更好地煎出有效成分, 还应单独另煎, 即另炖 2~3 小时。煎液可以另服, 也可与其他煎液混合服用。如人参、西洋参、羚羊角、麝香、鹿茸等。

- A. 石膏
- B. 夏枯草
- C. 知母
- D. 芦根
- E. 淡竹叶

109. 治疗热病烦渴和胃热呕逆的药物是

【正确答案】 D

【答案解析】 芦根功效: 清热泻火, 生津止渴, 除烦, 止呕, 利尿。主治: 热病烦渴; 胃热呕秽; 肺热咳嗽, 肺痈吐脓; 热淋涩痛。

110. 治疗温病气分证和疮溃不敛的药物是

【正确答案】 A

【答案解析】 石膏: (1) 温热病气分实热证。本品甘寒, 清热泻火力强, 并能除烦止渴, 为清泻肺、胃二经气分实热的要药。治温病气分实热证, 常与知母相须为用, 如白虎汤。

(2) 肺热喘咳证。本品善清肺热, 常与麻黄等同用, 如麻杏甘石汤。

(3) 胃火牙痛、头痛, 实热消渴。本品善清胃火, 与升麻、黄连等同用, 如清胃散。治胃火头痛, 可与川芎同用。

(4) 溃疡不敛, 湿疹瘙痒, 水火烫伤, 外伤出血等。煅石膏外用, 可收湿敛疮。

- A. 木瓜
- B. 秦艽
- C. 独活
- D. 络石藤
- E. 防己

111. 具有舒筋活络, 化湿和胃作用的药物是

【正确答案】 A

【答案解析】 木瓜功效: 舒筋活络, 和胃化湿。

112. 具有祛风通络, 凉血消肿作用的药物是

【正确答案】 D

【答案解析】 络石藤功效: 祛风通络, 凉血消肿。

- A. 茯苓
- B. 薏苡仁
- C. 猪苓
- D. 白术
- E. 泽泻

113. 既能利水又可泻热的药物是

【正确答案】 E

【答案解析】 泽泻功效: 利水渗湿, 泄热。

114. 既能止泻又可除痹的药物是

【正确答案】 B

【答案解析】 薏苡仁功效: 利水渗湿, 健脾, 除痹, 清热排脓。主治 (1) 水肿, 小便不利, 脚气; (2) 脾虚泄泻; (3) 湿痹拘挛; (4) 肺痈, 肠痈。

- A. 陈皮
- B. 青皮
- C. 枳实
- D. 香附
- E. 乌药

115. 具有理气调中, 燥湿化痰作用的药物是

【正确答案】 A

【答案解析】 陈皮功效: 理气健脾, 燥湿化痰。

116. 具有疏肝破气, 散结消滞作用的药物是

【正确答案】 B

【答案解析】 青皮功效: 疏肝破气, 消积化滞。

- A. 体液传播
- B. 土壤传播
- C. 飞沫传播
- D. 水、食物、苍蝇传播
- E. 蚊虫传播

117. 流感传播途径主要是

【正确答案】 C

【答案解析】

118. 流脑传播途径主要是

【正确答案】 C

【答案解析】流感经呼吸道-空气飞沫传播,也可通过直接接触或病毒污染物品间接接触传播。流脑病原菌主要通过咳嗽、喷嚏、说话等由飞沫借空气经呼吸道传播。

- A. 杯状病毒
- B. 嗜肝 DNA 病毒
- C. 缺陷病毒
- D. 黄病毒
- E. 微小 RNA 病毒

119. 丙肝病毒属于

【正确答案】 D

【答案解析】丙型肝炎病毒 (hepatitis C virus, HCV) 简称丙肝病毒,属 RNA 病毒,黄病毒属。

120. 乙肝病毒属于

【正确答案】 B

【答案解析】乙型肝炎病毒 (hepatitis B virus, HBV) 简称乙肝病毒,属嗜肝 DNA 病毒 (hepadnaviruses)。完整的乙肝病毒又称为 Dane 颗粒。

- A. 发热患者
- B. 免疫力低下者
- C. 合并慢性基础病患者
- D. 老年人
- E. 婴幼儿

121. 不属流感高危人群的是

【正确答案】 A

【答案解析】

122. 不属流感疫苗接种对象的是

【正确答案】 A

【答案解析】在流感好发季节,给易感的高危人群和医务人员接种疫苗。高危人群包括:年龄超过 65 岁;有慢性肺或心血管系统疾病(包括哮喘)的成人和 6 个月以上的儿童;肾功能障碍者;免疫功能抑制(包括药物性)者;妊娠中期以上孕妇等。

- A. 接触传播
- B. 虫媒传播
- C. 呼吸道传播
- D. 性传播
- E. 消化道传播

123. AIDS 的传播途径主要是

【正确答案】 D

【答案解析】性接触传播是艾滋病的主要传播途径。

124. 狂犬病的传播途径主要是

【正确答案】 A

【答案解析】狂犬病主要通过被患病动物咬伤传播。黏膜也是病毒的重要侵入门户,如眼结膜被病兽唾液玷污、肛门黏膜被狗舐舔等。

- A. H7N7
- B. H9N2
- C. H1N1
- D. H3N3

E. H5N1

125. 致病力最强的人禽流感病毒亚型是

【正确答案】 E

【答案解析】 根据其致病性, 禽流感病毒可分为高致病性、低致病性和非致病性三大类, 其中 H5 和 H7 亚型为高致病型, 又以 H5N1 致病性最强。

126. 曾引起流感大流行的流感病毒亚型是

【正确答案】 C

【答案解析】 根据病毒 NP 和 M1 抗原性的不同, 流感病毒分为甲 (A)、乙 (B) 和丙 (C) 三型, 甲型流感病毒再根据 HA 和 NA 的抗原性不同分为若干亚型, HA 可分为 H1~H18 亚型, NA 可分为 N1~N11 亚型, 人类流感主要与 H1、H2、H3 和 N1、N2 亚型有关。甲型流感病毒宿主广泛, 易发生变异, 曾多次引起世界性大流行。

A. 弛张热

B. 稽留热

C. 波状热

D. 间歇热

E. 不规则热

127. 伤寒极期的热型多为

【正确答案】 B

【答案解析】 伤寒极期持续性高热达 $39^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$, 多为稽留热型, 少数为弛张热或不规则热型。

128. 伤寒初期的热型多为

【正确答案】 A

【答案解析】 伤寒初期 (侵袭期): 病程第 1 周。缓慢起病, 发热是最早出现的症状, 体温呈弛张热型, 逐渐上升, 于 5~7 日内达 39°C 或以上。

A. 抗菌治疗

B. 补液治疗

C. 糖皮质激素

D. 静滴氯化钾

E. 强心治疗

129. 可减少霍乱腹泻量及缩短排菌时间的治疗是

【正确答案】 A

【答案解析】 早期应用抗菌药物有助于缩短腹泻和排菌时间, 减少腹泻次数及排泄量, 降低病后带菌率等, 但不能代替补液。

130. 霍乱中毒性休克用

【正确答案】 C

【答案解析】 重症患者在补足液体后, 若血压仍较低, 提示可能存在中毒性休克, 可给予糖皮质激素和血管活性药物。

A. 黏液便

B. 水样便

C. 果酱样大便

D. 黑便

E. 陶土色便

131. 霍乱患者的大便性状为

【正确答案】 B

【答案解析】霍乱多见水样便。

132. 菌痢患者的大便性状为

【正确答案】A

【答案解析】菌痢多见黏液便。

- A. 医院手术室的消毒
- B. 图书馆的通风
- C. 餐具的消毒
- D. 对传染病住院患者床头柜的按时消毒
- E. 传染病患者出院前的沐浴

133. 属终末消毒的是

【正确答案】E

【答案解析】

134. 属随时消毒的是

【正确答案】D

【答案解析】患者的终末消毒: 患者转科或出院前应进行沐浴, 更换清洁衣服, 个人用品须消毒后方可带离隔离区。

不同的传染病, 由于病原体的排出途径不同, 随时消毒的范围、对象与采用的方法也不同。如肠道传染病应及时对排出的粪便消毒, 还要定时对可能被粪便或被手污染的衣服、床单、日用品、门把手、家具等消毒。随时消毒是防止交叉感染的重要措施之一。

- A. 副作用
- B. 毒性反应
- C. 变态反应
- D. 后遗反应
- E. 停药反应

135. 因腹痛服用硫酸阿托品后出现口干、便秘, 此表现属于

【正确答案】A

【答案解析】副作用指药物在治疗剂量时产生与治疗目的无关的作用。

136. 因失眠, 睡前服用苯巴比妥钠, 第二天上午呈现宿醉现象, 此表现属于

【正确答案】D

【答案解析】后遗效应是指停药后血药浓度已降至阈浓度以下时仍残存的药理效应。如服用巴比妥类催眠药后, 次晨仍有困倦、头昏、乏力等宿醉现象。

- A. 毛果芸香碱
- B. 新斯的明
- C. 阿托品
- D. 度冷丁
- E. 吗啡

137. 可用于治疗青光眼的是

【正确答案】A

【答案解析】毛果芸香碱能够缩瞳、降低眼压, 用于青光眼的治疗。青光眼分闭角型和开角型。闭角型青光眼因前房角狭窄, 房水回流受阻而使眼内压升高, 毛果芸香碱可使前房角间隙扩大, 房水回流通畅, 眼内压降低; 开角型青光眼因小梁网本身及巩膜静脉窦发生变性或硬化, 阻碍了房水循环, 引起眼内压升高, 毛果芸香碱可能通过扩张巩膜静脉窦周围的小血管及收缩睫状肌, 使小梁网结构发生改变而使眼内压下降。

138. 可用于阵发性室上性心动过速的是

【正确答案】 B

【答案解析】 新斯的明通过拟胆碱作用使心室频率减慢, 用于治疗压迫眼球或颈动脉窦等兴奋迷走神经措施无效时的阵发性室上性心动过速。

- A. 结节-漏斗通路 D₂受体
- B. 黑质-纹状体通路 D₂受体
- C. 中脑-边缘系统和 中脑-皮层通路的 D₂受体
- D. 脑干网状结构上行激活系统 α受体
- E. M胆碱受体

139. 长期应用抗精神病药物出现的口干、便秘、视物模糊是由于阻滞

【正确答案】 E

【答案解析】 氯丙嗪具有阿托品样作用, 通过阻断 M受体, 出现口干、视物模糊、尿潴留及便秘等。

140. 氯丙嗪引起的乳房肿胀、溢乳是由于阻滞

【正确答案】 A

【答案解析】 氯丙嗪能阻断结节-漏斗通路的 D₂样受体, 抑制下丘脑催乳素抑制因子的分泌, 而使腺垂体分泌催乳素增加。

- A. 作用于髓袢升支粗段的髓质和皮质部, 抑制 Na⁺-K⁺-2Cl⁻ 共同转运系统
- B. 作用于髓袢升支粗段皮质部, 抑制 Na⁺-K⁺-2Cl⁻ 共同转运系统
- C. 作用于远曲小管和集合管, 竞争醛固酮受体, 对抗醛固酮的作用
- D. 作用于远曲小管近端, 阻滞 Na⁺通道, 减少 Na⁺的重吸收
- E. 作用于近曲小管, 抑制碳酸酐酶, 减少 H⁺-Na⁺交换

141. 呋塞米的利尿作用机制是

【正确答案】 A

【答案解析】 呋塞米等抑制髓袢升支粗段上皮细胞上的 Na⁺-K⁺-2Cl⁻ 同向转运机制, 产生强效利尿作用。

142. 螺内酯的利尿作用机制是

【正确答案】 C

【答案解析】 螺内酯化学结构与醛固酮相似, 可竞争性地与胞浆中的醛固酮受体结合, 拮抗醛固酮的排钾保钠作用, 产生与醛固酮相反的作用即保钾利尿。其利尿作用与醛固酮水平有关, 作用弱而缓慢。

- A. 二甲双胍
- B. 氯磺丙脲
- C. 格列齐特
- D. 格列吡嗪
- E. 甲苯磺丁脲

143. 促进 ADH 分泌的药物

【正确答案】 B

【答案解析】 氯磺丙脲能促进抗利尿激素 (ADH) 分泌并增强其作用。

144. 易引起乳酸血症的药物

【正确答案】 A

【答案解析】 二甲双胍的不良反应较磺酰脲类多见, 如厌食、口苦、口腔金属味、胃肠刺激等胃肠道反应, 低血糖症、维生素 B₁₂ 和叶酸缺乏、乳酸血症及酮血症, 慢性心、肝、肾疾病患者及孕妇禁用。

- A. 甲硝唑

- B. 磺胺嘧啶
- C. 甲氧苄啶
- D. 诺氟沙星
- E. 甲磺灭脓

145. 灭滴灵即

【正确答案】 A

【答案解析】 甲硝唑（又叫灭滴灵）：是目前临床治疗各种厌氧菌感染的重要药物之一，广泛用于敏感厌氧菌所致腹腔、盆腔感染，牙周脓肿，鼻窦窦炎，骨髓炎，脓毒性关节炎，脓胸，肺脓肿等；幽门螺旋杆菌所致消化性溃疡等；与广谱青霉素或氨基糖苷类合用预防术后厌氧菌感染；还可用于治疗肠内外阿米巴病及阴道滴虫病。

146. 抗菌增效剂是指

【正确答案】 C

【答案解析】 甲氧苄啶（TMP）又称抗菌增效剂，属二氢嘧啶类化合物。

- A. 氮芥类
- B. 喜树碱类
- C. 亚硝酸类
- D. 普卡霉素类
- E. 二氢叶酸还原酶抑制药

147. 属于抗代谢药中常用药物的是

【正确答案】 E

【答案解析】 抗代谢药多是模拟正常机体代谢物质的化学结构而合成的类似物。该类药属周期特异性抗肿瘤药，可阻止核酸代谢。如二氢叶酸还原酶抑制药、嘧啶类核苷酸拮抗药、嘌呤类核苷酸拮抗药。

148. 属于抗肿瘤抗生素常用药物的是

【正确答案】 D

【答案解析】 抗肿瘤抗生素：该类药主要干扰转录过程及阻止 RNA 合成，属周期非特异性抗肿瘤药。如蒽环类抗生素、普卡霉素类、放线菌素类。

- A. 因而越之
- B. 引而竭之
- C. 汗而发之
- D. 按而收之
- E. 渍形以为汗

149. 《素问·阴阳应象大论》中，其有邪者

【正确答案】 E

【答案解析】 《素问·阴阳应象大论》：其有邪者，渍形以为汗。

150. 《素问·阴阳应象大论》中，其在皮者

【正确答案】 C

【答案解析】 《素问·阴阳应象大论》：其在皮者，汗而发之。

第二单元

一、A1

1. 下列各项中不符合方剂组成原则要求的是

- A. 辨证审因，随证立法，依法制方
- B. 方中诸药，主次有序，分工合作

- C. 君药的药量在全方总药量中所占比例最大
D. 君药的数量不宜过多, 药量相应较大
E. 不一定君臣佐使俱全, 但君药不可缺少

【正确答案】C

【答案解析】君药的药味较少, 而且不论何药在作为君药时, 其用量比之作为臣、佐、使药应用时要大。

2. 参苏饮的主要临床表现是

- A. 恶寒渐轻, 身热增盛, 无汗头痛, 目疼鼻干, 心烦不眠, 咽干耳聋, 眼眶痛, 舌苔薄黄, 脉浮微洪
B. 恶寒发热, 无汗, 头痛项强, 肢体酸楚疼痛, 口苦微渴, 舌苔白或微黄, 脉浮
C. 恶寒发热, 无汗, 头痛, 鼻塞, 咳嗽痰白, 胸膈满闷, 倦怠无力, 气短懒言, 苔白, 脉弱
D. 身热不解, 咳逆气急, 甚则鼻煽, 口渴, 有汗或无汗, 舌苔薄白或黄, 脉浮而数
E. 憎寒壮热, 头项强痛, 肢体酸痛, 无汗, 鼻塞声重, 咳嗽有痰, 胸膈痞满, 舌淡苔白, 脉浮而按之无力

【正确答案】C

【答案解析】参苏饮益气解表、理气化痰, 主治气虚外感风寒, 内有痰湿证。临床可见恶寒发热, 无汗, 头痛, 鼻塞, 咳嗽痰白, 胸膈满闷, 倦怠无力, 气短懒言, 苔白, 脉弱。

3. 桑菊饮证的主要临床表现是

- A. 咳嗽咽痒, 微有恶寒发热, 苔薄白, 脉浮缓
B. 头痛, 发热, 汗出恶风, 苔薄白, 脉浮缓
C. 咳嗽, 身热不甚, 口微渴, 脉浮数
D. 身热, 咳逆, 气急鼻塞, 苔薄黄, 脉滑数
E. 头痛身热, 微恶风寒, 有汗不多, 口渴咽干, 舌尖红, 脉浮数

【正确答案】C

【答案解析】桑菊饮主治风温初起、表热轻证, 临床症状可见咳嗽, 身热不甚, 口微渴, 脉浮数。

4. 下列各项是对小青龙汤方药配伍意义的分析, 其中不恰当的是

- A. 干姜温肺化饮
B. 细辛散寒止痛
C. 五味子敛肺气
D. 半夏燥湿化痰
E. 芍药和营养血

【正确答案】B

【答案解析】小青龙汤中细辛与干姜同为臣药, 起温肺化饮, 兼助麻、桂解表祛邪之用。

5. 功用为补脾柔肝, 祛湿止泻的方剂是

- A. 四逆散
B. 逍遥散
C. 温脾汤
D. 大柴胡汤
E. 痛泻要方

【正确答案】E

【答案解析】痛泻要方的功用为补脾柔肝, 祛湿止泻。

6. 香薷散的功用是

- A. 祛湿化浊, 理气宽中

- B. 散寒解表，化湿和中
- C. 解表散寒，理气和中
- D. 祛暑解表，化湿和中
- E. 祛暑解表，清热化湿

【正确答案】D

【答案解析】香薷散的功用是祛暑解表，化湿和中。

7. 从组成药物来看，小建中汤即桂枝汤

- A. 倍甘草加饴糖
- B. 去芍药加饴糖
- C. 倍甘草与芍药
- D. 去芍药倍甘草
- E. 倍芍药加饴糖

【正确答案】E

【答案解析】小建中汤是由桂枝汤倍芍药加饴糖而成。

8. 补益剂应用时需注意

- A. 真虚假实证、真实假虚证均可使用补益剂
- B. 补益剂中须配伍理气醒脾之药，注意补而不滞
- C. 补益剂多味厚滋腻，宜大火久煎
- D. 宜饭后立即服用补益剂，助药物吸收
- E. 补益剂性质温和，适用范围广，虚证实证俱可

【正确答案】B

【答案解析】补益剂主要用于虚证。应用时需注意：

(1) 要辨清病证的虚实真假。“大实有羸状，至虚有盛候”，真虚假实证可以使用补益剂；若为真实假虚证，误用补益之剂，则实者更实，且贻误病情。

(2) 要辨清虚证的实质和具体的病位。虚证有气血阴阳虚损的不同，并有心肝脾肺肾等脏腑部位的区别，要区分清楚，予以合适的补益剂。

(3) 注意脾胃功能。补益药性多滋腻，容易壅中滞气，故在补益剂中须适当配伍理气醒脾之品，以资运化，使之补而不滞。

(4) 补益药大多味厚滋腻，故宜慢火久煎，以使药力尽出。

(5) 补益剂多以空腹或饭前服用为佳，有利于药物的吸收。

9. 开窍剂的使用时需注意

- A. 热闭者宜温开
- B. 寒闭者宜凉开
- C. 若见汗出肢冷、呼吸气微、口开目合、脉微欲绝者，急用开窍剂
- D. 阳明腑实证见神昏谵语者，可选用寒下剂合开窍剂
- E. 开窍剂多用于急救，中病即止

【正确答案】E

【答案解析】使用开窍剂时需注意：

(1) 应用开窍剂时，应首先辨别闭证和脱证。凡邪盛气实而见神志昏迷、口噤不开、两手握固、二便不通、脉实有力的闭证可以使用开窍剂治疗。而对正气衰竭之汗出肢冷、呼吸气微、手撒遗尿、口开目合、神识不清、脉象虚弱无力或脉微欲绝的脱证，不得使用开窍剂。

(2) 辨别闭证之属热属寒，热闭者治以凉开，寒闭者治以温开。

(3) 对于阳明腑实证而见神昏谵语者，只宜寒下，不宜用开窍剂。至于阳明腑实而兼有邪陷心包之证，则应该根据病情缓急，或先予开窍，或先投寒下，或开窍与寒下并用。

(4) 开窍剂大多为芳香药物，善于辛散走窜，只宜暂用，不宜久服，久服则易伤元气，故临床多用于急救，中病即止，待患者神志清醒后，应根据不同表现进行辨证施治。

(5) 开窍剂中的麝香等药有碍胎元，孕妇慎用。

(6) 本类方剂多制成丸、散剂或注射剂。丸剂、散剂使用时，宜温开水化服或鼻饲，不宜加热煎煮，以免药性挥发，影响疗效。

10. 温经汤的功用是

- A. 温经散寒，活血祛瘀
- B. 温经散寒，养血祛瘀
- C. 温经散寒，养血通脉
- D. 活血化瘀，温经止痛
- E. 活血祛瘀，散结止痛

【正确答案】 B

【答案解析】 温经汤的功用是温经散寒，养血祛瘀。

11. 下列各项中，除哪项外，均是镇肝息风汤的组成药物

- A. 白芍、甘草
- B. 龟板、牛膝
- C. 鳖甲、天麻
- D. 白芍、牡蛎
- E. 龟板、牡蛎

【正确答案】 C

【答案解析】 镇肝息风汤的组成是怀牛膝、生赭石、生龙骨、生牡蛎、生龟板、生杭芍、玄参、天冬、川楝子、生麦芽、茵陈、甘草。

方歌：镇肝息风芍天冬，玄牡茵陈赭藤龙；龟板麦芽甘草楝，肝风内动有奇功。

12. 猪苓汤中配伍阿胶的用意是

- A. 滋阴补血
- B. 补血止血
- C. 润肺止咳
- D. 养血益气
- E. 滋阴润燥

【正确答案】 E

【答案解析】 阿胶滋阴润燥，用于猪苓汤证中，既益已伤之阴，又防诸药渗利重伤阴血。

13. 咳痰清稀色白，喜唾涎沫，胸满不舒，苔白滑，脉弦滑，宜选用

- A. 半夏白术天麻汤
- B. 苓甘五味姜辛汤
- C. 贝母瓜蒌散
- D. 清气化痰丸
- E. 三子养亲汤

【正确答案】 B

【答案解析】 苓甘五味姜辛汤温肺化饮，主治寒饮咳嗽，临床可见咳嗽量多，清稀色白，或喜唾涎沫，胸满不舒，舌苔白滑，脉弦滑。

14. 抽搐病因中，属于感染性颅脑疾病的是

- A. 癫痫
- B. 脑外伤
- C. 脑肿瘤

- D. 脑寄生虫病
- E. 脑血管性疾病

【正确答案】D

【答案解析】抽搐的病因中的颅脑疾病

- (1) 感染性疾病如各种脑炎及脑膜炎、脑脓肿、脑寄生虫病等。
- (2) 非感染性疾病①外伤：产伤、脑挫伤、脑血肿等。②肿瘤：原发性肿瘤（如脑膜瘤、神经胶质瘤等）及转移性脑肿瘤。③血管性疾病：脑血管畸形、高血压脑病、脑梗死、脑出血等。④癫痫。

15. 下列属感染性发热的是

- A. 无菌性坏死组织吸收
- B. 变态反应
- C. 内分泌代谢疾病
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 烧伤

【正确答案】D

【答案解析】肺炎支原体肺炎属于感染性发热。

16. 吸气性呼吸困难表现为

- A. 明显的哮鸣音
- B. 深大呼吸
- C. 桶状胸
- D. 三凹征
- E. 胸部一侧呼吸减弱

【正确答案】D

【答案解析】吸气性呼吸困难：表现为胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙在吸气时明显凹陷，称为“三凹征”，常伴有频繁干咳及高调的吸气性喘鸣音。见于急性喉炎、喉水肿、喉痉挛、白喉、喉癌、气管异物、支气管肿瘤或气管受压等。

17. 呕血与黑便最常见的原因是

- A. 胃底、食管静脉曲张破裂
- B. 十二指肠炎
- C. 慢性胃炎
- D. 急性胃黏膜病变
- E. 消化性溃疡

【正确答案】E

【答案解析】呕血与黑便最常见的原因是消化性溃疡。

18. 关于腹痛部位，下列叙述正确的是

- A. 胃、十二指肠溃疡疼痛多在脐周
- B. 急性阑尾炎疼痛在右下腹麦氏点
- C. 小肠疾病疼痛多在右上腹
- D. 胆囊炎疼痛多在左上腹
- E. 肝脓肿疼痛多在中下腹

【正确答案】B

【答案解析】腹痛的部位：如胃、十二指肠疾病、急性胰腺炎疼痛多在中上腹部；肝、胆疾病疼痛位于右上腹；急性阑尾炎早期疼痛在脐周或上腹部，数小时后转移至右下腹；小肠绞痛位于脐周；结肠疾病疼痛多位于下腹或左下腹；膀胱炎、盆腔炎症及异位妊娠破裂引起的

疼痛在下腹部；空腔脏器穿孔后引起弥漫性腹膜炎则为全腹痛；结核性腹膜炎、腹膜转移癌、腹膜粘连等腹痛呈弥漫性与不定位性。

19. 下列疾病可引起咯血，但除外

- A. 肺结核
- B. 肺炎
- C. 支气管内膜结核
- D. 风湿性心脏病
- E. 支气管哮喘

【正确答案】 E

【答案解析】 咯血的病因：

- (1) 支气管疾病常见于支气管扩张症、支气管肺癌、支气管内膜结核和慢性支气管炎等。
- (2) 肺部疾病如肺结核、肺炎链球菌性肺炎、肺脓肿等。肺结核为我国最常见的咯血原因。
- (3) 心血管疾病如风湿性心脏病、二尖瓣狭窄所致的咯血等。
- (4) 其他如血小板减少性紫癜、白血病、血友病、肺出血型钩端螺旋体病、肾综合征出血热等。

20. 下列可引起头痛伴剧烈眩晕的是

- A. 偏头痛
- B. 中暑
- C. 颅内高压症
- D. 小脑肿瘤
- E. 蛛网膜下腔出血

【正确答案】 D

【答案解析】 头痛伴随眩晕见于小脑肿瘤、椎-基底动脉供血不足等。

21. 下列不符合心包摩擦音特点的是

- A. 收缩期及舒张期均可听到
- B. 通常在胸骨左缘 3、4 肋间易听到
- C. 将听诊器胸件向胸部加压时，可使摩擦音增强
- D. 屏住呼吸时摩擦音消失
- E. 病人采取坐位稍前倾时，易于听到

【正确答案】 D

【答案解析】 心包摩擦音听诊：在胸骨左缘第 3、4 肋间处较易听到，病人坐位稍前倾，深呼吸后屏住呼吸时易于听到，见于急性心包炎。心包摩擦音与胸膜摩擦音的区别，主要为屏住呼吸时胸膜摩擦音消失，而此时心包摩擦音仍可听到。D 选项是胸膜摩擦音的特点，所以应该选 D。

22. 深吸气时脾脏在左肋下 4cm 但未超过脐水平，临床的脾肿大分度为

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 正常
- E. 无法确定

【正确答案】 B

【答案解析】 脾肿大的分度方法：深吸气时脾脏在肋下不超过 3cm 者为轻度肿大；超过 3cm 但在脐水平线以上，为中度肿大；超过脐水平线或前正中中线为高度肿大，又称巨脾。中度以上脾肿大时其右缘常可触及脾切迹，这一特征可与左肋下其他包块相区别。

23. 胃癌发生淋巴结转移时常出现在

- A. 右锁骨上窝
- B. 左锁骨上窝
- C. 颈部
- D. 腋窝
- E. 滑车上

【正确答案】 B

【答案解析】 左锁骨上窝淋巴结肿大, 多为腹腔脏器癌肿(胃癌、肝癌、结肠癌等)转移; 右锁骨上窝淋巴结肿大, 多为胸腔脏器癌肿(肺癌、食管癌等)转移。

24. 用口测法测量体温时, 正确的是

- A. 正常值为 $36.5^{\circ}\text{C}\sim 37.5^{\circ}\text{C}$
- B. 小儿常用
- C. 昏迷患者可用
- D. 体温 1 日内有 1°C 以上波动
- E. 口测法温度较可靠

【正确答案】 E

【答案解析】 口腔温度: 正常值为 $36.3^{\circ}\text{C}\sim 37.2^{\circ}\text{C}$ 。口测法温度虽较可靠, 但对婴幼儿及意识障碍者则不宜使用。

25. 强迫仰卧位见于

- A. 各种严重疾病的早期
- B. 极度衰弱
- C. 意识不清
- D. 急性腹膜炎
- E. 严重疾病晚期

【正确答案】 D

【答案解析】 强迫仰卧位: 患者仰卧, 双腿蜷曲, 借以减轻腹部肌肉紧张。见于急性腹膜炎等。

26. 醉酒步态可见于

- A. 佝偻病
- B. 脑瘫
- C. 小脑病变
- D. 脊髓疾病
- E. 锥体外系疾病

【正确答案】 C

【答案解析】 醉酒步态见于小脑病变、酒精中毒等。

27. 肝浊音界下移见于

- A. 人工气腹
- B. 肺气肿
- C. 肝硬化
- D. 肺不张
- E. 急性肝炎

【正确答案】 B

【答案解析】 肝浊音界向下移位见于肺气肿、右侧张力性气胸等。

28. 急性胃肠穿孔具有的特征性体征是

- A. 肝浊音界消失代之以鼓音
- B. 腹部压痛
- C. 胃振水音
- D. 移动性浊音
- E. 发热

【正确答案】 A

【答案解析】 肝浊音界消失,代之以鼓音,是急性胃肠穿孔的重要征象,亦可见于人工气腹。肝炎、肝脓肿时可出现肝区叩击痛。

29. 患侧胸廓下陷,肋间隙变窄,呼吸动度减弱或消失见于

- A. 胸腔积液
- B. 肺气肿
- C. 阻塞性肺不张
- D. 肺实变
- E. 气胸

【正确答案】 C

【答案解析】 阻塞性肺不张:

- (1) 望诊患侧胸廓下陷,肋间隙变窄,呼吸动度减弱或消失。
- (2) 触诊气管移向患侧,语颤减弱或消失。
- (3) 叩诊患侧呈浊音或实音。
- (4) 听诊呼吸音消失,听觉语音减弱或消失。

30. 关于语颤的描述,下列不正确的是

- A. 发音强、音调低、胸壁薄者语颤强
- B. 左胸上部较右胸上部强
- C. 前胸上部较下部强
- D. 后胸下部较上部强
- E. 男性较女性强

【正确答案】 B

【答案解析】 触觉语颤:正常情况下,前胸上部的语颤较下部强;后胸下部较上部强;右上胸较左上胸强。

31. 肛门外(齿状线以下)有紫红色柔软包块,表面为皮肤者称为

- A. 肛裂
- B. 内痔
- C. 外痔
- D. 肛瘘
- E. 直肠脱垂

【正确答案】 C

【答案解析】 外痔:肛门齿状线以下的紫红色包块,表面为皮肤。

32. 检查脊柱弯曲度的正确体位是

- A. 仰卧位
- B. 右侧卧位
- C. 左侧卧位
- D. 膝胸卧位
- E. 站立位

【正确答案】 E

【答案解析】脊柱弯曲度的检查方法：患者取立位或坐位，先从侧面观察脊柱有无过度的前凸与后凸；然后从后面用手指沿脊椎棘突用力从上向下划压，划压后的皮肤出现一条红色充血线，观察脊柱有无侧弯。

33. 浅反射不包括

- A. 直接角膜反射
- B. 腹壁反射
- C. 提睾反射
- D. 膝反射
- E. 间接角膜反射

【正确答案】D

【答案解析】膝反射见于深反射。

34. 关于 HBV 的叙述，下列错误的是

- A. 为乙型肝炎的病原体
- B. 属嗜肝 DNA 病毒
- C. HBV 主要通过血液途径传播
- D. 可通过母婴垂直传播
- E. 可通过肠道传播

【正确答案】E

【答案解析】HBV 主要通过血液途径传播，也可由性接触传播和母婴垂直传播。

35. SLE 患者血清中有多种抗体，其中阳性率可达 95% 以上，但特异性较差的为

- A. 类风湿因子 (RF)
- B. 抗核抗体 (ANA)
- C. SLE 因子
- D. 抗磷脂抗体
- E. 抗酸性核蛋白抗体

【正确答案】B

【答案解析】抗核抗体 (ANA) 临床意义

(1) ANA 阳性：①多见于未经治疗的系统性红斑狼疮 (SLE)，阳性率可达 95% 以上，但特异性较差。②药物性狼疮、混合性结缔组织病、原发性胆汁性肝硬化、全身性硬皮病、多发性肌炎等患者的阳性率也较高。③其他自身免疫性疾病：如类风湿性关节炎、桥本甲状腺炎等也可呈阳性。

(2) 荧光类型：根据细胞核染色后的荧光类型，ANA 可分为均质型、边缘型、颗粒型、核仁型 4 种。

36. 下列疾病通过骨髓细胞学检查有明确诊断作用的是

- A. 增生性贫血
- B. 类白血病反应
- C. 骨髓增殖性疾病
- D. 恶性组织细胞病
- E. 血小板减少性紫癜

【正确答案】D

【答案解析】骨髓细胞学检查：①对各型白血病、恶性组织细胞病、多发性骨髓瘤、巨幼细胞贫血、再生障碍性贫血、典型的缺铁性贫血等，具有确定诊断的作用。②对增生性贫血（如溶血性贫血）、血小板减少性紫癜、骨髓增生异常综合征、骨髓增殖性疾病（如真性红细胞增多症、原发性血小板增多症等）、脾功能亢进、粒细胞减少症和粒细胞缺乏症等有辅助诊

断价值。

37. 尿酮体阳性见于

- A. 急性膀胱炎
- B. 肾结核
- C. 肾盂肾炎
- D. 肾结石
- E. 糖尿病酮症酸中毒

【正确答案】 E

【答案解析】 尿中酮体量一般检查法为阴性。尿酮体阳性见于糖尿病酮症酸中毒、妊娠剧吐、重症不能进食等脂肪分解增强的疾病。

38. 中性粒细胞核左移常见于

- A. 急性化脓性感染
- B. 肝硬化
- C. 伤寒
- D. 副伤寒
- E. 系统性红斑狼疮

【正确答案】 A

【答案解析】 核左移：当周围血中杆状核粒细胞增多 $>5\%$ ，并出现晚幼粒、中幼粒、早幼粒等细胞时，称为核左移。常见于感染，特别是急性化脓性感染，也可见于急性大出血、急性溶血反应、急性中毒等。核左移伴白细胞总数增高，称为再生性左移。表示机体反应性强，骨髓造血功能旺盛。核左移而白细胞总数不增高，甚至减少，称为退行性左移。表示机体反应性低下，骨髓造血功能减低，见于再生障碍性贫血、粒细胞缺乏症。

39. 关于左心室肥大，以下错误的是

- A. QRS 电压增高
- B. 心电图轴轻、中度左偏
- C. QRS 波群时间延长
- D. ST 段下移 $\geq 0.03\text{mV}$
- E. T 波低平、双向或倒置

【正确答案】 D

【答案解析】 左室肥大的心电图表现：①QRS 波群电压增高： R_{V_5} 或 $R_{V_6} > 2.5\text{mV}$ ， R_{V_5} 或 $R_{V_6} + S_{V_1} > 4.0\text{mV}$ （男）或 $> 3.5\text{mV}$ （女）。②心电图轴左偏。③QRS 波群时间延长到 $0.10 \sim 0.11\text{s}$ 。④ST-T 改变，以 R 波为主的导联中，ST 段下移 $\geq 0.05\text{mV}$ ，T 波低平、双向或倒置：左室肥大常见于高血压心脏病、二尖瓣关闭不全、主动脉瓣病变、心肌病等。

40. 右房肥大的心电图表现为

- A. P 波尖而高耸
- B. P 波低平
- C. P 波呈双峰状
- D. P 波增宽
- E. P 波出现切迹

【正确答案】 A

【答案解析】 右房肥大：心电图表现为 P 波尖而高耸，其幅度 $> 0.25\text{mV}$ ，以 II、III、aVF 导联表现最为突出，常见于慢性肺源性心脏病，故称“肺型 P 波”，也可见于某些先天性心脏病。

41. 目前最常用的 X 线检查方法是

- A. 透视
- B. 平片
- C. 放大摄影
- D. 荧光摄影
- E. 软 X 线摄影

【正确答案】 B

【答案解析】 X线摄影（又称平片）这是目前最常用的 X线检查方法。

42. 左心室明显增大见于

- A. 单纯二尖瓣狭窄
- B. 慢性肺源性心脏病
- C. 心包积液
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 以上都不是

【正确答案】 D

【答案解析】 主动脉瓣关闭不全：左心室明显增大，升主动脉、主动脉弓普遍扩张，心脏呈靴形。

43. 食管癌 X线钡剂造影可见

- A. 黏膜皱襞明显增宽、迂曲
- B. 管腔狭窄
- C. 肿瘤区蠕动消失
- D. 形如硬管状
- E. 以上都不是

【正确答案】 B

【答案解析】 食管癌 X线钡剂造影可见：①黏膜皱襞改变：由于肿瘤破坏黏膜层，使正常皱襞消失、中断、破坏，形成表面杂乱的不规则影像。②管腔狭窄。③腔内充盈缺损。④不规则的龛影，早期较浅小，较大者表现为长径与食管长轴一致的长形龛影。⑤受累食管呈局限性僵硬。

44. 原发性支气管肺癌周围型的 X线表现是

- A. 渗出性病变
- B. 纤维索条
- C. 肿块内见到的小圆形或管状低密度影
- D. 增殖性病变
- E. 实变区密度较低呈毛玻璃样

【正确答案】 C

【答案解析】 原发性支气管肺癌（肺癌）周围型：X线表现为密度增高，轮廓模糊的结节状或球形病灶，逐渐发展可形成分叶状肿块；发生于肺尖的癌称为肺沟癌。HRCT有利于显示结节或肿块的形态、边缘、周围状况以及内部结构等，可见分叶征、毛刺征、胸膜凹陷征、空泡征或支气管充气征（直径小于 3cm 以下的癌，肿块内见到的小圆形或管状低密度影），同时发现肺门或纵隔淋巴结肿大更有助于肺癌的诊断。增强 CT 能更早发现肺门、纵隔淋巴结转移。

45. 大叶性肺炎出现病变范围呈肺段性 or 大叶性分布的是

- A. 充血期
- B. 实变期
- C. 消散期

- D. 实变期与消散期之间
- E. 以上都不是

【正确答案】 B

【答案解析】 大叶性肺炎：充血期 X 线无明显变化，或仅可见肺纹理增粗；实变期肺野出现均匀性密度增高的片状阴影，病变范围呈肺段性 or 大叶性分布，在大片密实阴影中常可见到透亮的含气支气管影，即支气管充气征。

46. 扩张的支气管腔内充满黏液栓时，可见

- A. 葡萄串样改变
- B. 指状征
- C. 轨道征
- D. 戒指征
- E. 以上都不是

【正确答案】 B

【答案解析】 支气管扩张症：确诊主要靠胸部 CT 检查，尤其是高分辨力 CT (HRCT)。柱状扩张时可见“轨道征”或“戒指征”；囊状扩张时可见葡萄串样改变；扩张的支气管腔内充满黏液栓时，可见“指状征”。

47. 右上肺中心型肺癌的典型 X 线表现是

- A. 两上肺锁骨下区的片状阴影
- B. 左心缘影呈直线状斜向外下方
- C. 肺门肿块和右肺上叶不张连在一起形成横行“S”状的下缘
- D. 肺内有多发的薄壁空洞
- E. 肺内有多发的肿块影

【正确答案】 C

【答案解析】 发生于右上叶的肺癌，肺门肿块及右肺上叶不张连在一起可形成横行“S”状下缘。

48. 门诊病历中，书写“体格检查”部分的内容时，应重点记载的是

- A. 一般情况
- B. 皮肤、黏膜
- C. 阳性体征及有关的阴性体征
- D. 淋巴结
- E. 头部及其器官

【正确答案】 C

【答案解析】 书写“体格检查”部分的内容时，应重点记载的是阳性体征及有关的阴性体征。

49. 关于黄疸的特点，下列说法正确的是

- A. 溶血性黄疸以非结合胆红素增多为主
- B. 肝细胞性黄疸尿胆红素阴性
- C. 胆汁淤积性黄疸尿胆原增多
- D. 肝细胞性黄疸尿胆原减少
- E. 胆汁淤积性黄疸尿胆红素阴性

【正确答案】 A

【答案解析】 溶血性黄疸实验室检查以非结合胆红素增多为主，结合胆红素一般正常。肝细胞性黄疸实验室检查示血清结合及非结合胆红素均增多。尿中尿胆原增多，尿胆红素阳性。胆汁淤积性黄疸实验室检查示血清结合胆红素明显增多。尿胆原减少或阴性，尿胆红素阳性。

50. 下列不属于“外感六淫”的是

- A. 风
- B. 寒
- C. 暑
- D. 湿
- E. 痰

【正确答案】 E

【答案解析】 外感六淫包括风、寒、暑、湿、燥、火。

51. 沿表皮蚀烂，越腐越痒的属

- A. 风胜
- B. 湿胜
- C. 热胜
- D. 虫淫
- E. 血虚

【正确答案】 B

【答案解析】 湿胜：浸淫四窜，黄水淋漓，最易沿表皮蚀烂，越腐越痒，多为湿性，如急性湿疹，脓疱疮。

52. 药物浸泡消毒法中，器械消毒液浸泡的时间为

- A. 20分钟
- B. 30分钟
- C. 40分钟
- D. 50分钟
- E. 60分钟

【正确答案】 B

【答案解析】 药物浸泡消毒法的注意事项：0.1%新洁尔灭或洗必泰每1000ml中，应加入亚硝酸钠5g，可以防止金属生锈；浸泡时间均为30分钟。

53. 局麻药内加肾上腺素的主要目的是

- A. 预防过敏反应
- B. 延缓药物吸收，延长作用时间
- C. 使局部血管收缩，减少出血
- D. 预防术中血压下降
- E. 预防术中脉搏减慢

【正确答案】 B

【答案解析】 局麻药内加肾上腺素的主要是为了延缓药物吸收，延长作用时间。

54. 下列不属于硬膜外麻醉禁忌证的是

- A. 糖尿病
- B. 严重休克
- C. 血液凝固障碍性疾病
- D. 低血压或严重高血压
- E. 脊柱畸形或脊柱类风湿性关节炎

【正确答案】 A

【答案解析】 硬膜外麻醉禁忌证：

- (1) 严重休克或出血未能纠正者。
- (2) 穿刺部位有感染或全身严重感染者。
- (3) 中枢神经系统疾病。

- (4) 凝血机制障碍性疾病。
- (5) 低血压或严重高血压。
- (6) 慢性腰背痛或术前有头痛史。
- (7) 脊柱畸形或脊柱类风湿性关节炎。
- (8) 精神病而不能合作者。

55. 患者出现软瘫、呼吸无力、吞咽困难时, 血清钾浓度为

- A. $<3.5\text{mmol/L}$
- B. $<3.3\text{mmol/L}$
- C. $<3.2\text{mmol/L}$
- D. $<3.0\text{mmol/L}$
- E. $<2.5\text{mmol/L}$

【正确答案】 E

【答案解析】 血清钾 $<3.5\text{mmol/L}$ 为低钾血症, 当血清钾 $<2.5\text{mmol/L}$ 时, 可出现软瘫、呼吸无力、吞咽困难。

56. 外科输血的适应症中, 急性出血需要输血时, 失血量最少达总血量的

- A. 8%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%
- E. 25%

【正确答案】 B

【答案解析】 外科输血的适应证:

- (1) 急性出血, 当失血量达总血容量的10%~20% (500~1000ml)。
- (2) 贫血或低蛋白血症。
- (3) 凝血机制异常和出血性疾病。
- (4) 重症感染。

57. 下列属于自体输血适应证的是

- A. 血液可能有癌细胞的污染
- B. 胸腹开放性损伤超过4小时
- C. 心、肺、肝、肾功能不全者
- D. 特殊血型, 无相应供血者
- E. 凝血因子缺乏患者

【正确答案】 D

【答案解析】 除D项为自体输血的适应证外, 其他均为禁忌证。

自体输血适应证:

- (1) 有大出血的手术和创伤, 如胸部创伤、脾破裂及异位妊娠破裂及神经外科、骨科、心血管外科、胸腹部手术等。
- (2) 估计出血量在1000ml以上的择期手术, 如主动脉瘤切除、肝叶切除等。
- (3) 血型特殊者 (无相应供血者, 输血困难)。
- (4) 体外循环或低温下的心内直视手术以及其他较大的择期手术与急诊手术, 可考虑采用血液稀释法。

58. 不属术前生理准备的是

- A. 适应性训练
- B. 输血补液

- C. 预防感染
- D. 肠道准备
- E. 明确诊断

【正确答案】 E

【答案解析】 术前一般准备:

1. 心理准备。
2. 生理准备
 - (1) 适应性训练。
 - (2) 输血补液, 改善全身营养及体液状态。
 - (3) 预防感染。
 - (4) 肠道准备: 一般手术, 术前 12 小时禁食, 术前 4 小时禁饮; 对于胃肠道手术病人, 则在术前 3 天开始做肠道准备, 包括进半流质、服用肠道吸收抗生素及服用轻泻剂、术前晚及手术当日晨做清洁灌肠或结肠灌洗。
 - (5) 皮肤准备。

59. 治疗局部肿势已退, 疮口腐肉已尽, 而脓水稀薄色灰, 新肉不生, 状如镜面, 光白板亮, 不知疼痛, 选用的治法为

- A. 凉血清热解毒
- B. 泻热养阴
- C. 清心开窍
- D. 补养气血
- E. 温补脾肾

【正确答案】 E

【答案解析】 该症状为虚陷证。

证候: 局部肿势已退, 疮口腐肉已尽, 而脓水稀薄色灰, 或偶带绿色, 新肉不生, 状如镜面, 光白板亮, 不知疼痛; 全身热不退, 形神委顿, 纳食日减, 或有腹痛便泻, 自汗肢冷, 气息短促; 舌淡, 苔薄白或无苔, 脉沉细或虚大无力。

治法: 温补脾肾。

方药: 附子理中汤加减。

60. 结肠与直肠损伤, 创伤修复的必要条件是

- A. 持续胃肠减压
- B. 使用广谱抗生素
- C. 经腹剪开腹膜返折
- D. 经尾骨旁进入直肠后间隙修补
- E. 乙状结肠转流造口及直肠旁充分引流

【正确答案】 E

【答案解析】 乙状结肠转流造口及直肠旁充分引流是创伤修复的必要条件。

61. 闭式胸膜腔引流, 引流中液体的穿刺部位一般选在

- A. 腋中线第 6 肋间
- B. 腋后线第 7 肋间
- C. 腋中线第 7 肋间
- D. 腋中线和腋后线之间的第 6~8 肋
- E. 腋后线第 8 肋间

【正确答案】 D

【答案解析】 闭式胸膜腔引流的穿刺部位: 液体一般选在腋中线和腋后线之间的第 6~8 肋

间插管引流。

62. 膀胱破裂的临床表现不包括

- A. 休克
- B. 腹痛
- C. 尿频
- D. 血尿
- E. 排尿困难

【正确答案】 C

【答案解析】 膀胱破裂可产生休克、腹痛、排尿困难和血尿等。

63. 兽咬伤前驱期治宜

- A. 凉血解毒
- B. 解毒固脱
- C. 祛风解毒
- D. 清热解毒
- E. 泻火解毒

【正确答案】 C

【答案解析】 兽咬伤前驱期治宜祛风解毒，方用人参败毒散加减。

64. 肺癌转移引起的体征最常见的为

- A. 锁骨上淋巴结肿大
- B. 锁骨下淋巴结肿大
- C. 滑车上淋巴结肿大
- D. 腹股沟淋巴结肿大
- E. 腋窝淋巴结肿大

【正确答案】 A

【答案解析】 肺癌转移引起的体征最常见的为锁骨上淋巴结肿大，也可见腋下淋巴结肿大。

65. 肠梗阻的典型症状不包括

- A. 腹痛
- B. 腹胀
- C. 腹泻
- D. 呕吐
- E. 停止排气排便

【正确答案】 C

【答案解析】 典型的肠梗阻具有痛、呕、胀、闭四大症状。

(1) 腹痛：单纯性机械性肠梗阻一般呈阵发性剧烈腹痛；绞窄性肠梗阻往往出现剧烈的持续性腹痛伴有阵发性加重；麻痹性肠梗阻多呈持续性胀痛。

(2) 呕吐。

(3) 腹胀。

(4) 停止排气排便。

66. 急性胆道感染的一般治疗处理错误的是

- A. 输液
- B. 全身支持疗法
- C. 给易消化食物
- D. 给广谱抗生素
- E. 给解痉止痛药

【正确答案】C

【答案解析】急性胆道感染的一般治疗：禁食，输液，纠正水、电解质及酸碱代谢失衡，全身支持疗法；选用广谱抗生素或联合用药；使用维生素K、解痉止痛药等对症处理。

67. 以下甲亢手术治疗指征错误的是

- A. 高功能甲状腺腺瘤
- B. 妊娠早期的甲亢患者
- C. 轻度以上的原发性甲亢
- D. 胸骨后甲状腺肿并发甲亢
- E. 抗甲状腺药物治疗后复发

【正确答案】C

【答案解析】甲亢手术治疗指征包括：

- (1) 中度以上的原发性甲亢。
- (2) 继发性甲亢，或高功能甲状腺腺瘤。
- (3) 胸骨后甲状腺肿并发甲亢。
- (4) 抗甲状腺药物或¹³¹I治疗后复发，或不适宜药物及¹³¹I治疗的甲亢。
- (5) 妊娠早、中期的甲亢患者又符合上述症状者。

68. 上腹饱胀、进食后更明显，朝食暮吐，暮食朝吐，吐出物为宿食残渣及清稀黏液，喜热畏寒，大便溏少，舌质淡红，脉沉弱。治疗首选

- A. 温脾汤
- B. 导痰汤
- C. 丁香透膈散
- D. 大黄黄连泻心汤
- E. 麦门冬汤

【正确答案】C

【答案解析】脾胃虚寒证的证候：上腹饱胀，食后较甚，朝食暮吐，暮食朝吐，吐出物为宿食残渣及清稀黏液，吐后则舒服，畏寒喜热，神疲乏力，大便溏少；舌质淡红，苔白或白滑，脉沉弱。

治法：温中健脾，和胃降逆。

方药：丁香透膈散加减。

69. 慢性肾炎易被误诊为肝硬化的主要原因是

- A. 伴血尿
- B. 伴高血压
- C. 易发生腹水
- D. 尿中有管型
- E. 尿中有大量蛋白

【正确答案】C

【答案解析】慢性肾炎很容易发生腹水而被误诊为肝硬化。

70. 腹股沟直疝时膀胱进入疝囊，成为

- A. 易复性疝
- B. 难复性疝
- C. 滑动性疝
- D. 嵌顿性疝
- E. 绞窄性疝

【正确答案】C

【答案解析】腹股沟直疝的疝内容物常为小肠或大网膜，膀胱有时可进入疝囊，成为滑动性直疝。

71. 白癜风皮损多见的部位为

- A. 手掌、足掌、口鼻
- B. 腹腔脏器、臀部
- C. 胸腔脏器、四肢内侧
- D. 面、颈、手背、躯干、外生殖器
- E. 头面、颈肩、躯干、四肢、口腔黏膜

【正确答案】D

【答案解析】白癜风皮损可发于任何部位，但多见于面、颈、手背、躯干、外生殖器等部位。

72. 道德是在人们社会生活实践中形成的，由

- A. 文化发展决定的
- B. 意识形态决定的
- C. 科技发展决定的
- D. 经济基础决定的
- E. 社会进步决定的

【正确答案】D

【答案解析】道德是人们在社会生活实践中形成的，并由经济基础决定，用善恶标准去评价，以社会舆论、内心信念和传统习俗来调节的人与人、人与社会、人与自然之间关系的原则和规范的总和。

73. 医务人员对患者诚信、宽厚，潜心医学事业，对医学科学忠诚，体现了

- A. 仁爱
- B. 严谨
- C. 诚挚
- D. 公正
- E. 奉献

【正确答案】C

【答案解析】医德品质中诚挚，表现在医生忠诚医学科学、潜心医学事业，对患者讲诚信，具有宽厚、诚挚的人格品德。

74. 医学人道主义的核心内容包括

- A. 尊重病人的生命、人格、权利
- B. 尊重病人的生命、自由、意愿
- C. 尊重病人的人格、尊严、权利
- D. 尊重病人的生命、意愿、尊严
- E. 尊重病人的权利、人格、自由

【正确答案】A

【答案解析】医学人道主义的核心内容包括尊重病人的生命、尊重病人的人格、尊重病人的权利。

75. 下列对于医务人员义务和责任的描述不正确的是

- A. 为患者诊治疾病，尽最大的努力为患者服务
- B. 为患者解除躯体痛苦和精神上的痛苦
- C. 向患者、患者家属说明病情、诊断、治疗和预后
- D. 面对疫情和重大自然灾害，进入疫区、灾区抢救伤员，保护群众健康
- E. 有权要求患者或患者家属配合诊治

【正确答案】E

【答案解析】医务人员义务和责任是一致的，包括：为患者诊治疾病，尽最大的努力为患者服务；为患者解除躯体痛苦和精神上的痛苦；向患者、患者家属说明病情、诊断、治疗和预后；面对疫情和重大自然灾害，进入疫区、灾区抢救伤员，保护群众健康。

76. 医学道德教育的意义在于

- A. 有助于医务人员形成内在品质
- B. 有助于医务人员对病人的尊重、理解、关爱
- C. 有助于医疗服务水平的提高
- D. 促进卫生健康事业发展
- E. 以上都是

【正确答案】E

【答案解析】医学道德教育的意义

- 1. 有助于医务人员形成内在品质，把医学道德原则和规范转化为内心信念。
- 2. 有助于医务人员对病人的尊重、理解、关爱，形成良好的医德医风。
- 3. 有助于医疗服务水平的提高，促进卫生健康事业发展。

77. 国家卫生部关于《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》的制定时间是

- A. 1990年
- B. 1995年
- C. 2000年
- D. 2003年
- E. 2005年

【正确答案】D

【答案解析】卫生部于2003年6月27日颁布《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》

二、A2

78. 患者女性，28岁，手术后出现表情淡漠、嗜睡、烦躁、腹胀、心律加快，心电图早期T波低平、双相倒置，继之S-T段下降、Q-T间期延长和U波出现，属

- A. 轻度脱水
- B. 中度脱水
- C. 重度脱水
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

【正确答案】D

【答案解析】低钾血症临床表现有：

(1) 神经肌肉系统症状表情淡漠、倦怠嗜睡或烦躁不安；肌肉无力为最早表现，表现为肌肉软弱无力，腱反射迟钝或消失，眼睑下垂，后延及躯干四肢；当血清钾 $<2.5\text{mmol/L}$ 时，可出现软瘫、呼吸无力、吞咽困难。

(2) 消化系统症状表现为食欲不振、纳差、口苦、恶心、呕吐、腹胀等，重者可出现肠麻痹。

(3) 循环系统症状低钾可引起心肌兴奋性、自律性增高，传导性降低。表现为心悸、心动过速，心律失常、传导阻滞，严重时出现室颤，心跳停止于收缩状态。

(4) 泌尿系统症状慢性失钾可影响肾小管功能，使之对抗利尿激素不敏感，导致肾脏浓缩功能障碍，出现多饮、多尿、夜尿增多，严重时出现蛋白尿和颗粒管型。

(5) 对酸碱平衡的影响低钾时，细胞内K移至细胞外，细胞外H移入细胞内，细胞内液H浓度增加，而细胞外H浓度降低，出现细胞内酸中毒和细胞外碱中毒并存。此外，因肾小管

上皮细胞内缺钾，故排K减少而排H增多，出现代谢性碱中毒，同时排出反常性酸性尿。

(6) 心电图早期T波低平、双相倒置，继之S-T段下降、Q-T间期延长和U波出现，或T、U波融合。

79. 患者女性，54岁，腋下可触及肿块，皮色不变，灼热疼痛，上肢活动不利，伴恶寒发热，纳差，舌红、苔薄白、脉滑数。治法宜选用

- A. 清热解毒
- B. 散风清热，化痰消肿
- C. 和营祛瘀，清热利湿
- D. 清热利湿解毒
- E. 清肝解郁，消肿化毒

【正确答案】E

【答案解析】腋痈的证候：初起腋下可触及肿块，皮色不变，灼热疼痛，同时上肢活动不利；伴有恶寒发热，纳呆；舌红，苔薄白，脉滑数

治法：清肝解郁，消肿化毒。

方药：柴胡清肝汤加减。

80. 男性患者，26岁，西医诊断为肝破裂，中医辨证为血脱证，宜用方药

- A. 当归补血汤合参附汤
- B. 复元活血汤
- C. 四物汤
- D. 八珍汤
- E. 补阳还五汤

【正确答案】A

【答案解析】肝破裂血脱证选用当归补血汤合参附汤。

肝破裂血脱证的证候：伤后出血过多，突然出现面色爪甲苍白，大汗淋漓，四肢厥冷，口渴，气急烦躁，或倦卧气微，二便失禁；舌淡，唇干或青紫，脉芤或细数。

治法：益气生血，回阳固脱。

方药：当归补血汤合参附汤。

81. 患者，男，28岁，背部一肿物，呈圆形，边界清楚，基部较广泛，可移动，但活动度不大，质软，有假性波动感，与周围组织无粘连。应首先考虑的是

- A. 纤维瘤
- B. 囊状淋巴管瘤
- C. 血管瘤
- D. 脂肪瘤
- E. 神经纤维瘤

【正确答案】D

【答案解析】结合患者的表现可以考虑该患者为脂肪瘤。脂肪瘤临床表现：单发或多发。好发于肩、背、臀部。大小不等，呈圆形、扁圆形或分叶状，边界清楚，基部较广泛，质软，有假性波动感，与周围组织无粘连，基底部可移动，但活动度不大。一般无自觉症状，发展缓慢，极少恶变。

82. 患者，男，5岁，右臂沿神经干走向出现多个肿块，质软，同时皮肤出现大小不等的咖啡色斑块。应首先考虑的是

- A. 皮脂腺囊肿
- B. 神经纤维瘤
- C. 皮样囊肿

D. 脂肪瘤

E. 淋巴管瘤

【正确答案】 B

【答案解析】 从题干中的咖啡色斑块以及结合其他表现可诊断该患者为神经纤维瘤。

神经纤维瘤有如下特点：(1) 呈多发性，数目不定，几个甚至上千个不等。肿物大小不一，米粒至拳头大小，多凸出于皮肤表面，质地或软或硬，有的可下垂或者有蒂，大者可达十数千克。(2) 肿瘤沿神经干走向生长，多呈念珠状，或呈蚯蚓结节状。(3) 皮肤出现咖啡斑，大小不定，可为雀斑小点状，或为大片状，其分布与神经瘤分布无关，是诊断本病的重要依据。

83. 患者，女，26岁，诊断为单纯性甲状腺肿，症见颈部肿大，肿块皮宽质软，伴有神情呆滞，倦怠畏寒，行动迟缓，肢冷，性欲下降，舌淡，脉沉细，选用的治法是

A. 疏肝解郁，健脾益气

B. 疏肝补肾，调摄冲任

C. 疏肝理气，化痰散结

D. 清肝泻胃，解毒消肿

E. 清热解毒，消肿排脓

【正确答案】 B

【答案解析】 肝郁肾虚证的证候：颈部肿块皮宽质软，伴有神情呆滞，倦怠畏寒，行动迟缓，肢冷，性欲下降；舌淡，脉沉细。

治法：疏肝补肾，调摄冲任。

方药：四海舒郁丸合右归丸加减。

84. 患者，女，38岁，西医诊断为慢性淋巴性甲状腺炎。症见颈前肿痛，胸闷不适，口苦咽干，急躁易怒，心悸多汗；苔薄黄，脉弦数。其证型是

A. 气滞痰凝证

B. 火毒炽盛证

C. 肝郁胃热证

D. 胃火炽盛证

E. 肝郁痰结证

【正确答案】 C

【答案解析】 肝郁胃热证的证候：颈前肿痛，胸闷不适，口苦咽干，急躁易怒，心悸多汗；苔薄黄，脉弦数。

治法：清肝泄胃，解毒消肿。

方药：普济消毒饮与丹栀逍遥散加减。

85. 患者，女，32岁，乳房肿块较小，发展缓慢，不红不热，不觉疼痛，推之可移，伴胸闷叹息；舌质正常，苔薄白，脉弦，治疗首选的方剂为

A. 逍遥散

B. 二仙汤

C. 失笑散合开郁散

D. 逍遥散合桃红四物汤

E. 桃红四物汤合失笑散

【正确答案】 A

【答案解析】 乳房纤维腺瘤—肝气郁结证的证候：肿块较小，发展缓慢，不红不热，不觉疼痛，推之可移，伴胸闷叹息；舌质正常，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝解郁，化痰散结。

方药：逍遥散加减。

86. 患者男性，45岁，消化性溃疡反复发作20年，近1个月来出现食欲减退，上腹部饱胀及沉重感，呕吐频繁，呕吐量大且含有酸臭味的宿食，呕吐物中不含胆汁，吐后上腹饱胀减轻，腹痛消失，明显消瘦，可见到上腹部的胃蠕动波、胃型、胃震水声，应诊断为

- A. 消化性溃疡合并幽门梗阻
- B. 肠梗阻
- C. 贲门梗阻
- D. 弥漫性腹膜炎
- E. 食管癌

【正确答案】A

【答案解析】结合患者的溃疡病史以及胃潴留的症状考虑该患者为消化性溃疡合并幽门梗阻。

87. 患者，男，55岁，尿频、进行性排尿困难1年。应首先考虑的是

- A. 急性前列腺炎
- B. 膀胱结石
- C. 前列腺增生症
- D. 肾结石
- E. 尿道结石

【正确答案】C

【答案解析】结合患者的症状首先考虑该患者为前列腺增生症。

前列腺增生症患者早期表现为尿频，进行性排尿困难是前列腺增生症最重要的症状。

88. 患者，男，52岁，左下肢发凉，间歇性跛行1年，冠心病史3年，心电图检查示：冠状动脉供血不足。应首先考虑的是

- A. 下肢深静脉血栓形成
- B. 动脉硬化性闭塞症
- C. 单纯性下肢静脉曲张
- D. 血栓闭塞性脉管炎
- E. 干性坏疽

【正确答案】B

【答案解析】结合患者冠心病病史，左下肢发凉、间歇性跛行的症状，以及心电图检查可以考虑该患者为动脉硬化性闭塞症。

89. 患者，女，23岁，小便不畅、短涩，淋漓不尽，带下多，酒后或疲劳易复发；腰酸腿软，五心烦热，食少纳差；舌红，苔少，脉细数，可初步诊断为

- A. 梅毒-肝经湿热证
- B. 梅毒-血热蕴毒证
- C. 梅毒-毒结筋骨证
- D. 淋病-湿热毒蕴证
- E. 淋病-阴虚毒恋证

【正确答案】E

【答案解析】该患者可考虑为淋病-阴虚毒恋证（慢性淋病）。

证候：小便不畅、短涩，淋漓不尽，女性带下多，或尿道口见少许黏液，酒后或疲劳易复发；腰酸腿软，五心烦热，食少纳差；舌红，苔少，脉细数。

治法：滋阴降火，利湿祛浊。

方药：知柏地黄丸酌加土茯苓、萆薢等。

三、A3/A4

男, 38岁, 右下胸撞伤6小时, 伤后感上腹部疼痛, 头晕。查体: BP90/70mmHg, P110次/分, 右腹部压痛、反跳痛、肌紧张较明显, 腹部叩鼓音, 肠鸣音减弱, 移动性浊音阳性。辅助检查: Hb92g/L, WBC 12×10^9 /L, X线透视示肝阴影扩大、右膈抬高。面色苍白, 大汗淋漓, 四肢厥冷, 舌淡, 唇青紫, 脉细数。

90. 首先应考虑的诊断是

- A. 外伤性血气胸
- B. 肝破裂
- C. 右肾破裂
- D. 肝、结肠破裂
- E. 胃、十二指肠穿孔

【正确答案】 B

【答案解析】 根据题干, 患者明确外伤史, 上腹痛, 腹膜刺激征, 移动性浊音阳性, X线示肝阴影扩大, 右膈抬高等, 首先考虑外伤导致的肝破裂, 故本题正确答案选B。

91. 该患者中医辨证为

- A. 气滞血瘀证
- B. 气脱证
- C. 血脱证
- D. 气血两虚证
- E. 肝郁气滞证

【正确答案】 C

【答案解析】 肝破裂-血脱证: 伤后出血过多, 突然出现面色爪甲苍白, 大汗淋漓, 四肢厥冷, 口渴, 气急烦躁, 或倦卧气微, 二便失禁; 舌淡, 唇干或青紫, 脉芤或细数。故本题正确答案选C。

92. 对应的中医治疗选用的方剂为

- A. 复元活血汤
- B. 参附汤加减
- C. 四物汤加减
- D. 当归补血汤合参附汤
- E. 柴胡疏肝散加减

【正确答案】 D

【答案解析】 肝破裂-血脱证, 治法: 益气生血, 回阳固脱。方药: 当归补血汤合参附汤。故本题正确答案选D。

患者, 男, 42岁, 突发上腹剧烈疼痛入院。进食前一般状况可, 饱餐后出现上述症状, 伴有恶心呕吐、高热寒战, 无呕吐、腹泻。既往十二指肠溃疡病史5年, 吸烟、饮酒史17年。查体: T38.6℃, P126次/分, 面色苍白、冷汗、肢冷脉细, 强迫体位, 呼吸表浅, 全腹压痛、反跳痛, 呈板状腹, 叩鼓音, 肝浊音界缩小, 移动性浊音阳性, 肠鸣音减弱。立位腹部DR见半月形膈下游离气体。

93. 首先考虑的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性阑尾炎穿孔
- D. 胃、十二指肠溃疡急性穿孔
- E. 胃癌

【正确答案】D

【答案解析】胃、十二指肠溃疡急性穿孔诊断：（1）多数病人有溃疡病史，且近期有溃疡病活动症状。（2）突然发生的持续性上腹部剧烈疼痛，迅速发展到全腹，并常伴有轻度休克症状。（3）检查时有明显的腹膜刺激征，并多有肝浊音界缩小或消失。故本题正确答案选D。

94. 不属于该疾病非手术适应症的是

- A. 腹腔积液少，无腹胀
- B. 合并出血、梗阻等并发症
- C. 不伴有休克及重要脏器严重病变
- D. 感染中毒症状不明显
- E. 一般情况良好

【正确答案】B

【答案解析】胃、十二指肠溃疡急性穿孔非手术治疗适应症：（1）穿孔小或空腹穿孔，就诊比较早，腹腔积液少，无腹胀，一般情况好，感染中毒症状不明显，不伴有休克及重要脏器严重病变者。（2）单纯性溃疡穿孔，无合并出血、梗阻、癌变或再穿孔等溃疡病的严重并发症。（3）年龄较轻，溃疡病史不长，非顽固性溃疡。（4）就诊时腹腔炎症已有局限趋势者。

95. 诊断该疾病的主要依据是

- A. 上腹部剧痛
- B. 板状腹
- C. 膈下有游离气体
- D. 进食后发病
- E. 肝浊音界缩小

【正确答案】C

【答案解析】胃、十二指肠溃疡急性穿孔X线检查：在立位腹部透视或摄片时可见半月形的膈下游离气体影，对诊断有重要意义。故正确答案选C。

患者，男，34岁，自觉肛门肿胀、疼痛有异物感2周。排便后肛门有突起的肿块，疼痛剧烈，活动受限，甚至坐卧不安。检查可见肛周有暗紫色椭圆形肿块突起，表面水肿。触之质硬，剧痛，不能活动。

96. 首先考虑的诊断为

- A. 内痔Ⅰ期
- B. 内痔Ⅱ期
- C. 血栓性外痔
- D. 结缔组织性外痔
- E. 肛周脓肿

【正确答案】C

【答案解析】血栓性外痔（葡萄痔）：因便秘或排便时用力努挣，致使肛门静脉丛破裂，血液漏出血管外所形成的静脉血栓。可见肛门缘周围有暗紫色椭圆形肿块突起，表面水肿，且指检时触之质硬，剧痛，不能活动。故本题正确答案选C。

97. 适用于各期内痔、外痔感染发炎及手术后换药的是

- A. 熏洗法
- B. 塞药法
- C. 枯痔法
- D. 外敷法

E. 冷冻疗法

【正确答案】D

【答案解析】外敷法：适用于各期内痔、外痔感染发炎及手术后换药。常用消痔散、五倍子散等药物外敷患处，以清热消肿止痛、收敛止血。故本题正确答案选D。

98. 风伤肠络证的首选方为

- A. 凉血地黄汤或槐花散加减
- B. 脏连丸加减
- C. 止痛如神汤加减
- D. 补中益气汤加减
- E. 青蒿鳖甲汤合三妙丸加减

【正确答案】A

【答案解析】风伤肠络证—证候：大便带血，滴血或呈喷射状出血，血色鲜红，或有肛门瘙痒；舌红，苔薄白或薄黄，脉浮数。治法：清热凉血祛风。方药：凉血地黄汤或槐花散加减。故本题正确答案选A。

四、B

- A. 药味加减的变化
- B. 药量增减的变化
- C. 剂型更换的变化
- D. 药味加减与药量增减变化的联合运用
- E. 药味加减与剂型更换变化的联合运用

99. 由四逆汤化裁为通脉四逆汤属于

【正确答案】B

【答案解析】通脉四逆汤是四逆汤酌增附子、干姜用量化裁而成，属于药量增减的变化。

100. 由逍遥散化裁为黑逍遥散属于

【正确答案】A

【答案解析】黑逍遥散，为逍遥散加地黄，治逍遥散证而血虚较甚者。因此由逍遥散化裁为黑逍遥散属于药味加减的变化。

- A. 芍药、丹皮、生地、犀角
- B. 地骨皮、桑白皮、粳米、甘草
- C. 生地、木通、竹叶、生甘草梢
- D. 生地、当归、丹皮、黄连、升麻
- E. 石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝

101. 导赤散的组成药物是

【正确答案】C

【答案解析】导赤散的组成是生地、木通、生甘草梢、竹叶。

方歌：导赤生地与木通，草梢竹叶四般功；口糜淋痛小肠火，引热同归小便中。

102. 玉女煎的组成药物是

【正确答案】E

【答案解析】玉女煎组成是石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝。

方歌：玉女煎用熟地黄，膏知牛膝麦冬襄；胃火阴虚相因病，牙痛齿衄宜煎尝。

- A. 肝、脾
- B. 脾、胃
- C. 脾、肾
- D. 肝、胃、肾

E. 肝、肾

103. 吴茱萸汤主证病机涉及的主要脏腑是

【正确答案】D

【答案解析】吴茱萸汤主因肝胃肾虚寒、浊阴上逆而发，涉及的主要脏腑为肝、胃、肾。

104. 理中丸主证病机涉及的主要脏腑是

【正确答案】B

【答案解析】理中丸证由中焦脾胃虚寒所致，涉及的主要脏腑包括脾、胃。

A. 山茱萸、牛膝

B. 炮附子、肉桂

C. 炮附子、山茱萸

D. 枸杞子、菟丝子

E. 鹿角胶、龟板胶

105. 左归丸和右归丸两方的组成药物中均含有

【正确答案】D

【答案解析】左归丸的组成是怀熟地、炒山药、枸杞、山茱萸、川牛膝、鹿角胶、龟板胶、菟丝子。

方歌：左归丸内山药地，萸肉枸杞与牛膝；菟丝龟鹿二胶合，壮水之主第一方。

右归丸的组成是熟地黄、山药、山茱萸、枸杞子、菟丝子、鹿角胶、杜仲、肉桂、当归、制附子。

方歌：右归丸中地附桂，山药萸萸菟丝归；杜仲鹿胶枸杞子，益火之源此方魁。

106. 肾气丸和地黄饮子两方组成药物中均含有

【正确答案】C

【答案解析】肾气丸组成是干地黄、山萸肉、山药、泽泻、牡丹皮、茯苓、桂枝、炮附子。

方歌：金匮肾气治肾虚，地黄淮药及山萸；丹皮苓泽加桂附，水中生火在温熙。

地黄饮子的组成是熟干地黄、巴戟天、炒山茱萸、石斛、肉苁蓉、炮附子、五味子、官桂、白茯苓、麦门冬、菖蒲、远志、生姜、大枣。

方歌：地黄饮子山茱斛，麦味菖蒲远志苁；苁蓉桂附巴戟天，少入薄荷姜枣服。

A. 枳实消痞丸

B. 厚朴温中汤

C. 天台乌药散

D. 半夏厚朴汤

E. 柴胡疏肝散

107. 具有行气疏肝，散寒止痛功用的方剂是

【正确答案】C

【答案解析】天台乌药散擅长行气疏肝、散寒止痛。

108. 具有行气散结，降逆化痰功用的方剂是

【正确答案】D

【答案解析】半夏厚朴汤擅长行气散结，降逆化痰。枳实消痞丸化湿热、消痞满；厚朴温中汤行气除满、温中燥湿；天台乌药散行气疏肝，散寒止痛；柴胡疏肝散疏肝行气、活血止痛。

A. 镇肝息风，滋阴潜阳

B. 滋阴柔筋，潜阳息风

C. 凉肝息风，增液舒筋

D. 镇肝息风，滋阴安神

E. 祛风除湿，化痰通络，活血止痛

109. 小活络丹的功用是

【正确答案】 E

【答案解析】 小活络丹的功用是祛风除湿，化痰通络，活血止痛。主治风寒湿痹。

110. 大定风珠的功用是

【正确答案】 B

【答案解析】 大定风珠的功用是滋阴柔筋，潜阳息风。主治阴虚风动证。

- A. 结核病
- B. 急性喉炎
- C. 疟疾
- D. 败血症
- E. 伤寒

111. 稽留热可见于

【正确答案】 E

【答案解析】 稽留热：体温持续于 $39^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 以上，24 小时波动范围不超过 1°C ，达数日或数周。见于肺炎链球菌性肺炎、伤寒、斑疹伤寒等的发热极期。

112. 弛张热可见于

【正确答案】 D

【答案解析】 弛张热：体温在 39°C 以上，但波动幅度大，24 小时内体温差达 2°C 以上，最低时仍高于正常水平。常见于败血症、风湿热、重症肺结核、化脓性炎症等。

- A. 急性和亚急性肝坏死
- B. 肝囊肿
- C. 大量腹水
- D. 急性腹膜炎
- E. 肺源性心脏病，右心室肥大

113. 可出现液波震颤的为

【正确答案】 C

【答案解析】 液波震颤：检查时患者仰卧，医师用手掌面贴于患者腹壁一侧，以另一手并拢屈曲的四指指端迅速叩击腹壁另一侧，如腹腔内有大量游离液体时，贴于腹壁的手掌就可感到液波的冲击，称为液波震颤。

114. 可出现腹壁紧张，伴有压痛、反跳痛的为

【正确答案】 D

【答案解析】 反跳痛表示炎症已波及腹膜壁层，腹肌紧张伴压痛、

- A. 上界为膈及肺下缘，左界为脾脏
- B. 腋中线上第 9~11 肋间，宽约 4~7cm，前方不超过腋前线
- C. 耻骨上方圆形浊音区
- D. 上界为右锁骨中线上第 5 肋间
- E. 脐部鼓音

115. 正常肝浊音区为

【正确答案】 D

【答案解析】 匀称体型者的正常肝上界在右锁骨中线上，第 5 肋间，下界位于右季肋下缘

116. 正常脾浊音区为

【正确答案】 B

【答案解析】 正常脾浊音区在左腋中线上第 9~11 肋间，宽约 4~7cm，前方不超过腋前线。

- A. 两肺满布哮鸣音

- B. 局限性哮鸣音
- C. 呼吸音增强
- D. 胸膜摩擦音
- E. 呼吸音消失

117. 气胸的临床表现有

【正确答案】 E

【答案解析】 气胸

- (1) 望诊患侧胸廓饱满, 肋间隙增宽, 呼吸动度减弱或消失。
- (2) 触诊气管移向对侧, 患侧语音震颤减弱或消失。
- (3) 叩诊患侧呈鼓音。左侧气胸时, 心界叩不出; 右侧气胸时, 肝浊音界下移。
- (4) 听诊患侧呼吸音减弱或消失。

118. 干性胸膜炎的临床表现有

【正确答案】 D

【答案解析】 胸膜摩擦音是干性胸膜炎的重要体征, 主要见于以下几种情况: ①胸膜炎症: 如结核性胸膜炎、化脓性胸膜炎以及其他原因引起的胸膜炎症。②原发性或继发性胸膜肿瘤。③肺部病变累及胸膜: 如肺炎、肺梗死等。④胸膜高度干燥: 如严重脱水等。⑤其他: 如尿毒症等。

- A. 肺泡呼吸音正常
- B. 肺泡呼吸音消失
- C. 肺泡呼吸音增强
- D. 肺泡呼吸音延长
- E. 以上都不正确

119. 发热患者

【正确答案】 C

【答案解析】 肺泡呼吸音增强: 双侧肺泡呼吸音增强见于运动、发热、甲状腺功能亢进症; 肺脏或胸腔病变使一侧或一部分肺的呼吸功能减弱或丧失, 则健侧或无病变部分的肺泡呼吸音可出现代偿性增强。

120. 大量胸腔积液

【正确答案】 B

【答案解析】 肺泡呼吸音减弱或消失: 见于呼吸运动障碍, 如全身衰弱、呼吸肌瘫痪、腹压过高、胸膜炎、肋骨骨折、肋间神经痛等; 呼吸道阻塞, 如支气管炎、支气管哮喘、喉或大支气管肿瘤等; 肺顺应性降低, 如肺气肿、肺淤血、肺间质炎症等; 胸腔内肿物, 如肺癌等; 胸膜疾患, 如胸腔积液、气胸、胸膜增厚及粘连等。

- A. 脊柱后凸
- B. 脊柱前凸
- C. 脊柱生理性弯曲
- D. 姿势性侧凸
- E. 器质性侧凸

121. 正常人的脊柱立位时从侧面观可见

【正确答案】 C

【答案解析】 (了解) 正常人的脊柱立位时从侧面观可见脊柱生理性弯曲。

122. 由于儿童发育期坐、立姿势经常不端正可致

【正确答案】 D

【答案解析】 脊柱侧凸: 姿势性侧凸多见于儿童发育期坐立位姿势不良、椎间盘突出症、脊

髓灰质炎等；器质性侧凸时，改变体位不能使侧凸得到纠正，见于佝偻病、脊椎损伤、胸膜肥厚等。

- A. 脓血便
- B. 鲜血便
- C. 柏油样便
- D. 灰白色便
- E. 稀糊状便

123. 阻塞性黄疸为

【正确答案】 D

【答案解析】 灰白色便见于阻塞性黄疸。

124. 上消化道出血为

【正确答案】 C

【答案解析】 正常成人的粪便为黄褐色圆柱状软便，婴儿粪便呈金黄色。

(1) 水样或粥样稀便见于各种感染性或非感染性腹泻，如急性胃肠炎、甲状腺功能亢进症等。

(2) 米泔样便见于霍乱。

(3) 黏液脓样或脓血便见于痢疾、溃疡性结肠炎、直肠癌等。阿米巴痢疾时，以血为主，呈暗红色果酱样；细菌性痢疾则以黏液脓样或脓血便为主。

(4) 冻状便见于肠易激综合征、慢性菌痢。

(5) 鲜血便多见于肠道下段出血，如痔疮、肛裂、直肠癌等。

(6) 柏油样便见于各种原因引起的上消化道出血。

(7) 灰白色便见于阻塞性黄疸。

(8) 细条状便多见于直肠癌。

(9) 绿色粪便提示消化不良。

(10) 羊粪样便多见于老年人及经产妇排便无力者。

- A. 血尿
- B. 血红蛋白尿
- C. 胆红素尿
- D. 乳糜尿
- E. 脓尿

125. 肾盂肾炎患者可出现

【正确答案】 E

【答案解析】 脓尿和菌尿见于泌尿系统感染，如肾盂肾炎、膀胱炎等。

126. 血小板减少性紫癜时可出现

【正确答案】 A

【答案解析】 血尿：每升尿液中含血量 $>1\text{ml}$ ，即可出现淡红色，称为肉眼血尿。血尿见于泌尿系统炎症、结石、肿瘤、结核等；也可见于血液系统疾病，如血小板减少性紫癜、白血病等。

- A. T波
- B. Q-T间期
- C. P波
- D. QRS波群
- E. S-T段

127. 代表心室除极和复极总时间的是

【正确答案】 B

【答案解析】 Q-T 间期: 从 QRS 波群的起点至 T 波终点, 代表左、右心室除极与复极全过程的时间。

128. 反映心室早期缓慢复极的电位和时间变化的是

【正确答案】 E

【答案解析】 S-T 段: 从 QRS 波群终点至 T 波起点的一段平线, 反映心室早期缓慢复极的电位和时间变化。

- A. 梨形心
- B. 靴形心
- C. 主动脉型心脏
- D. 横位心
- E. 悬滴状心

129. 高血压心脏病心脏呈

【正确答案】 B

【答案解析】 高血压心脏病: X 线表现为左心室扩大, 主动脉增宽、延长、迂曲, 心脏呈靴形。

130. 风湿性心脏病单纯二尖瓣狭窄的心脏呈

【正确答案】 A

【答案解析】 单纯二尖瓣狭窄: X 线表现为左心房及右心室增大, 左心耳部凸出, 肺动脉段突出, 主动脉结及左心室变小, 心脏呈梨形。

- A. 胸椎
- B. 骶和干骺端
- C. 颈椎
- D. 腰椎
- E. 膝关节

131. 长骨结核好发于

【正确答案】 B

【答案解析】 长骨结核好发于骶和干骺端。

132. 脊椎结核好发于

【正确答案】 D

【答案解析】 脊椎结核好发于腰椎, 可累及相邻的两个椎体, 附件较少受累。

- A. 寒痛
- B. 气痛
- C. 湿痛
- D. 痰痛
- E. 瘀血痛

133. 疼痛轻微, 或隐隐作痛, 皮色不变, 压之酸痛的是

【正确答案】 D

【答案解析】 痰痛: 疼痛轻微, 或隐隐作痛, 皮色不变, 压之酸痛。见于脂瘤、肉瘤等。

134. 皮色不红、不热, 酸痛, 多见于脱疽的是

【正确答案】 A

【答案解析】 寒痛: 皮色不红、不热, 酸痛, 得温则痛缓。见于脱疽、寒痹等。

- A. 急性肠梗阻
- B. 感染性休克

- C. 肺炎高热
- D. 肾小管性酸中毒
- E. 挤压综合征

135. 低渗性缺水的常见病因是

【正确答案】 D

【答案解析】 低渗性缺水的病因:

- (1) 胃肠道消化液长时间持续丧失。
- (2) 大创面慢性渗液。
- (3) 大量应用排钠性利尿剂(如噻嗪类、利尿酸等)时未注意适量补充钠盐。
- (4) 急性肾功能衰竭多尿期、失盐性肾炎、肾小管性酸中毒。

136. 等渗性缺水的常见病因是

【正确答案】 A

【答案解析】 等渗性缺水的病因:

- (1) 消化液的急性丢失, 如大量呕吐、腹泻、肠瘘等。
- (2) 体液在所谓“第三间隙”中积聚, 如肠梗阻、急性弥漫性腹膜炎、腹膜后感染等病变时, 大量体液聚积于肠腔、腹腔或软组织间隙。
- (3) 大面积烧伤。

- A. 皮肤及其网状淋巴管的急性炎症
- B. 一个毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染
- C. 皮下筋膜下蜂窝组织急性炎症
- D. 多个相邻毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染
- E. 足癣感染, 足背及小腿出现红丝, 局部肿胀, 行动不便

137. “发”是指

【正确答案】 C

【答案解析】 发是指皮下筋膜下蜂窝组织急性炎症。

138. “红丝疔”是指

【正确答案】 E

【答案解析】 红丝疔多发于下肢小腿部位, 先有足部疔或足癣感染, 上延红丝, 常伴有发热, 头痛, 行动不便, 局部肿胀、压痛; 重者畏寒, 纳呆; 舌红, 苔黄腻, 脉数。

- A. 人参养荣汤
- B. 四妙勇安汤
- C. 四逆加人参汤
- D. 益胃汤合参苓白术散
- E. 黄连解毒汤合犀角地黄汤

139. 治疗冷伤之气血两虚证首选

【正确答案】 A

【答案解析】 气血两虚证的证候: 头晕目眩, 少气懒言, 四肢倦怠, 面色苍白或萎黄, 疮口不收; 舌淡, 苔白, 脉沉细弱或虚大无力。

治法: 益气养血, 祛瘀通脉。

方药: 人参养荣汤加减。

140. 治疗冷伤之阴盛阳衰证首选

【正确答案】 C

【答案解析】 阴盛阳衰证的证候: 四肢厥逆, 恶寒蜷卧, 极度疲乏, 昏昏欲睡, 呼吸微弱; 苔白, 脉沉微细。

治法：回阳救逆，温通血脉。

方药：四逆加人参汤加减。

- A. 行气活血，通腑泻热
- B. 通腑泻热，利湿解毒
- C. 通腑排毒，养阴清热
- D. 行气活血，通腑攻下
- E. 活血清热，通里攻下

141. 急性阑尾炎瘀滞证选用的治法是

【正确答案】 A

【答案解析】 瘀滞证的证候：转移性右下腹痛，呈持续性、进行性加剧，右下腹局限性压痛或拒按；伴恶心纳差，可有轻度发热；苔白腻，脉弦滑或弦紧。

治法：行气活血，通腑泻热。

方药：大黄牡丹汤合红藤煎剂加减。

142. 急性阑尾炎湿热证选用的治法是

【正确答案】 B

【答案解析】 湿热证的证候：腹痛加剧，右下腹或全腹胀痛、反跳痛，腹皮挛急，右下腹可摸及包块；壮热，恶心纳差，便秘或腹泻；舌红苔黄腻，脉弦数或滑数。

治法：通腑泻热，利湿解毒。

方药：大黄牡丹汤合红藤煎剂加败酱草、白花蛇舌草、蒲公英。

- A. 草酸盐结石
- B. 磷酸盐结石
- C. 尿酸盐结石
- D. 胱氨酸结石
- E. 以上均非

143. X线片上显影佳，多在上尿路发生的是

【正确答案】 A

【答案解析】 草酸盐（钙）结石：含钙多，棕褐色，坚硬，粗糙不规则，呈桑葚状，X线片上显影佳，多在上尿路发生。

144. X线片上不显影，多在肾、输尿管发生的是

【正确答案】 C

【答案解析】 尿酸盐结石：黄色或红棕色，质硬，表面光滑，X线片上不显影，多在肾、输尿管发生。

- A. 一期梅毒
- B. 二期梅毒
- C. 三期梅毒
- D. 潜伏梅毒
- E. 胎传梅毒

145. 主要表现为硬下疳的是

【正确答案】 A

【答案解析】 一期梅毒主要表现为疳疮（硬下疳）

146. 主要表现为杨梅疮的是

【正确答案】 B

【答案解析】 二期梅毒主要表现为杨梅疮。

- A. 神灵主义医学模式
- B. 自然哲学医学模式
- C. 机械论医学模式
- D. 生物医学模式
- E. 生物-心理-社会医学模式

147. 把人比作机器, 疾病是机器某部分零件失灵, 用机械观解释一切人体现象的医学模式是

【正确答案】 C

【答案解析】 16~17世纪, 欧洲文艺复兴运动带来了工业革命, 推动了科学进步, 也影响了医学。把人比作机器, 用机械观解释一切人体现象, 把疾病看作人体某部分零件失灵。这种医学模式忽视了生命的生物复杂性和社会复杂性。

148. 认为心理、社会因素与疾病的发生、发展、转化有着密切的联系医学模式是

【正确答案】 E

【答案解析】 生物-心理-社会医学模式认为人的心理与生理、精神及躯体、机体内环境相互作用, 心理、社会因素与疾病的发生、发展、转化有着密切的联系。认识人类的健康和疾病, 既要考虑生物学因素, 又要重视心理、社会因素的影响。维护人的健康、治疗人的疾病需应用生物、心理、社会诸多学科、技术的方法。

- A. 体现了医务人员对病人、集体和社会所负的道德责任
- B. 主要包括情感、责任感和事业感
- C. 促使医务人员关怀、体贴病人, 并于病痛危难之时全力救护
- D. 促使医务人员在任何情况下, 都能坚守医学道德原则和规范要求, 抵制不正之风
- E. 促使医务人员养成良好的医护作风, 提高责任感

149. 体现医学道德审慎作用的是

【正确答案】 E

【答案解析】 审慎即周密谨慎, 指医务人员在医疗行为之前的周密思考和医疗过程中的谨慎认真, 是医务人员在世代相袭的职业传统中形成的稳定的职业心理和习惯。坚持审慎的医疗作风, 才能提高医疗质量, 防止医疗差错、误诊和医疗事故。审慎的道德要求: 医务人员在医疗实践的各个环节, 自觉地做到认真负责、谨慎小心、一丝不苟; 不断提高业务水平, 在技术上做到精益求精。

150. 体现医学道德情感作用的是

【正确答案】 C

【答案解析】 医学道德情感是医务人员对患者、对医疗卫生工作的职业态度和内心体验, 是建立在对患者的生命和健康高度负责基础上的。医务人员的情感有三个特点: 医学职业的特殊性、理智性、纯洁性。医务人员情感的内容包括: ①同情感: 见到患者的遭遇和不幸, 在自己的情感上产生怜悯之情, 产生愿为其解除病痛的感觉; ②责任感; ③事业感。

第三单元

1. 类癌综合征的表现不包括

- A. 高钙血症
- B. 皮肤潮红
- C. 水样腹泻
- D. 阵发性心动过速
- E. 哮喘样支气管痉挛

【正确答案】 A

【答案解析】 类癌综合征表现为哮喘样支气管痉挛、阵发性心动过速、水样腹泻、皮肤潮红

等。

2.关于肺癌的中医病因论述不正确的是

- A. 正气虚损
- B. 痰浊聚肺
- C. 禀赋不足
- D. 烟毒内蕴
- E. 邪毒侵肺

【正确答案】 C

【答案解析】 肺癌的中医病因包括正气虚损、痰浊聚肺、情志失调、烟毒内蕴、邪毒侵肺等。

3.对于肺心病和冠心病心衰的鉴别诊断没有意义的是

- A. 年龄因素
- B. 慢性心、肺疾病病史及体征
- C. 心电图检查
- D. X线检查有无心房、心室的增大
- E. 肺功能检查

【正确答案】 A

【答案解析】 慢性肺心病无典型心绞痛或心肌梗死的临床表现,多有胸、肺疾病史,心电图中心电图 ST-T 改变多不明显,类似陈旧性心肌梗死的图形多出现于慢性肺心病急性发作期和明显右心衰竭时,随着病情好转,异常程度可减轻;或加做第 1、2 肋的相关导联心电图,可发现异常 Q 波变小或消失;心向量图有助于鉴别。

4.肺动脉高压形成的最重要的因素是

- A. 缺氧
- B. 高碳酸血症
- C. 血容量增多
- D. 呼吸性酸中毒
- E. 血液粘稠度增加

【正确答案】 A

【答案解析】 缺氧、高碳酸血症和呼吸性酸中毒使肺血管收缩、痉挛,其中缺氧是肺动脉高压形成最重要的因素。

5.下列关于急性加重期慢性阻塞性肺疾病的治疗,错误的是

- A. 应用支气管扩张剂
- B. 对于重度及极重度患者可应用糖皮质激素
- C. 高流量吸氧
- D. 根据病原菌类型及药物敏感情况选用抗生素
- E. 根据病情严重程度决定门诊或住院治疗

【正确答案】 C

【答案解析】 慢性阻塞性肺疾病急性加重期应持续低流量吸氧,一般吸入氧浓度为 28%~30%,应避免吸入氧浓度过高,抑制呼吸中枢而引起二氧化碳潴留。

6.诊断原发性支气管肺癌最可靠的手段是

- A. 病史及体征
- B. 胸部影像学检查
- C. 癌标志物检测及基因诊断
- D. 痰脱落细胞学、组织病理学检查
- E. 放射性核素扫描检查

【正确答案】D

【答案解析】痰脱落细胞检查是诊断肺癌的重要方法之一。

病理学检查:取得病变部位组织,进行病理学检查,对肺癌的诊断具有决定性意义。

7.慢性肺源性心脏病控制心力衰竭利尿药的用法错误的是

- A. 小剂量
- B. 短疗程
- C. 持续给药
- D. 选用作用轻的利尿药
- E. 联合使用排钾和保钾利尿剂

【正确答案】C

【答案解析】利尿药用于慢性肺心病控制心衰时,原则上宜选用作用轻的利尿药,小剂量、短疗程、间歇给药、联合使用排钾和保钾利尿剂。

8.在病毒性心肌炎的心电图中最常见的是

- A. 房室传导阻滞
- B. 窦性心动过速
- C. ST段抬高
- D. 阵发性心动过速
- E. 早搏

【正确答案】E

【答案解析】病毒性心肌炎的临床表现:

(1) 心律失常①早搏最常见。②其次为房室传导阻滞,以I度房室传导阻滞多见;还可有束支传导阻滞、阵发性心动过速等。③窦性心动过速。

(2) ST-T改变 ST段压低、T波低平或倒置,合并心包炎可有ST段抬高。

9.室速与心房颤动时心室内差异传导的心电图鉴别,下列哪项最有帮助

- A. 起始向量
- B. 异常QRS波群前长间隙
- C. 异常QRS波群呈右束支阻滞图形
- D. 室性融合波
- E. 以上都不是

【正确答案】D

【答案解析】室速可见室性融合波,房颤QRS波形态通常正常,但当心室率过快,QRS可增宽畸形(室内差异传导)。

10.主动脉瓣关闭不全叩诊时,心脏形态为

- A. 梨形心
- B. 烧瓶心
- C. 球形心
- D. 靴形心
- E. 普大心

【正确答案】D

【答案解析】主动脉瓣关闭不全叩诊:心浊音界向左下扩大,心腰明显,呈靴形。

11.以下不属于缓慢性心律失常病因的是

- A. 迷走神经张力降低
- B. 器质性心脏病
- C. 房室传导阻滞

- D. 病态窦房结综合征
- E. 应用洋地黄

【正确答案】 A

【答案解析】 缓慢性心律失常病因

(1) 缓慢性窦性心律失常①生理状况: 迷走神经张力增高(健康人、老年人、睡眠状态); ②病理状况: 器质性心脏病、甲状腺功能减退、血钾过高, 应用洋地黄、 β 受体阻滞剂等药物。

(2) 房室传导阻滞心肌炎、急性下壁及前壁心肌梗死、原因不明的希-浦系统纤维化、冠心病、高血钾、应用洋地黄以及缺氧等。

(3) 病态窦房结综合征冠心病、原发性心肌病、风湿性心脏病、高血压心脏病、心肌炎、先天性心脏病。

12. 诊断心绞痛最常用的检查方法是

- A. B超
- B. X线片
- C. 心电图
- D. CT造影
- E. 冠状动脉造影

【正确答案】 C

【答案解析】 心电图可发现心肌缺血, 是诊断心绞痛最常用的检查方法。

13. 栓塞最常见于下列哪种病人

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 二尖瓣狭窄伴房颤
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 三尖瓣狭窄

【正确答案】 C

【答案解析】 栓塞最常见于二尖瓣狭窄伴房颤病人。

14. 最常见于二尖瓣狭窄伴房颤病人的是

- A. 心力衰竭
- B. 栓塞
- C. 亚急性感染性心内膜炎
- D. 肺部感染
- E. 心肌梗死

【正确答案】 B

【答案解析】 栓塞最常见于二尖瓣狭窄伴房颤病人。

15. 男性肝硬化患者常出现性欲减退, 睾丸萎缩, 乳房发育, 蜘蛛痣。主要是由于

- A. 垂体功能减低
- B. 雌激素过多
- C. 孕激素过多
- D. 肾上腺皮质激素过多
- E. 以上均不是

【正确答案】 B

【答案解析】 肝功能减退时, 对内分泌激素灭活作用减弱, 主要有雌激素、醛固酮及抗利尿激素增多。由于雄、雌激素平衡失调, 男性患者常有性欲减退、睾丸萎缩、毛发脱落及乳房

发育等。

16. 下列不属于急性胃炎的病因的是

- A. 寒邪客胃
- B. 脾胃湿热
- C. 肝气犯胃
- D. 胃络瘀阻
- E. 肝肾阴虚

【正确答案】 E

【答案解析】 急性胃炎的病因包括：寒邪客胃、脾胃湿热、食积气滞、肝气犯胃、胃络瘀阻、脾胃虚寒、胃阴不足。

17. 上消化道出血主要原因是

- A. 胃炎
- B. 胃癌
- C. 曲张的食管静脉破裂
- D. 消化性溃疡
- E. 胃黏膜脱垂症

【正确答案】 D

【答案解析】 消化性溃疡是上消化道出血主要原因。

18. 肝硬化食道静脉曲张破裂大出血并休克时，首选治疗为

- A. 输血
- B. 升压
- C. 止血
- D. 补充液体
- E. 人工冬眠

【正确答案】 A

【答案解析】 肝硬化食道静脉曲张破裂大出血并休克时，首选治疗为输血。紧急输血指征：①当改变体位时出现晕厥、血压下降和心率加快，或心率大于120次/分或收缩压低于90mmHg，或较基础血压下降25%；②失血性休克；③血红蛋白低于70g/L或血细胞比容低于25%。

19. 目前认为哪种细菌是慢性胃炎的一个重要原因

- A. 大肠杆菌
- B. 链球菌
- C. 绿脓杆菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 幽门螺杆菌

【正确答案】 E

【答案解析】 幽门螺杆菌（HP）感染是慢性胃炎的最主要病因。

20. 以下不是胃癌主要转移方式的是

- A. 直接蔓延
- B. 腹腔内种植
- C. 血行转移
- D. 胃肠道播散
- E. 淋巴转移

【正确答案】 D

【答案解析】胃癌的主要转移途径有四种: 直接蔓延, 淋巴结转移, 血行转移, 腹腔内种植。

21. 下列不属于原发性肾病综合征最常见的病理类型的是

- A. 膜性肾病
- B. 糖尿病肾病
- C. 微小病变型肾病
- D. 系膜增生性肾炎
- E. 系膜毛细血管性肾小球肾炎

【正确答案】B

【答案解析】糖尿病肾病属于继发性肾病。原发性NS以微小病变型肾病、系膜增生性肾炎、膜性肾病、系膜毛细血管性肾炎及肾小球局灶节段性硬化5种临床病理类型最为常见。

22. 最易引起尿路感染的细菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 粪链球菌
- D. 变形杆菌
- E. 产气杆菌

【正确答案】B

【答案解析】革兰阴性菌属引起的泌尿系感染约占75%, 阳性菌属约占25%。革兰阴性菌属中以大肠杆菌最为常见, 约占80%; 革兰阳性菌属中以葡萄球菌最为常见。

23. 诊断急性白血病时, 最具有决定性价值的是

- A. 血液检查
- B. CT检查
- C. B超检查
- D. 骨髓象检查
- E. 临床症状

【正确答案】D

【答案解析】对于急性白血病, 骨髓象具有决定性诊断价值。

24. 诊断再障最佳的方法是

- A. 血常规检查
- B. 骨髓穿刺检查
- C. CT检查
- D. 临床症状
- E. 骨髓活检

【正确答案】E

【答案解析】骨髓活检是诊断再障最佳的方法。

25. 胰岛素的主要不良反应是

- A. 过敏反应
- B. 屈光不正
- C. 低血糖反应
- D. 胰岛素性水肿
- E. 注射部位脂肪营养不良

【正确答案】C

【答案解析】胰岛素的主要不良反应是低血糖反应, 其他包括过敏反应、胰岛素性水肿、屈光不正、注射部位脂肪营养不良等。

26. 痛风诊断的金标准为

- A. 血尿酸测定
- B. 尿尿酸测定
- C. 滑囊液检查
- D. X线检查
- E. 超声检查

【正确答案】 C

【答案解析】 滑囊液检查具有确诊意义, 为痛风诊断的“金标准”。

27. 系统性红斑狼疮脏器损害最常见的是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【正确答案】 E

【答案解析】 系统性红斑狼疮临床表现: 肾-狼疮肾炎是 SLE 最常见和严重的临床表现, 可为无症状性蛋白尿和/或血尿、高血压, 甚至肾病综合征、急进性肾炎综合征等, 病情可逐渐进展, 晚期发生尿毒症, 个别患者首诊即为慢性肾衰竭。肾衰竭是 SLE 死亡的常见原因。

28. 脑血管疾病的血管壁病变最常见的是

- A. 动脉炎
- B. 动脉硬化
- C. 血管损伤
- D. 恶性肿瘤
- E. 先天性血管异常

【正确答案】 B

【答案解析】 脑血管疾病的血管壁病变最常见的是动脉硬化, 包括动脉粥样硬化及高血压动脉硬化两种。

29. 纯运动轻偏瘫约占

- A. 30%
- B. 40%
- C. 50%
- D. 60%
- E. 70%

【正确答案】 D

【答案解析】 纯运动性轻偏瘫 (PMH) 是临床中最典型、最常见的腔隙综合征, 约占 60%。

30. 脑栓塞心源性栓子的来源最多见的直接原因是

- A. 风心病
- B. 慢性房颤
- C. 心肌梗死
- D. 感染性心内膜炎
- E. 动脉粥样硬化

【正确答案】 B

【答案解析】 脑栓塞心源性栓子最多见的直接原因是慢性心房颤动, 造成心房附壁血栓脱落, 约占心源性栓子的半数以上。

31. 晚期帕金森病的典型步态是

- A. 小步态
- B. 慌张步态
- C. 蹒跚步态
- D. 间歇跛行
- E. 拖曳步态

【正确答案】 B

【答案解析】 晚期患者自坐位、卧位起立困难，慌张步态。

32. 治疗血管性痴呆痰浊蒙窍证首选的方剂是

- A. 洗心汤
- B. 还少丹
- C. 七福饮
- D. 通窍活血汤
- E. 知柏地黄丸

【正确答案】 A

【答案解析】 痰浊蒙窍证

证候：表情呆痴，智力减退，或哭笑无常，或默默不语，不思饮食，头晕重，脘腹胀满，口多痰涎，气短乏力，舌质淡，苔腻，脉滑或濡。

治法：健脾益气，豁痰开窍。

方药：洗心汤加减。

33. 诊断中毒的重要依据是

- A. 毒物接触史
- B. 不明原因的昏迷
- C. 难以解释的精神改变
- D. 年轻患者不明原因的心律失常
- E. 不明原因的心脏骤停

【正确答案】 A

【答案解析】 毒物接触史是诊断中毒的重要依据。

34. 有机磷杀虫药中毒时患者呼出气体的特异气味是

- A. 烂苹果味
- B. 氨味
- C. 肝臭味
- D. 大蒜味
- E. 汗臭味

【正确答案】 D

【答案解析】 有机磷杀虫药中毒呼出气呈大蒜味儿。

35. 下列各项中，不是热衰竭临床表现的是

- A. 患者先有头痛、头晕、恶心
- B. 典型表现为高热、无汗、昏迷
- C. 热衰竭可有低钠、低钾血症
- D. 热衰竭可有晕厥、抽搐
- E. 热衰竭重者出现循环衰竭

【正确答案】 B

【答案解析】 热衰竭常发生在未适应高温作业的新工人和体弱者。常无高热。患者先有头痛、

头晕、恶心,继有口渴、胸闷、脸色苍白、冷汗淋漓、脉搏细弱、血压偏低。可有晕厥、抽搐。重者出现循环衰竭。可有低钠、低钾血症。

36.虚烦不寐,触事易惊,终日惕惕,胆怯心悸,伴气短自汗,倦怠乏力,宜选

- A. 黄连阿胶汤
- B. 半夏秫米汤
- C. 归脾汤合酸枣仁汤
- D. 安神定志丸合酸枣仁汤
- E. 六味地黄丸

【正确答案】D

【答案解析】不寐心胆气虚证

证候:虚烦不寐,触事易惊,终日惕惕,胆怯心悸,伴气短自汗,倦怠乏力,舌淡,脉弦细。

治法:益气镇惊,安神定志。

方药:安神定志丸合酸枣仁汤加减。

37.下列可以协助诊断不寐的是

- A. 入寐困难,醒后不寐连续1周以上
- B. 入寐困难,醒后不寐连续2周以上
- C. 入寐困难,醒后不寐连续3周以上
- D. 入寐困难,醒后不寐连续4周以上
- E. 入寐困难,醒后不寐连续5周以上

【正确答案】C

【答案解析】不寐诊断

1. 轻者入寐困难或寐而易醒,醒后不寐,连续3周以上,重者彻夜难眠。

2. 常伴有头痛、头昏、心悸、健忘、神疲乏力、心神不宁、多梦等症。

3. 本病证常有饮食不节,情志失常,劳倦、思虑过度,病后,体虚等病史。

38.气虚秘的主要表现是

- A. 大便干结,面色无华,头晕目眩
- B. 大便干结,或不甚干结,欲便不得出
- C. 大便艰涩,腹痛拘急,胀满拒按
- D. 大便并不干硬,虽有便意,但排便困难
- E. 大便干结,如羊屎状,形体消瘦

【正确答案】D

【答案解析】气虚秘

证候:大便并不干硬,虽有便意,但排便困难,用力努挣则汗出短气,便后乏力,面白神疲,肢倦懒言,舌淡苔白,脉弱。

治法:益气润肠。

方药:黄芪汤加减。

39.除哪项外,均为腹痛的常见病因

- A. 外感时邪
- B. 饮食不节
- C. 情志失调
- D. 阳气素虚
- E. 他病转移

【正确答案】E

【答案解析】腹痛的病因为:外感时邪,饮食不节,情志失调,阳气素虚。

40. 下列哪项不是鼓胀的病因

- A. 酒食不节
- B. 情志刺激
- C. 外感六淫
- D. 病后续发
- E. 虫毒感染

【正确答案】 C

【答案解析】 鼓胀的发生，来势缓慢，病因虽与酒食不节，情志所伤，血吸虫感染等有关，但它的直接原因当责之于黄疸、胁痛、积聚等病迁延日久，使肝、脾、肾三脏功能失调，气、血、水瘀积于腹内，以致腹部日渐胀大，而成鼓胀。

41. 水肿的辨证总纲是

- A. 气血
- B. 阴阳
- C. 寒热
- D. 虚实
- E. 表里

【正确答案】 B

【答案解析】 水肿的辨证以阴阳为纲，首辨阳水、阴水，区分其病理属性。

42. 虚劳的病理性性质主要为

- A. 禀赋薄弱，因虚致病
- B. 饮食不节，损伤脾胃
- C. 烦劳过度，损伤五脏
- D. 大病久病，失于调理
- E. 气、血、阴、阳亏虚

【正确答案】 E

【答案解析】 虚劳虽有因虚致病，因病成劳，或因病致虚，久虚不复成劳的不同，但其病理性质，主要为气、血、阴、阳的亏虚。

43. 下列除哪项外均是咯血的治疗方法

- A. 凉血止血
- B. 润肺益气
- C. 滋阴润肺
- D. 清热润肺
- E. 清肝泻火

【正确答案】 B

【答案解析】 咯血的治疗方法包括：清热润肺，宁络止血；清肝泻火，凉血止血；滋阴润肺，宁络止血。

44. 下列不属汗证的病因的是

- A. 营卫不和
- B. 肺气亏虚
- C. 阳气虚衰
- D. 感受暑邪
- E. 热邪郁蒸

【正确答案】 D

【答案解析】 汗证大多由邪客表虚、营卫不和，或肺气亏虚、卫表不固，或阳气虚衰、津液

失摄,或阴虚火旺、虚火烁津,或热邪郁蒸、迫津外泄等所致。

45.提出“治痿者独取阳明”的医著是

- A.《素问》
- B.《证治准绳》
- C.《医学纲目》
- D.《赤水玄珠》
- E.《张氏医通》

【正确答案】 A

【答案解析】《素问·痿论篇》所言“治痿者独取阳明”,是指补脾胃、清胃火、去湿热。

46.急性上呼吸道感染不包括下列哪种疾病

- A.普通感冒
- B.急性咽结膜炎
- C.急性病毒性咽炎
- D.急性支气管炎
- E.急性咽-扁桃体炎

【正确答案】 D

【答案解析】急性上呼吸道感染包括普通感冒、急性病毒性咽炎和喉炎、急性咽-扁桃体炎、急性疱疹性咽峡炎、急性咽结膜炎。

47.下列哪项不是骨髓增生异常综合征的中医病因病机

- A.先天不足
- B.后天失养
- C.肝气不舒
- D.饮食所伤
- E.药毒中伤

【正确答案】 C

【答案解析】骨髓增生异常综合征发病主要与先天不足、后天失调、饮食所伤、药毒中伤等因素相关。

48.黄疸病的最主要的病理因素是

- A.湿邪
- B.热邪
- C.寒邪
- D.疫毒
- E.血瘀

【正确答案】 A

【答案解析】病理因素主要为湿邪,病理性质有阴阳之分。阳黄多因湿热熏蒸,或疫毒伤血,发黄迅速而色鲜明;阴黄多因寒湿阻遏,脾阳不振,发黄持久而色晦暗。

49.下列各项中属于卫生法律的是

- A.《执业医师法》
- B.《医疗机构处理条例》
- C.《医疗机构管理条例》
- D.《药品管理法实施条例》
- E.以上都不是

【正确答案】 A

【答案解析】目前我国现行的由全国人民代表大会常务委员会制定的卫生非基本法律有十部:《食品安全法》、《药品管理法》、《执业医师法》、《国境卫生检疫法》、《传染病防治法》、《红十字会法》、《母婴保健法》、《献血法》、《职业病防治法》、《人口与计划生育法》等。故根据题干要求,正确的选项是A。

50.下列属于主刑的是

- A. 管制
- B. 罚金
- C. 没收财产
- D. 剥夺政治权利
- E. 以上均不是

【正确答案】A

【答案解析】刑罚包括主刑和附加刑。主刑有管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。它们只能单独适用。附加刑有罚金、剥夺政治权利、没收财产。

51.行为人实施违反刑事法律的行为必须承担的法律后果称为

- A. 危害行为
- B. 行政行为
- C. 民事责任
- D. 行政责任
- E. 刑事责任

【正确答案】E

【答案解析】卫生刑事责任是指违反卫生法的行为侵害了《刑法》所保护的社会关系,构成犯罪所应承担的法律后果。故根据题干要求,最佳的选项是E。

52.下列不属于《执业医师法》中行政责任的是

- A. 造成医疗事故
- B. 违反卫生行政规章制度或者技术规范,造成严重后果
- C. 隐匿、伪造或者擅自销毁医学文书及有关资料
- D. 泄露患者隐私,造成严重后果
- E. 未经批准擅自开办医疗机构或者非医师行医构成犯罪的

【正确答案】E

【答案解析】选项E是属于刑事责任的范畴,故此题的最佳选项是E。

53.特殊药品的分类不包括的是

- A. 麻醉药品
- B. 进口药品
- C. 精神药品
- D. 放射性药品
- E. 医疗用毒性药品

【正确答案】B

【答案解析】特殊药品包括麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品,国家对这四类药品实行特殊管理。

54.《中华人民共和国传染病防治法》的立法目的是

- A. 为了预防、控制和消除传染病的发生与流行,保证社会发展
- B. 为了预防、控制和消除传染病的发生与流行,保障人体健康
- C. 为了预防、控制和消除传染病的发生与流行,保证正常的社会秩序
- D. 为了预防、控制和消除传染病的发生与流行,保障人体健康和公共卫生

E. 为了预防、控制和消除传染病的发生与流行, 保障公共卫生秩序

【正确答案】 D

【答案解析】 《传染病防治法》的立法目的是为了预防、控制和消除传染病的发生与流行, 保障人体健康和公共卫生, 制定本法。故正确的选项是 D。

二、A2

55. 韩某, 男, 68岁。肺心病多年, 诊见: 呼吸浅短难续, 声低气怯, 甚则张口抬肩, 倚息不能平卧, 咳嗽, 痰白清稀如沫, 胸闷, 心慌形寒, 汗出, 舌淡, 脉沉细微无力。治疗宜选

- A. 苏子降气汤
- B. 生脉散合血府逐瘀汤
- C. 补肺汤
- D. 涤痰汤
- E. 小青龙汤

【正确答案】 C

【答案解析】 肺心病肺肾气虚证

证候: 呼吸浅短难续, 声低气怯, 甚则张口抬肩, 倚息不能平卧, 咳嗽, 痰白清稀如沫, 胸闷, 心慌形寒, 汗出, 舌淡或暗紫, 脉沉细微无力, 或有结代。

治法: 补肺纳肾, 降气平喘。

方药: 补肺汤加减。

56. 患者, 男, 64岁, 慢性咳嗽咳痰 10余年, 现症见咳逆喘息不得卧, 痰多稀薄, 恶寒发热, 背冷无汗, 渴不多饮, 面色青晦, 舌苔白滑, 脉弦紧。患者可选用的方药是

- A. 小青龙汤加减
- B. 二陈汤合三子养亲汤加减
- C. 桑白皮汤
- D. 生脉散和六君子汤加减
- E. 真武汤

【正确答案】 A

【答案解析】 根据患者的临床症状可以判断属于慢性阻塞性肺疾病的外寒内饮证, 所以本题选择小青龙汤加减。外寒内饮证, 证候: 咳逆喘息不得卧, 痰多稀薄, 恶寒发热, 背冷无汗, 渴不多饮, 或渴喜热饮, 面色青晦, 舌苔白滑, 脉弦紧。治法: 温肺散寒, 解表化饮。方药: 小青龙汤加减。

57. 患者, 男性, 54岁。2月前发现左肩胛骨及左上肢内侧疼痛, 逐渐加重, 伴有低热, 2年前胸部 X线检查正常。查体: 左眼睑下垂, 瞳孔缩小, 眼球内陷。X线显示左前第二肋以上至肺尖部有高密度阴影。诊断应考虑

- A. 肺门淋巴结结核
- B. 急性粟粒型肺结核
- C. 支原体肺炎
- D. 支气管肺癌
- E. 慢性纤维空洞型肺结核

【正确答案】 D

【答案解析】 患者有肺上沟癌压迫颈部交感神经所致同侧霍纳(Horner)综合征(眼睑下垂、眼球内陷、瞳孔缩小、额部少汗等)的表现, 且结合 X线检查可考虑为支气管肺癌。

58. 患者, 男, 28岁, 五天前与朋友聚餐有醉酒史, 之后出现寒战、发热, 胸痛, 咳嗽、咯痰, 呼吸困难, 肺部叩诊呈浊音, 听诊语颤增强可闻及支气管呼吸音, 可考虑该患者为

- A. 肺炎

- B. 肺结核
- C. 支气管哮喘
- D. 慢性阻塞性肺疾病
- E. 原发性支气管肺癌

【正确答案】A

【答案解析】结合患者的醉酒史以及其他临床表现,可以初步考虑该患者为肺炎链球菌肺炎。肺炎链球菌:当受寒、疲劳、醉酒或病毒感染后,由于呼吸道防御功能受损,大量肺炎链球菌被吸入下呼吸道,并在肺泡内繁殖而导致肺炎。(1)症状:寒战、发热,胸痛,咳嗽、咯痰,呼吸困难。(2)体征:①早期肺部无明显异常体征,仅有呼吸幅度减小、叩诊轻度浊音、听诊呼吸音减低和胸膜摩擦音;②肺实变时有叩诊呈浊音、听诊语颤增强和支气管呼吸音等典型体征。消散期可闻及湿啰音;③病变累及胸膜时可有胸膜摩擦音。

59.患者男性,70岁。患咳喘病多年,近来加重,现症见:咳喘,心悸怔忡,不能平卧,动则尤甚,腹部胀满,浮肿,肢冷尿少,面青唇绀,舌胖紫暗,苔白滑,脉沉细结代。西医诊断为慢性呼吸衰竭。其治疗宜首选

- A. 涤痰汤
- B. 独参汤
- C. 补肺汤合参蚘散
- D. 二陈汤合三子养亲汤
- E. 真武汤合五苓散

【正确答案】E

【答案解析】慢性呼吸衰竭-脾肾阳虚证

证候:咳喘,动则尤甚,腹部胀满,浮肿,肢冷尿少,面青唇绀,舌胖紫暗,苔白滑,脉沉细或结代。

治法:温肾健脾,化湿利水。

方药:真武汤合五苓散加减。

60.男性患者,75岁。突然晕厥,查体:神志淡漠,血压85/65mmHg,心率38次/分,四肢湿冷。心电图示急性下壁心肌梗死,III度房室传导阻滞。首选治疗是

- A. 异丙肾上腺素静脉滴注
- B. 阿托品静脉滴注
- C. 安装临时心脏起搏器
- D. 安装永久性心脏起搏器
- E. 肾上腺皮质激素

【正确答案】C

【答案解析】II、III度房室传导阻滞伴有血流动力学障碍:人工心脏起搏器做临时起搏治疗,待阻滞消失后撤除。

61.患者男性,48岁。发作性胸痛1个月,遇劳则发,神疲乏力,气短懒言,心悸自汗,舌质淡暗,胖有齿痕,苔薄白,脉缓弱,每次发作含硝酸甘油后缓解,治疗应首选的方剂是

- A. 血府逐瘀汤
- B. 左归丸
- C. 枳实薤白桂枝汤
- D. 补阳还五汤
- E. 右归丸

【正确答案】D

【答案解析】该患者为心绞痛中医证型之气虚血瘀证,应用补阳还五汤治疗。

气虚血瘀证

证候：胸痛隐隐，时轻时重，遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌质淡暗，舌体胖有齿痕，苔薄白，脉缓弱无力或结、代。

治法：益气活血，通脉止痛。

方药：补阳还五汤加减。

62. 男性，25岁。发现高血压2年，血压最高160/120mmHg。尿蛋白++，血尿素氮28.6mmol/L，血清肌酐442μmol/L，红细胞 $2.6 \times 10^{12}/L$ 。最可能的诊断是

- A. 高血压病Ⅲ期
- B. 高血压危象
- C. 急进型高血压病
- D. 嗜铬细胞瘤
- E. 肾性高血压

【正确答案】E

【答案解析】结合患者的年龄及高血压病史以及肾脏实验室检查指标可以做出诊断。

63. 患者女性，48岁，胸痛部位在乳头外，为刺痛，发作数秒钟，含硝酸甘油1~2秒疼痛即消失，做轻微体力活动亦可缓解。应首先考虑的诊断是

- A. 心绞痛（不典型）
- B. 心脏神经症
- C. 变异型心绞痛
- D. 稳定型心绞痛
- E. 肋间神经痛

【正确答案】B

【答案解析】含服硝酸甘油在1~2分钟后开始起作用，而题干“含硝酸甘油1~2秒疼痛即消失”，显然不是硝酸甘油的作用，而题干患者“为刺痛，做轻微体力活动可缓解”，故考虑为心脏神经症。

64. 患者，女，32岁，胃热隐痛，口舌干燥，五心烦热，渴欲含漱，嘈杂干呕，大便干燥，舌红无苔，舌裂纹少津，脉细数，可以判断患者宜用

- A. 黄芪建中汤
- B. 失笑散合丹参饮加减
- C. 柴胡疏肝散加减
- D. 一贯煎合芍药甘草汤加减
- E. 保和丸加减

【正确答案】D

【答案解析】根据患者的症状可以判断属于急性胃炎的胃阴不足证。

证候：胃热隐痛，口舌干燥，五心烦热，渴欲含漱，嘈杂干呕，大便干燥，舌红无苔，舌裂纹少津，脉细数。

治法：养阴益胃，和中止痛。

方药：一贯煎合芍药甘草汤加减。

所以本题选择D项。

65. 患者女性，53岁，已确诊肝癌。1天前突然出现剧烈腹痛，血腹，休克，最可能是并发

- A. 原发性腹膜炎
- B. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- C. 结核性腹膜炎
- D. 原发性肝癌破裂

E. 门静脉血栓形成

【正确答案】D

【答案解析】结合患者的症状：血腹、休克，考虑为肝癌破裂。

66. 患者男性，50岁。肝硬化腹水明显，1周前呕血，黑便。近日烦躁不安，用很多火柴点不着烟，晚间误将鞋作尿盆。轻度黄疸，两手举起时腕部阵发颤抖。应考虑

- A. 脑贫血
- B. 震颤性麻痹
- C. 氮质血症
- D. 安眠药过量
- E. 肝性脑病

【正确答案】E

【答案解析】肝性脑病是肝硬化最严重的并发症，亦是最常见的死亡原因。主要临床表现为性格行为失常、意识障碍、昏迷。

67. 男性，60岁。上腹隐痛1年，饭后腹胀，食欲减退，体检一般情况尚可。测定基础胃酸排出量减少，胃肠造影胃皱襞少，黏膜粗乱。诊断首先考虑为

- A. 胃溃疡
- B. 慢性萎缩性胃炎
- C. 胃癌
- D. 慢性浅表性胃炎
- E. 胃黏膜脱垂症

【正确答案】B

【答案解析】慢性萎缩性胃炎：患者有上腹饱胀不适、恶心、食欲不振等消化不良症状，但腹部无肿块，无淋巴结肿大，大便隐血试验阴性，依靠X线钡餐造影、胃镜和活组织病理检查可鉴别。

68. 患者，男，55岁。持续性上腹隐痛3个月，多次查大便隐血试验阳性，食欲不振，消瘦。体检：面色苍白，上腹部有压痛，未触及包块，肝、脾肋下未及。下述哪项检查对确诊有帮助

- A. 纤维胃镜加活检
- B. 肝放射性核素扫描
- C. B型超声检查
- D. 血清胃泌素测定
- E. 胃酸测定

【正确答案】A

【答案解析】胃镜结合黏膜活检是诊断胃癌最可靠的手段。

凡有下列情况者，应高度警惕胃癌，并及时进行胃肠钡餐X线检查、胃镜和活组织病理检查，以明确诊断。

- (1) 40岁以后开始出现中上腹不适或疼痛，无明显节律性并伴明显食欲不振和消瘦者。
- (2) 胃溃疡患者，经严格内科治疗而症状仍无好转者。
- (3) 慢性萎缩性胃炎伴有肠上皮化生及轻度不典型增生，经内科治疗无效者。
- (4) X线检查显示胃息肉 $>2\text{cm}$ 者。
- (5) 中年以上患者，出现不明原因贫血、消瘦和粪便隐血持续阳性者。
- (6) 胃大部切除术后10年以上者。

69. 患者，男，38岁，体检发现蛋白尿，但未进行治疗，1年后出现浮肿等，就诊时24小时尿蛋白定量为 5.69g ，表现为面浮身肿，按之凹陷不起，心悸，气促，腰部冷痛酸重，小便

量少,形寒神疲,面色灰滞,舌质淡胖,苔白,脉沉细无力。应选用

- A. 实脾饮加减
- B. 济生肾气丸合真武汤
- C. 左归丸加泽泻、茯苓、冬葵子
- D. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
- E. 越婢加术汤加减

【正确答案】 B

【答案解析】 肾病综合征肾阳衰微证

证候:面浮身肿,按之凹陷不起,心悸,气促,腰部冷痛酸重,小便量少或增多,形寒神疲,面色灰滞,舌质淡胖,苔白,脉沉细或沉迟无力。

治法:温肾助阳,化气行水。

方药:济生肾气丸合真武汤。

70. 罗某,男性,21岁,患慢性髓细胞性白血病,现采用周期特异性抑制DNA合成的药物羟基脲,为控制疾病,拟采用中西医结合方法。患者面色萎黄,头晕眼花,心悸,心慌,疲乏无力,气短懒言,自汗,食欲减退,舌质淡,苔薄白,脉细弱。应如何辨证,采用何方治疗

- A. 阴虚内热证,青蒿鳖甲汤加减
- B. 气血两虚证,膈下逐瘀汤加减
- C. 气血两虚证,八珍汤加减
- D. 热毒壅盛证,犀角地黄汤加减
- E. 阴虚内热证,犀角地黄汤加减

【正确答案】 C

【答案解析】 慢性髓细胞性白血病气血两虚证

证候:面色萎黄或苍白,头晕眼花,心悸,疲乏无力,气短懒言,自汗,食欲减退,舌质淡,苔薄白,脉细弱。

治法:补益气血。

方药:八珍汤加减。

71. 王某,男性,9岁。在房屋装修后立即入住,半年后出现头晕,乏力,心悸,就诊时骨髓活检示增生低下,患者表现为面色苍白,唇甲色淡,心悸乏力,颧红盗汗,手足心热,口渴思饮,腰膝酸软,皮肤出血,便秘,舌质淡,舌苔薄、脉细数。最可能诊断为西医何病、中医何证

- A. 缺铁性贫血,肾阴虚证
- B. 再障,肾阳亏虚证
- C. 恶性贫血,肾阳亏虚证
- D. 再障,肾阴虚证
- E. 再障,肾阴阳两虚证

【正确答案】 D

【答案解析】 结合题干,患者住入装修了的房屋半年后,出现了骨髓增生低下,及一些其他症状,可以初步考虑患者为再生障碍性贫血之肾阴虚证。

肾阴虚证

证候:面色苍白,唇甲色淡,心悸乏力,颧红盗汗,手足心热,口渴思饮,腰膝酸软,出血明显,便秘,舌质淡,舌苔薄,或舌红少苔,脉细数。

治法:滋阴补肾,益气养血。

方药:左归丸合当归补血汤加减。

72. 患者, 男性, 58岁, 糖尿病史5年, 服格列本脲血糖控制在8.6~9.6mmol/L之间。近3天尿频、尿痛、尿急, 昨天出现昏迷, 查空腹血糖24.0mmol/L, 血钠148mmol/L, 尿素氮7.08mmol/L, 尿糖+++ , 尿酮++。应诊断为

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 脑血管意外
- C. 乳酸中毒昏迷
- D. 低血糖昏迷
- E. 高渗性非酮症糖尿病昏迷

【正确答案】 A

【答案解析】 结合患者症状以及实验室检查尿糖尿酮可以诊断为糖尿病酮症酸中毒。

73. 患者女性, 发热5天, 今天病情加重, 高热, 体温39℃, 肢厥, 神志昏迷, 谵语, 舌蹇, 舌鲜绛, 脉细数。某医院诊断为系统性红斑狼疮。其治疗当用清宫汤送服

- A. 安宫牛黄丸
- B. 苏合香丸
- C. 神犀丹
- D. 玉枢丹
- E. 通关散

【正确答案】 A

【答案解析】 系统性红斑狼疮脑虚瘀热证

证候: 身灼热, 肢厥, 神昏谵语, 或昏愦不语, 或痰壅气粗, 舌蹇, 舌鲜绛, 脉细数。

治法: 清心开窍。

方药: 清宫汤送服或鼻饲安宫牛黄丸或至宝丹。

74. 患者, 男, 62岁, 头晕目眩, 卒然半身不遂, 移时恢复如常, 舌质暗, 苔黄厚腻, 脉滑数, 选用的方药为

- A. 镇肝息风汤
- B. 补阳还五汤
- C. 星蒺承气汤
- D. 天麻钩藤饮
- E. 黄连温胆汤合桃红四物汤

【正确答案】 E

【答案解析】 短暂性脑缺血发作痰瘀互结、阻滞脉络证

证候: 头晕目眩, 头重如蒙, 肢体麻木, 胸脘痞闷, 或猝然半身不遂, 移时恢复如常, 舌质暗, 苔白腻或黄厚腻, 脉滑数或涩。

治法: 豁痰化瘀, 通经活络。

方药: 黄连温胆汤合桃红四物汤加减。

75. 女性, 40岁, 突然昏迷, 抽搐, 呼气有大蒜味, 瞳孔明显缩小, 皮肤冷汗, 两肺湿啰音。下列哪种疾病可能性大

- A. 一氧化碳中毒
- B. 安定中毒
- C. 脑出血
- D. 有机磷杀虫药中毒
- E. 蛛网膜下腔出血

【正确答案】 D

【答案解析】 有机磷杀虫药中毒呼吸有大蒜味, 故选D合适。

76. 患者, 女, 20岁, 大便干结, 腹胀腹痛, 口干口臭, 面红心烦, 有身热, 小便短赤, 舌红, 苔黄燥, 脉滑数, 其治疗首选方剂为

- A. 黄连上清丸
- B. 麻子仁丸
- C. 大承气汤
- D. 导赤散
- E. 三黄泻心汤

【正确答案】 B

【答案解析】 热秘

证候: 大便干结, 腹胀腹痛, 口干口臭, 面红心烦, 或有身热, 小便短赤, 舌红, 苔黄燥, 脉滑数。

治法: 泻热导滞, 润肠通便。

方药: 麻子仁丸加减。

77. 患者, 男, 53岁。大便时溏时泄, 稍进油腻之物, 则大便次数增多, 饮食减少, 食后脘闷不舒, 面色萎黄, 肢倦乏力, 舌淡苔白, 脉细弱。治法为

- A. 健脾益气
- B. 温肾健脾
- C. 固涩止泻
- D. 补中益气
- E. 益气升清

【正确答案】 A

【答案解析】 泄泻脾胃虚弱证

证候: 大便时溏时泻, 迁延反复, 食少, 食后脘闷不舒, 稍进油腻食物, 则大便次数增加, 面色萎黄, 神疲倦怠, 舌质淡, 苔白, 脉细弱。

治法: 健脾益气, 化湿止泻。

方药: 参苓白术散加减。

78. 患者, 女, 53岁, 午后或夜间发热, 不欲近衣, 手足心热, 烦躁, 少寐多梦, 盗汗, 口干咽燥, 舌质红, 苔少, 脉细数。辨证应属

- A. 阴虚发热证
- B. 气虚发热证
- C. 血虚发热证
- D. 血瘀发热证
- E. 气郁发热证

【正确答案】 A

【答案解析】 内伤发热之阴虚发热证

证候: 午后潮热, 或夜间发热, 不欲近衣, 手足心热, 烦躁, 少寐多梦, 盗汗, 口干咽燥, 舌质红, 或有裂纹, 苔少甚至无苔, 脉细数。

治法: 滋阴清热。

方药: 清骨散加减。

79. 患者, 女, 27岁。午后或夜间发热, 自觉身体某些部位发热, 口燥咽干, 但不欲多饮, 肢体疼痛, 面色萎黄, 舌有瘀点, 脉弦。辨证应属

- A. 阴虚发热证
- B. 气虚发热证
- C. 血虚发热证

D. 血瘀发热证

E. 气郁发热证

【正确答案】D

【答案解析】属于内伤发热之血瘀发热。

血瘀发热证

证候：午后或夜晚发热，或自觉身体某些部位发热，口渴咽干，但不多饮，肢体或躯干有固定痛处或肿块，面色萎黄或晦暗，舌质青紫或有瘀点、瘀斑，脉弦或涩。

治法：活血化瘀。

方药：血府逐瘀汤加减。

80. 患者，男，28岁，咳逆喘满不得卧，痰吐白沫量多，经久不愈，天冷受寒加重，甚至引起面浮跗肿。舌苔白滑或白腻，脉弦紧，选用的方药为

A. 小青龙汤

B. 香附旋复花汤

C. 椒目瓜蒌汤合十枣汤

D. 沙参麦冬汤合泻白散

E. 金匮肾气丸合苓桂术甘汤

【正确答案】A

【答案解析】该患者为支饮之寒饮伏肺证

证候：咳逆喘满不得卧，痰吐白沫量多，经久不愈，天冷受寒加重，甚至引起面浮跗肿。或平素伏而不作，遇寒即发，发则寒热，背痛，腰痛，目泣自出，身体振振瞤动。舌苔白滑或白腻，脉弦紧。

治法：宣肺化饮。

方药：小青龙汤加减。

81. 程某，男，62岁，腰膝酸软，不能久立，肢体痿软无力，以下肢为著，下肢肌肉渐萎缩，咽干耳鸣，舌红少苔，脉细数。其首选的治疗方法是

A. 清热利湿，凉血活血

B. 清热润燥，养肺生津

C. 清热利湿，通利筋脉

D. 补脾益气，健运升清

E. 补益肝肾，滋阴清热

【正确答案】E

【答案解析】该患者为痿证之肝肾亏损，髓枯筋痿证，治宜补益肝肾，滋阴清热，选用大补阴煎加减。

82. 患者，女，31岁。尿频、尿急、灼热、刺痛2天，小腹拘急胀痛，大便干结，口苦，舌红苔黄腻，脉滑数。尿常规：白细胞20个/HP；尿菌落计数 $>10^5$ /ml。治疗应首选

A. 头孢曲松钠加萹藓分清饮

B. 氟哌酸加益元散

C. 氟哌酸加龙胆泻肝汤

D. 左氧氟沙星加八正散

E. 头孢曲松钠加知柏地黄汤

【正确答案】D

【答案解析】根据尿常规：白细胞20个/HP；尿菌落计数 $>10^5$ /ml，诊断为泌尿系感染。根据题干给的信息辨证为膀胱湿热证，方药选用八正散。

83. 患者，男，58岁。高血压病史15年，症见头晕眼花，头痛耳鸣，形寒肢冷，心悸气短，

腰膝酸软,夜尿频多,大便溏薄,舌淡胖,脉沉弱,首选方剂为

- A. 六味地黄丸
- B. 济生肾气丸
- C. 半夏白术天麻汤
- D. 杞菊地黄丸
- E. 天麻钩藤饮

【正确答案】 B

【答案解析】 原发性高血压-肾阳虚衰证

证候: 头晕眼花, 头痛耳鸣, 形寒肢冷, 心悸气短, 腰膝酸软, 夜尿频多, 大便溏薄, 舌淡胖, 脉沉弱。

治法: 温补肾阳。

方药: 济生肾气丸加减。心悸、耳鸣者加煅龙牡平肝息风。

84. 患者, 男, 咳嗽气短, 倦怠乏力, 咳痰量多易出, 面色(白光)白, 食后腹胀, 食后即便, 舌体胖边有齿痕, 舌苔薄白, 脉细弱。治疗首选方剂为

- A. 肾气丸
- B. 补肺汤合补中益气汤
- C. 麻杏石甘汤
- D. 参苓白术散
- E. 沙参麦冬汤

【正确答案】 B

【答案解析】 慢性支气管炎, 肺脾气虚证, 证候: 咳嗽气短, 倦怠乏力, 咳痰量多易出, 面色(白光)白, 食后腹胀, 便溏或食后即便, 舌体胖边有齿痕, 舌苔薄白或薄白腻, 脉细弱。

治法: 补肺健脾, 止咳化痰。方药: 补肺汤合补中益气汤加减。

85. 扩张性心肌病患者, 症见心悸气短, 活动后症状加重, 头晕乏力, 颧红, 自汗或盗汗, 失眠, 口干, 舌淡红, 苔薄白, 脉细数无力。首选方剂为

- A. 炙甘草汤合天王补心丹
- B. 真武汤
- C. 四逆汤合参附龙牡汤
- D. 圣愈汤
- E. 银翘散

【正确答案】 A

【答案解析】 扩张性心肌病-气阴两虚证

证候: 心悸气短, 活动后症状加重, 头晕乏力, 颧红, 自汗或盗汗, 失眠, 口干, 舌质红或淡红, 苔薄白, 脉细数无力或结代。

治法: 益气养阴, 养心安神。

方药: 炙甘草汤合天王补心丹。

86. 患者, 男, 51岁。腹胀痛, 腹部时有条索状物聚起, 按之胀痛更甚, 便秘, 纳呆, 舌苔腻, 脉弦滑。相应的治法为

- A. 理气化痰, 通利水湿
- B. 疏肝解郁, 行气散结
- C. 导滞散结, 理气化痰
- D. 消导利水
- E. 清热利湿, 攻下逐水

【正确答案】 C

【答案解析】聚证-食滞痰阻证

证候：腹胀或痛，腹部时有条索状物聚起，按之胀痛更甚，便秘，纳呆，舌苔腻，脉弦滑。

治法：导滞散结，理气化痰。

方药：六磨汤加减。

87. 患者，男，21岁，出现气急、胸闷、咳嗽症状，支气管舒张试验阳性，FEV₁增加>12%，且FEV₁增加绝对值>200ml，考虑该患者为

- A. 肺炎
- B. 肺结核
- C. 支气管哮喘
- D. 慢性阻塞性肺疾病
- E. 原发性支气管肺癌

【正确答案】C

【答案解析】该患者的支气管哮喘的症状不明显，但是可以根据支气管舒张试验阳性，FEV₁增加>12%，且FEV₁增加绝对值>200ml诊断该患者为支气管哮喘。

三、A3/A4

患者，男，65岁，冠心病史6年。胸痛彻背，心痛如绞，胸闷憋气，含服硝酸甘油不缓解，形寒畏冷，四肢不温，冷汗自出，心悸气短，舌质紫暗，苔薄白，脉沉细。

88. 其证型是

- A. 冠心病心绞痛，寒痰痹阻证
- B. 冠心病心绞痛，气阴两虚证
- C. 急性心肌梗死，痰瘀痹阻证
- D. 冠心病心绞痛，气血两虚证
- E. 急性心肌梗死，寒凝心脉证

【正确答案】E

【答案解析】心肌梗死-寒凝心脉证

证候：胸痛彻背，心痛如绞，胸闷憋气，形寒畏冷，四肢不温，冷汗自出，心悸短气，舌质紫暗，苔薄白，脉沉细或沉紧。

治法：散寒宣痹，芳香温通。

方药：当归四逆汤合苏合香丸加减。

89. 中医治法为

- A. 辛温通阳，开痹散寒
- B. 益气养阴，活血通络
- C. 通阳泄浊，豁痰开痹
- D. 散寒宣痹，芳香温通
- E. 豁痰活血，理气止痛

【正确答案】D

【答案解析】心肌梗死-寒凝心脉证

证候：胸痛彻背，心痛如绞，胸闷憋气，形寒畏冷，四肢不温，冷汗自出，心悸短气，舌质紫暗，苔薄白，脉沉细或沉紧。

治法：散寒宣痹，芳香温通。

方药：当归四逆汤合苏合香丸加减。

90. 首选方药为

- A. 血府逐瘀汤加减
- B. 参附龙牡汤加减

- C. 生脉散合左归饮加减
- D. 生脉散合炙甘草汤加减
- E. 当归四逆汤合苏合香丸加减

【正确答案】 E

【答案解析】 心肌梗死-寒凝心脉证

证候: 胸痛彻背, 心痛如绞, 胸闷憋气, 形寒畏冷, 四肢不温, 冷汗自出, 心悸短气, 舌质紫暗, 苔薄白, 脉沉细或沉紧。

治法: 散寒宣痹, 芳香温通。

方药: 当归四逆汤合苏合香丸加减。

患者, 女, 32岁, 有哮喘病史。突然出现咳嗽、喘憋半小时, 咳呛阵作, 气粗息涌, 喉中哮鸣, 面赤口苦, 舌红苔黄腻, 脉弦滑。

91. 其中医证型是

- A. 肺虚证
- B. 热哮证
- C. 肾虚证
- D. 寒哮证
- E. 脾虚证

【正确答案】 B

【答案解析】 支气管哮喘-热哮证

证候: 气粗息涌, 咳呛阵作, 喉中哮鸣, 胸高胁胀, 烦闷不安, 汗出, 口渴喜饮, 面赤口苦, 咳痰色黄或色白, 黏浊稠厚, 咯吐不利, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数或弦滑。

治法: 清热宣肺, 化痰定喘。

方药: 定喘汤加减。

92. 其治法是

- A. 健脾化痰, 止咳平喘
- B. 补肾纳气平喘
- C. 清热化痰肃肺
- D. 清热宣肺, 化痰定喘
- E. 温肺散寒, 化痰平喘

【正确答案】 D

【答案解析】 支气管哮喘-热哮证

证候: 气粗息涌, 咳呛阵作, 喉中哮鸣, 胸高胁胀, 烦闷不安, 汗出, 口渴喜饮, 面赤口苦, 咳痰色黄或色白, 黏浊稠厚, 咯吐不利, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数或弦滑。

治法: 清热宣肺, 化痰定喘。

方药: 定喘汤加减。

93. 首选方药为

- A. 玉屏风散加减
- B. 金匮肾气丸或七味都气丸加减
- C. 六君子汤加减
- D. 定喘汤加减
- E. 射干麻黄汤加减

【正确答案】 D

【答案解析】 支气管哮喘-热哮证

证候: 气粗息涌, 咳呛阵作, 喉中哮鸣, 胸高胁胀, 烦闷不安, 汗出, 口渴喜饮, 面赤口苦,

咳痰色黄或色白，黏浊稠厚，咯吐不利，舌质红，苔黄腻，脉滑数或弦滑。

治法：清热宣肺，化痰定喘。

方药：定喘汤加减。

患者，男，55岁。慢性肺源性心脏病史。喘息气粗，烦躁，胸满，咳嗽，痰黄，黏稠难咯，溲黄便干，口渴，舌红，舌苔黄腻，边尖红，脉滑数。

94. 其中医证型是

- A. 痰浊壅肺证
- B. 痰热郁肺证
- C. 痰蒙神窍证
- D. 阳虚水泛证
- E. 肺肾气虚证

【正确答案】 B

【答案解析】 慢性肺源性心脏病—痰热郁肺证

证候：喘息气粗，烦躁，胸满，咳嗽，痰黄或白，黏稠难咳，或身热，微恶寒，有汗不多，溲黄便干，口渴，舌红，舌苔黄或黄腻，边尖红，脉数或滑数。

治法：清肺化痰，降逆平喘。

方药：越婢加半夏汤加减。

95. 其中医治法是

- A. 清肺化痰，降逆平喘
- B. 涤痰开窍，熄风止痉
- C. 温肾健脾，化饮利水
- D. 补肺纳肾，降气平喘
- E. 健脾益肺，化痰降气

【正确答案】 A

【答案解析】 慢性肺源性心脏病—痰热郁肺证

证候：喘息气粗，烦躁，胸满，咳嗽，痰黄或白，黏稠难咳，或身热，微恶寒，有汗不多，溲黄便干，口渴，舌红，舌苔黄或黄腻，边尖红，脉数或滑数。

治法：清肺化痰，降逆平喘。

方药：越婢加半夏汤加减。

96. 其首选方剂为

- A. 补肺汤加减
- B. 真武汤合五苓散加减
- C. 涤痰汤加减
- D. 越婢加半夏汤加减
- E. 苏子降气汤加减

【正确答案】 D

【答案解析】 慢性肺源性心脏病—痰热郁肺证

证候：喘息气粗，烦躁，胸满，咳嗽，痰黄或白，黏稠难咳，或身热，微恶寒，有汗不多，溲黄便干，口渴，舌红，舌苔黄或黄腻，边尖红，脉数或滑数。

治法：清肺化痰，降逆平喘。

方药：越婢加半夏汤加减。

患者，男，58岁。长期饮酒，肝掌，黄疸，B超提示肝回声明显增强、不均、光点粗大。腹大胀满，脉络怒张，胁腹刺痛，面色晦暗黧黑，肋下癥块，面颈可见红点赤缕，手掌赤痕，口干不欲饮，舌质紫暗，脉细涩。

97. 其西医诊断为

- A. 肝癌
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 肝血管瘤
- E. 肝硬化

【正确答案】 E

【答案解析】 根据长期饮酒史, 肝掌, 黄疸, B超提示肝回声明显增强、不均、光点粗大, 诊断为肝硬化。

98. 其证候是

- A. 湿热蕴结
- B. 寒湿困脾
- C. 脾肾阳虚
- D. 肝脾血瘀
- E. 肝肾阴虚

【正确答案】 D

【答案解析】 肝硬化-肝脾血瘀证

证候: 腹大胀满, 脉络怒张, 胁腹刺痛, 面色晦暗黧黑, 肋下癥块, 面颈胸壁等处可见红点赤缕, 手掌赤痕, 口干不欲饮, 或大便色黑, 舌质紫暗, 或有瘀斑, 脉细涩。

治法: 活血化瘀, 化气行水。

方药: 调营饮加减。

99. 应选用的方药为

- A. 中满分消丸合茵陈蒿汤
- B. 调营饮
- C. 附子理中汤合五苓散
- D. 一贯煎合膈下逐瘀汤
- E. 实脾饮

【正确答案】 B

【答案解析】 肝硬化-肝脾血瘀证

证候: 腹大胀满, 脉络怒张, 胁腹刺痛, 面色晦暗黧黑, 肋下癥块, 面颈胸壁等处可见红点赤缕, 手掌赤痕, 口干不欲饮, 或大便色黑, 舌质紫暗, 或有瘀斑, 脉细涩。

治法: 活血化瘀, 化气行水。

方药: 调营饮加减。

患者, 女, 38岁, 浮肿, 按之凹陷不易回复, 腹胀纳少, 面色萎黄, 神疲乏力, 尿少色清, 舌质淡, 苔白腻, 脉沉缓。诊断为肾病综合征。

100. 其中医证型为

- A. 风水相搏证
- B. 湿毒浸淫证
- C. 水湿浸渍证
- D. 湿热内蕴证
- E. 脾虚湿困证

【正确答案】 E

【答案解析】 肾病综合征-脾虚湿困证

证候: 浮肿, 按之凹陷不易回复, 腹胀纳少, 面色萎黄, 神疲乏力, 尿少色清, 大便或溏,

舌质淡,苔白腻或白滑,脉沉缓或沉弱。

治法:温运脾阳,利水消肿。

方药:实脾饮加减。

101. 其中医治法为

- A. 宣肺解毒,利湿消肿
- B. 疏风解表,宣肺利水
- C. 健脾化湿,通阳利水
- D. 清热利湿,利水消肿
- E. 温运脾阳,利水消肿

【正确答案】 E

【答案解析】 肾病综合征-脾虚湿困证

证候:浮肿,按之凹陷不易回复,腹胀纳少,面色萎黄,神疲乏力,尿少色清,大便或溏,舌质淡,苔白腻或白滑,脉沉缓或沉弱。

治法:温运脾阳,利水消肿。

方药:实脾饮加减。

102. 应选用的方药为

- A. 越婢加术汤
- B. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
- C. 五皮饮合胃苓汤
- D. 疏凿饮子
- E. 实脾饮

【正确答案】 E

【答案解析】 肾病综合征-脾虚湿困证

证候:浮肿,按之凹陷不易回复,腹胀纳少,面色萎黄,神疲乏力,尿少色清,大便或溏,舌质淡,苔白腻或白滑,脉沉缓或沉弱。

治法:温运脾阳,利水消肿。

方药:实脾饮加减。

四、B

- A. 铁锈色痰
- B. 粉红色泡沫痰
- C. 砖红色胶冻状痰
- D. 浆液性痰
- E. 粉红色乳状痰

103. 克雷伯杆菌肺炎可见

【正确答案】 C

【答案解析】 克雷伯杆菌肺炎临床表现类似重症肺炎链球菌肺炎。痰液呈砖红色胶冻状或灰绿色,为此类肺炎的特征性改变。

104. 葡萄球菌肺炎可见

【正确答案】 E

【答案解析】 葡萄球菌肺炎咯脓痰、痰带血丝或呈粉红色乳状。

- A. 支气管扩张
- B. 支气管哮喘
- C. 肺癌
- D. 喘息性支气管炎

E. 慢性支气管炎

105. 疾病发作时可闻及散在或弥漫性哮鸣音, 呼气相延长, 可经治疗后缓解的是

【正确答案】 B

【答案解析】 支气管哮喘发作时在双肺可闻及散在或弥漫性哮鸣音, 呼气相延长。可经治疗缓解或自行缓解。

106. 发作时可闻及广泛的湿啰音和哮鸣音的是

【正确答案】 D

【答案解析】 喘息性支气管炎在咳嗽或深吸气后可听到哮鸣音, 发作时可闻及广泛的湿啰音和哮鸣音。长期反复发作, 可见肺气肿的体征。

A. 射干麻黄汤

B. 定喘汤

C. 六君子汤

D. 玉屏风散

E. 金匱肾气丸

107. 李某, 男, 56岁, 哮喘多年, 劳累后哮喘易发, 平素息促气短, 呼多吸少, 动则为甚, 形瘦, 神疲, 心悸, 腰酸腿软, 面色苍白, 畏寒肢冷, 舌淡苔白, 脉沉细。其治疗宜首选

【正确答案】 E

【答案解析】 支气管哮喘-肾虚证

证候: 平素息促气短, 呼多吸少, 动则为甚, 形瘦神疲, 心悸, 腰酸腿软, 劳累后哮喘易发, 或面色苍白, 畏寒肢冷, 自汗, 舌淡苔白, 质胖嫩, 脉沉细; 或颧红, 发热, 汗出黏手, 舌质淡胖嫩, 苔白或舌红少苔, 脉细数或沉细。

治法: 补肾纳气。

方药: 金匱肾气丸或七味都气丸加减。

108. 某女, 哮喘6年, 近日复发, 症见气粗息涌, 咳呛阵作, 喉中哮鸣, 胸高胁胀, 烦闷不安, 汗出, 口渴喜饮, 面赤口苦, 咳痰色黄, 黏浊稠厚, 咳吐不利, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。其治疗宜首选

【正确答案】 B

【答案解析】 支气管哮喘-热哮证

证候: 气粗息涌, 咳呛阵作, 喉中哮鸣, 胸高胁胀, 烦闷不安, 汗出, 口渴喜饮, 面赤口苦, 咳痰色黄或色白, 黏浊稠厚, 咳吐不利, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数或弦滑。

治法: 清热宣肺, 化痰定喘。

方药: 定喘汤加减。

A. 重脉

B. 奇脉

C. 交替脉

D. 水冲脉

E. 缺脉

109. 脉压增大可出现

【正确答案】 D

【答案解析】 头部随脉搏呈节律性点头运动、颈动脉搏动明显、毛细血管搏动征、水冲脉、枪击音与杜氏双重杂音统称为周围血管征, 它们均由脉压增大所致, 常见于主动脉瓣关闭不全、发热、贫血及甲亢等。

110. 左室功能不全可出现

【正确答案】 C

【答案解析】左心功能不全心脏体征:除原有心脏病体征外,一般均心脏扩大、心率加快,并有肺动脉瓣区第二音(P_2)亢进、心尖区舒张期奔马律和/或收缩期杂音、交替脉等。

- A. 左归丸
- B. 血府逐瘀汤
- C. 补阳还五汤
- D. 枳实薤白桂枝汤
- E. 参附汤合右归丸

111. 心绞痛心肾阴虚证应首选的方剂是

【正确答案】A

【答案解析】心肾阴虚证

证候:胸闷痛或灼痛,心悸盗汗,虚烦不寐,腰膝酸软,头晕耳鸣,舌红少苔,脉沉细数。
治法:滋阴益肾,养心安神。

方药:左归丸加减。

112. 心绞痛心肾阳虚证应首选的方剂是

【正确答案】E

【答案解析】心肾阳虚证

证候:心悸而痛,胸闷气短,甚则胸痛彻背,心悸汗出,畏寒,肢冷,下肢浮肿,腰酸无力,面色苍白,唇甲淡白或青紫,舌淡白或紫暗,脉沉细或沉微欲绝。

治法:益气壮阳,温经止痛。

方药:参附汤合右归丸加减。

- A. 双氢克尿噻
- B. 甘露醇
- C. 呋塞米
- D. 氨苯喋啶
- E. 乙酰唑胺

113. 用于脑水肿脱水的是

【正确答案】B

【答案解析】脑水肿可根据临床表现或颅内压检测给予甘露醇。

114. 有液体潴留证据的急性心衰患者首选

【正确答案】C

【答案解析】有液体潴留证据的急性心衰患者均应使用利尿剂。首选静脉袪利尿剂,如呋塞米、托拉塞米、布美他尼,应及早应用。

- A. ST段弓背向上抬高
- B. ST段弓背向下抬高
- C. ST段呈水平型下降
- D. ST段呈上斜型下移
- E. ST-T呈鱼钩样改变

115. 急性心包炎可见

【正确答案】B

【答案解析】急性心包炎心电图除 aVR 外,其余导联均有ST段弓背向下的抬高,T波倒置,无异常Q波出现。

116. 急性心肌梗死可见

【正确答案】A

【答案解析】急性心肌梗死心电图中心面向梗死部位的导联ST段抬高,和/或同时有异常Q

波(非ST段抬高性心肌梗死则多表现为ST段下移和/或T波改变)。

- A. 脾肿大
- B. 腹水
- C. 腹壁静脉曲张
- D. 出血倾向及贫血
- E. 痔静脉曲张

117. 肝硬化代偿功能减退的最突出的体征是

【正确答案】 B

【答案解析】 腹水是肝硬化代偿功能减退最突出的体征。

118. 属于肝硬化肝功能减退的临床表现是

【正确答案】 D

【答案解析】 肝功能减退的临床表现:

(1) 全身症状一般情况与营养状况较差, 消瘦乏力, 精神不振, 严重者卧床不起, 皮肤粗糙, 面色晦暗、黧黑呈肝病面容, 部分有不规则低热和黄疸。

(2) 消化道症状

(3) 出血倾向及贫血

(4) 内分泌紊乱

- A. 疼痛位于右上腹并放射至背部
- B. 上腹部持续疼痛, 制酸药效果不佳
- C. 大便隐血试验持续阳性
- D. X线钡餐造影见溃疡龛影
- E. 内镜检查可见到活动期溃疡

119. 对消化性溃疡有确诊价值的是

【正确答案】 D

【答案解析】 X线钡餐造影见溃疡龛影, 有确诊价值。

120. 可确诊消化性溃疡的是

【正确答案】 E

【答案解析】 内镜检查可见到活动期溃疡, 可确诊。

- A. AFP
- B. X线
- C. B超
- D. CT
- E. MRI

121. 目前肝癌筛查的首选检查方法是

【正确答案】 C

【答案解析】 B型超声显像是目前肝癌筛查的首选检查方法。

122. 目前肝癌的主要诊断依据是

【正确答案】 A

【答案解析】 甲胎蛋白(AFP)目前仍是原发性肝癌特异性的标记物和主要诊断指标。

- A. 早饱
- B. 纳差
- C. 腹胀
- D. 上腹痛
- E. 上腹压痛

123. 进展期胃癌最早出现的症状是

【正确答案】 D

【答案解析】 进展期胃癌最早出现的症状是上腹痛, 可伴早饱、纳差、腹胀、体重下降等。

124. 中晚期胃癌最常见的体征为

【正确答案】 E

【答案解析】 早期胃癌可无任何体征, 中晚期癌的体征中以上腹压痛最为常见。

- A. 质子泵抑制剂+羟氨苄青霉素+铋剂
- B. 铋剂+克拉霉素+甲硝唑
- C. 质子泵抑制剂+铋剂+克拉霉素+甲硝唑
- D. 质子泵抑制剂+铋剂+克拉霉素
- E. 铋剂+克拉霉素+甲硝唑+羟氨苄青霉素

125. 治疗消化性溃疡的三联疗法是

【正确答案】 B

【答案解析】 三联疗法为质子泵抑制剂或铋剂, 再加上任两种抗生素。

根除幽门螺杆菌的常用三联疗法

PPI 或胶体铋剂 (选择一种)	抗菌药物 (选择两种)
奥美拉唑 40mg/d	克拉霉素 1000mg/d
兰索拉唑 60mg/d	阿莫西林 2000mg/d
枸橼酸铋钾 (胶体次枸橼酸铋) 480mg/d	甲硝唑 800mg/d
上述剂量分 2 次服, 疗程 7 天	

126. 治疗消化性溃疡的四联疗法是

【正确答案】 C

【答案解析】 四联疗法为质子泵抑制剂与铋剂合用, 再加上任两种抗生素。

- A. 薏苡汤
- B. 桃红饮
- C. 桂枝汤
- D. 独活寄生汤
- E. 白虎加桂枝汤

127. 痛风之风寒湿阻证选用的方剂是

【正确答案】 A

【答案解析】 风寒湿阻证

证候: 肢体关节疼痛, 屈伸不利, 或呈游走性疼痛, 或疼痛剧烈, 痛处不移, 或肢体关节重着, 肿胀疼痛, 肌肤麻木, 阴雨天加重, 舌苔薄白, 脉弦紧或濡缓。

治法: 祛风散寒, 除湿通络。

方药: 薏苡汤加减。

128. 痛风之风湿热郁证选用的方剂是

【正确答案】 E

【答案解析】 风湿热郁证

证候: 关节红肿热痛, 痛不可触, 遇热痛甚, 得冷则舒, 病势较急, 兼发热, 口渴, 心烦, 汗出不解, 舌质红, 苔黄或黄腻, 脉滑数。

治法: 清热除湿, 祛风通络。

方药: 白虎加桂枝汤加减。

- A. 空腹血糖

B. 尿糖

C. 糖化血红蛋白

D. 葡萄糖耐量试验

E. 胰岛素释放试验

129. 糖尿病患者近期病情监测的指标是

【正确答案】 C

【答案解析】 糖化血红蛋白为糖尿病患者近期病情监测的指标。

130. 鉴别 1 型糖尿病与 2 型糖尿病最好的检测是

【正确答案】 E

【答案解析】 1 型糖尿病是以胰岛 B 细胞破坏、胰岛素分泌缺乏为特征的自身免疫性疾病。2 型糖尿病其发病与胰岛素抵抗和胰岛素分泌的相对性缺乏有关, 两者皆呈不均一性。故鉴别 1 型糖尿病与 2 型糖尿病最好的检测是胰岛素释放试验。

A. 龙胆泻肝汤

B. 清骨散加减

C. 海藻玉壶汤

D. 逍遥散合二陈汤

E. 天王补心丹

131. 亚急性甲状腺炎阴虚火旺证, 治疗应首选的方剂是

【正确答案】 B

【答案解析】 阴虚火旺证

证候: 颈前肿块或大或小, 质韧, 疼痛, 口燥咽干, 潮热盗汗, 心悸, 失眠多梦, 舌质红, 苔少或无苔, 脉细数。

治法: 滋阴清热, 软坚散结。

方药: 清骨散加减。

132. 亚急性甲状腺炎痰瘀互结证, 治疗应首选的方剂是

【正确答案】 C

【答案解析】 痰瘀互结证

证候: 颈前肿块坚硬, 疼痛不移, 入夜尤甚, 情绪不畅, 口干不欲饮, 舌质紫暗, 或有瘀点瘀斑, 脉细涩。

治法: 理气活血, 化痰消癭。

方药: 海藻玉壶汤加减。

A. 癫痫单纯部分性发作

B. 癫痫不典型失神发作

C. 癫痫典型失神发作

D. 癫痫全面性强直一阵挛发作

E. 癫痫持续状态

133. 男孩, 8 岁, 吃午饭时, 突然意识短暂丧失, 面色变白, 双目凝视, 手中的筷子掉在地上, 口角出现细小颤动, 持续约 15 秒后立即清醒。最可能的诊断是

【正确答案】 C

【答案解析】 典型失神发作通常称小发作, 见于 5~14 岁的儿童。表现为意识短暂丧失, 失去对周围的知觉, 但无惊厥。病人突然终止原来的活动或中断谈话, 面色变白, 双目凝视, 手中所持物件可能失握跌落, 有时眼睑、口角或上肢出现不易觉察的颤动, 无先兆和局部症状; 一般持续 3~15 秒, 事后对发作全无记忆。发作终止立即清醒。

134. 男性, 14 岁。3 年来反复发作意识丧失, 四肢强直, 继之抽搐, 口唇青紫, 舌咬伤, 尿

失禁,每次持续2~3分钟左右。1天来有类似发作十余次,间歇期持续昏迷。最可能的诊断是

【正确答案】 E

【答案解析】 癫痫持续发作或癫痫状态,传统定义认为“癫痫连续发作之间意识尚未完全恢复又频繁再发,总时间超过30分钟,或癫痫发作持续30分钟以上未自行停止”。

- A. 呼出气有酒味
- B. 呼出气有蒜味
- C. 呼出气有烂苹果味
- D. 呼出气有苦杏仁味
- E. 呼出气有氨味

135. 有机磷杀虫药中毒见

【正确答案】 B

【答案解析】 有机磷杀虫药中毒时呼出气有蒜味。

136. 糖尿病酮症酸中毒见

【正确答案】 C

【答案解析】 糖尿病酮症酸中毒时呼出气有烂苹果味。

- A. 血府逐瘀汤或复元活血汤
- B. 一贯煎合金铃子散
- C. 复元活血汤合硝石矾石散
- D. 乌梅丸合大柴胡汤
- E. 龙胆泻肝汤

137. 胁痛肝胆湿热证方选

【正确答案】 E

【答案解析】 胁痛肝胆湿热证

证候: 胁肋胀痛或灼热疼痛,口苦口黏,胸闷纳呆,恶心呕吐,小便黄赤,大便不爽,或兼有身热恶寒,身目发黄,舌红苔黄腻,脉弦滑数。

治法: 清热利湿。

方药: 龙胆泻肝汤加减。

138. 胁痛瘀血阻络证方选

【正确答案】 A

【答案解析】 胁痛瘀血阻络证

证候: 胁肋刺痛,痛有定处,痛处拒按,入夜痛甚,胁肋下或见有癥块,舌质紫暗,脉沉涩。

治法: 祛瘀通络。

方药: 血府逐瘀汤或复元活血汤加减。

- A. 肝阳上亢证
- B. 气血亏虚证
- C. 肾精不足证
- D. 痰浊内蕴证
- E. 瘀血阻窍证

139. 眩晕,头重如蒙,胸闷恶心,呕吐痰涎,食少多寐,舌胖苔白腻,脉线滑。其辨证为

【正确答案】 D

【答案解析】 眩晕痰浊内蕴证

证候: 眩晕,倦怠或头重如蒙,胸闷恶心,呕吐痰涎,食少多寐,舌胖,苔白腻,脉线滑。

治法: 燥湿祛痰,健脾和胃。

方药: 半夏白术天麻汤加减。

140. 眩晕, 头痛, 兼见健忘, 失眠, 心悸, 精神不振, 耳鸣耳聋, 面唇紫暗, 舌暗有瘀斑, 脉涩, 其辨证为

【正确答案】 E

【答案解析】 眩晕瘀血阻窍证

证候: 眩晕, 头痛, 兼见健忘, 失眠, 心悸, 精神不振, 耳鸣耳聋, 面唇紫暗, 舌暗有瘀斑, 脉涩。

治法: 祛瘀生新, 活血通窍。

方药: 通窍活血汤加减。

- A. 天麻钩藤饮
- B. 归脾汤
- C. 河车大造丸
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 通窍活血汤

141. 眩晕, 耳鸣, 头胀痛, 口苦, 失眠多梦, 便秘尿赤, 舌红苔黄, 脉弦数, 选用的方药为

【正确答案】 A

【答案解析】 肝阳上亢证

证候: 眩晕耳鸣, 头胀痛, 急躁易怒, 失眠多梦, 脉弦, 或兼面红, 目赤, 口苦, 便秘尿赤, 舌红苔黄, 脉弦数, 或兼腰膝酸软, 健忘,

遗精, 舌红少苔, 脉弦细而数, 甚或眩晕欲仆, 泛泛欲呕, 头痛如掣, 肢麻震颤, 语言不利, 步履不正。

治法: 平肝潜阳, 清热息风。

方药: 天麻钩藤饮或羚羊角汤加减。

142. 眩晕日久不愈, 精神萎靡, 腰酸膝软, 发落, 齿摇, 少寐多梦, 健忘, 舌嫩红少苔, 脉细数选用的方药为

【正确答案】 C

【答案解析】 肾精不足证

证候: 眩晕, 精神萎靡, 腰酸膝软, 或遗精, 滑泄, 耳鸣, 发落, 齿摇, 少寐多梦, 健忘, 舌瘦嫩或嫩红, 少苔或无苔, 脉弦细或弱或细数。

治法: 补益肾精, 充养脑髓。

方药: 河车大造丸加减。

- A. 丹栀逍遥散
- B. 清骨散
- C. 补中益气汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 归脾汤

143. 治疗血瘀发热证的方剂是

【正确答案】 D

【答案解析】 血瘀发热证

证候: 午后或夜晚发热, 或自觉身体某些部位发热, 口燥咽干, 但不多饮, 肢体或躯干有固定痛处或肿块, 面色萎黄或晦暗, 舌质青紫或有瘀点、瘀斑, 脉弦或涩。

治法: 活血化瘀。

方药: 血府逐瘀汤加减。

144. 治疗内伤发热气郁发热证的代表方剂是

【正确答案】A

【答案解析】气郁发热证

证候：发热多为低热或潮热，热势常随情绪波动而起伏，精神抑郁，胁肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，纳食减少，舌红，苔黄，脉弦数。

治法：疏肝理气，解郁泻热。

方药：丹栀逍遥散加减。

- A. 滋阴养心
- B. 养阴和胃
- C. 健脾和胃
- D. 补益肺气
- E. 益气固表

145. 虚劳胃阴虚证，其中医治法是

【正确答案】B

【答案解析】胃阴虚证

证候：口干唇燥，不思饮食，大便燥结，甚则干呕，呃逆，面色潮红，舌干，苔少或无苔，脉细数。

治法：养阴和胃。

方药：益胃汤加减。

146. 虚劳肺气虚证，其中医治法是

【正确答案】D

【答案解析】肺气虚证

证候：咳嗽无力，痰液清稀，短气自汗，声音低怯，时寒时热，平素易于感冒，面白，舌淡，脉细软弱。

治法：补益肺气。

方药：补肺汤加减。

- A. 医师的权利
- B. 医师的义务
- C. 医师的职责
- D. 医师的执业规则
- E. 医师的社会地位

147. 医师在执业活动中，人格尊严及人身安全不受侵犯体现的是

【正确答案】A

【答案解析】执业医师的权利：

1. 在注册的执业范围内，进行医学诊查、疾病调查、医学处置、出具相应的医学证明文件，选择合理的医疗、预防、保健方案；
2. 按照国务院卫生行政部门规定的标准，获得与本人执业活动相当的医疗设备基本条件；
3. 从事医学研究、学术交流，参加专业学术团体；
4. 参加专业培训，接受继续教育；
5. 在执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯；
6. 获取工资报酬和津贴，享受国家规定的福利待遇；
7. 对所在机构的医疗、预防、保健工作和卫生行政部门的工作提出意见和建议，依法参与所在机构的民主管理。

148. 对危急患者，医师应当采取紧急措施及时进行诊治，不得拒绝急救处置，体现的是

【正确答案】D

【答案解析】医师执业规则:

1. 医师实施医疗、预防、保健措施, 签署有关医学证明文件, 必须亲自诊查、调查, 并按照规定及时填写医学文书, 不得隐匿、伪造或者销毁医学文书及有关资料。医师不得出具与自己执业范围无关或者与执业类别不相符的医学证明文件。
2. 对急危患者, 医师应当采取紧急措施及时进行诊治; 不得拒绝急救处置。
3. 医师应当使用经国家有关部门批准使用的药品、消毒药剂和医疗器械。除正当治疗外, 不得使用麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和放射性药品。
4. 医师应当如实向患者或者其家属介绍病情, 但应注意避免对患者产生不利后果。医师进行实验性临床医疗, 应当经医院批准并征得患者本人或者其家属同意。
5. 医师不得利用职务之便, 索取、非法收受患者财物或者牟取其他不正当利益。
6. 遇有自然灾害、传染病流行、突发重大伤亡事故及其他严重威胁人民生命健康的紧急情况时, 医师应当服从县级以上人民政府卫生行政部门的调遣。
7. 医师发生医疗事故或者发现传染病疫情时, 应当依照有关规定及时向所在地机构或者卫生行政部门报告。医师发现患者涉嫌伤害事件或者非正常死亡时, 应当按照有关规定向有关部门报告。
8. 执业助理医师应当在执业医师的指导下, 在医疗、预防、保健机构中按照其执业类别执业。在乡、民族乡、镇的医疗、预防、保健机构中工作的执业助理医师, 可以根据医疗诊治的情况和需要, 独立从事一般的执业活动。

- A. 一次常用量
- B. 3日常用量
- C. 5日常用量
- D. 7日常用量
- E. 15日常用量

149. 第一类精神药品注射剂, 每张处方为

【正确答案】A

【答案解析】第一类精神药品注射剂, 每张处方为一次常用量; 控缓释制剂, 每张处方不得超过 7 日常用量; 其他剂型, 每张处方不得超过 3 日常用量。哌甲酯用于治疗儿童多动症时, 每张处方不得超过 15 日常用量。

150. 第一类精神药品控缓释制剂, 每张处方不得超过

【正确答案】D

【答案解析】第一类精神药品注射剂, 每张处方为一次常用量; 控缓释制剂, 每张处方不得超过 7 日常用量; 其他剂型, 每张处方不得超过 3 日常用量。哌甲酯用于治疗儿童多动症时, 每张处方不得超过 15 日常用量。

第四单元

一、A1

1. 我国妇女以哪种骨盆最常见

- A. 女型
- B. 男型
- C. 扁平型
- D. 混合型
- E. 类人猿型

【正确答案】A

【答案解析】骨盆的类型:

- (1) 女型: 骨盆入口呈横椭圆形, 最多见。
- (2) 男型: 亦称为漏斗型骨盆。最少见。
- (3) 类人猿型: 骨盆前部较窄而后部较宽。
- (4) 扁平型: 骨盆浅。

2. 子宫峡部的上界为

- A. 组织学内口
- B. 组织学外口
- C. 解剖学内口
- D. 解剖学外口
- E. 宫颈内口

【正确答案】 C

【答案解析】 子宫腔是一个上宽下窄的三角形。在子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分称为子宫峡部, 子宫峡部的上端因在解剖上较狭窄, 又称为解剖学内口; 峡部的下端, 因黏膜组织在此处由子宫腔内膜转变成子宫颈黏膜, 又称组织学内口。

3. 关于前庭大腺的叙述错误的是

- A. 又称巴氏腺, 位于大阴唇后部, 为球海绵体肌覆盖
- B. 左右各一个
- C. 开口于处女膜与小阴唇之间的沟内
- D. 正常时如黄豆大小, 检查时可触及
- E. 腺管堵塞, 可形成前庭大腺囊肿或脓肿

【正确答案】 D

【答案解析】 前庭大腺又称巴多林腺(简称巴氏腺), 位于阴道口的两侧, 大阴唇后部, 被球海绵体肌覆盖。如黄豆大, 左右各一。腺管细长, 约1~2cm, 开口于前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内, 性兴奋时分泌黏液, 起润滑作用。正常情况下不能触及此腺, 若腺管口闭塞, 易形成脓肿或囊肿。

4. 关于子宫的解剖, 下列叙述错误的是

- A. 子宫位于骨盆中央, 呈倒置梨形
- B. 子宫重约50g
- C. 子宫的容积约5~6ml
- D. 成人期宫体与宫颈比例为2:1
- E. 子宫峡部内膜与宫颈内膜相同

【正确答案】 E

【答案解析】 子宫峡部内膜与宫腔内膜是一致的, 青春期后可有周期性的剥脱出血。宫颈内膜则不同, 无周期性剥脱出血。

5. 月经的产生是

- A. 脏腑、气血、经络共同作用于胞宫的生理现象
- B. 肾气、冲任、气血共同作用于胞宫的生理现象
- C. 肾气、天癸、冲任、气血共同作用于胞宫的生理现象
- D. 脏腑、经络、天癸共同作用于胞宫的生理现象
- E. 气血、脏腑、天癸共同作用于胞宫的生理现象

【正确答案】 C

【答案解析】 月经是肾气、天癸、冲任、气血协调作用于胞宫, 并在其他脏腑、经络的协同作用下, 使胞宫定期藏泻而产生的生理现象, 是女性生殖功能正常的反映。

6. 促性腺激素释放激素对其本身合成、分泌的抑制称为

- A. 长反馈
- B. 短反馈
- C. 逆反馈
- D. 超短反馈
- E. 超长反馈

【正确答案】 D

【答案解析】 反馈调节包括长反馈、短反馈和超短反馈。长反馈是指卵巢分泌到循环中的性激素对下丘脑垂体的反馈作用；短反馈是指垂体激素对下丘脑 GnRH 分泌的负反馈；超短反馈是指 GnRH 对其本身合成、分泌的抑制。

7. 属于黄体生成素生理作用的是

- A. 排卵前促使卵母细胞进一步成熟及排卵
- B. 调节优势卵泡的选择和非优势卵泡的闭锁
- C. 直接促进窦前卵泡及窦状卵泡的生长发育
- D. 激活颗粒细胞芳香化酶，促进雌二醇的合成与分泌
- E. 在卵泡期晚期与雌激素协同，诱导颗粒细胞生成 LH 受体，为排卵及黄素化作准备

【正确答案】 A

【答案解析】 黄体生成素 (LH) 的主要生理作用是在卵泡期刺激卵泡膜细胞合成雄激素，为雌二醇的合成提供底物；排卵前促使卵母细胞进一步成熟及排卵；在黄体期维持黄体功能，促进孕激素、雌激素合成与分泌。

8. 关于足月胎盘的大体结构，错误的是

- A. 胎盘呈椭圆形
- B. 重约 450~650g
- C. 直径 > 22cm
- D. 厚 1~3cm
- E. 中间厚，边缘薄

【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠足月胎盘呈圆形或椭圆形，重约 450~650g，直径 16~20cm，厚 1~3cm，中央厚，边缘薄。

9. 妊娠期血液成分的变化，应排除哪项

- A. 血细胞比容降至 0.31~0.34
- B. 网织红细胞轻度增多
- C. 白细胞增加，多数超过 $15 \times 10^9/L$
- D. 白细胞的增加主要为中性多核细胞
- E. 血浆蛋白至妊娠中期后约为 60~65g/L

【正确答案】 C

【答案解析】 血细胞比容由 0.38~0.47 下降到 0.31~0.34。妊娠期网织红细胞轻度增多。妊娠 7~8 周开始轻度增加，30 周达高峰，为 $(5 \sim 12) \times 10^9/L$ ，主要为中性粒细胞增加。由于血液稀释，血浆蛋白从孕早期开始降低，至妊娠中期后约为 60~65g/L。

10. 下列哪项不属于肛查了解的范围

- A. 先露高低
- B. 骶骨前面弯曲程度
- C. 髂耻内径长度
- D. 坐骨棘间径
- E. 坐骨切迹宽度

【正确答案】 C

【答案解析】 肛查可了解胎先露部、骶骨前面弯曲度、坐骨棘间径、坐骨切迹宽度及骶尾关节活动度，并测量出口后矢状径。

11. 枕先露肛诊检查时，胎头下降程度为+2是指

- A. 胎头最低点在坐骨棘平面下 2cm
- B. 胎儿头部最低在坐骨结节平面下 2cm
- C. 胎头颅骨最低点在坐骨棘平面下 2cm
- D. 胎儿顶骨在坐骨棘平面上 2cm
- E. 胎儿顶骨在坐骨结节平面上 2cm

【正确答案】 C

【答案解析】 坐骨棘平面是判断胎头高低的标志。胎头颅骨最低点平坐骨棘平面时以“0”表达；在坐骨棘平面上 1cm 时以“-1”表达；在坐骨棘平面下 1cm 时以“+1”表达，以此类推。

12. 下列哪项不是决定分娩难易的重要因素

- A. 胎儿大小
- B. 胎方位
- C. 胎心率
- D. 骨盆大小
- E. 产力强弱

【正确答案】 C

【答案解析】 决定分娩的四因素包括产力、产道、胎儿及精神心理因素。其中胎儿因素有胎儿大小、胎位以及胎儿畸形等。胎心率对分娩难易影响不大。

13. 分娩时易形成轻度裂伤的是

- A. 子宫颈外口 3 点处
- B. 子宫颈外口 6 点处
- C. 子宫颈外口 8 点处
- D. 子宫颈外口 10 点处
- E. 子宫颈外口 12 点处

【正确答案】 A

【答案解析】 分娩时子宫颈外口 3 点、9 点处易形成轻度裂伤。

14. 妇科常见情志致病因素为

- A. 喜、怒、忧
- B. 怒、思、恐
- C. 忧、恐、惊
- D. 喜、忧、恐
- E. 喜、悲、惊

【正确答案】 B

【答案解析】 妇科常见情志致病因素为怒、思、恐。

15. 妇科外治法中熏洗法将药物煮沸的时间为

- A. 10~20 分钟
- B. 20~30 分钟
- C. 30~60 分钟
- D. 60~90 分钟
- E. 90~120 分钟

【正确答案】B

【答案解析】熏洗法：将药物煮沸 20~30 分钟，煎汤至 1000~2000ml，趁热熏蒸或熏洗患部。

16. 早期诊断异位妊娠的重要方法是

- A. 诊断性刮宫
- B. 腹腔镜检查
- C. B 型超声检查
- D. 血 β -hCG 测定
- E. 阴道后穹窿穿刺

【正确答案】D

【答案解析】血 β -hCG 测定是早期诊断异位妊娠的重要方法。

17. 尿路感染所属的中医学范畴是

- A. 热淋
- B. 劳淋
- C. 子淋
- D. 腰痛
- E. 虚劳

【正确答案】C

【答案解析】尿路感染属中医“子淋”范畴。

18. 臀先露多可自然回转成头位的妊娠时间为

- A. 妊娠 28 周前
- B. 妊娠 30 周前
- C. 妊娠 32 周前
- D. 妊娠 34 周前
- E. 妊娠 36 周前

【正确答案】B

【答案解析】妊娠 30 周前，臀先露多可自然回转成头位。

19. 可提示胎盘功能不良的是

- A. 尿雌三醇 (E_3) $>10\text{mg}/24\text{h}$
- B. 尿中雌激素/肌酐比值 >10
- C. 血清胎盘生乳素 $>4\text{mg}/\text{L}$
- D. 连续测定尿雌三醇下降 $>30\%$
- E. 妊娠特异 β 1 糖蛋白 (SP1) $>100\text{mg}/\text{L}$

【正确答案】D

【答案解析】尿雌三醇 (E_3) $<10\text{mg}/24\text{h}$ ，或连续测定下降 $>30\%$ 、尿中雌激素/肌酐比值 <10 、血清胎盘生乳素 $<4\text{mg}/\text{L}$ 、妊娠特异 β 1 糖蛋白 (SP1) $<100\text{mg}/\text{L}$ ，均提示胎盘功能不良。

20. 盆腔炎症性疾病的中医病因病机为

- A. 气虚和肾虚
- B. 肾虚和血瘀
- C. 热毒炽盛、湿热瘀结
- D. 肝郁气滞和湿热下注
- E. 气虚、肾虚、血瘀、气滞

【正确答案】C

【答案解析】盆腔炎性疾病的常见病因病机为热毒炽盛、湿热瘀结。

21. 月经病的治疗原则是

- A. 治本调经
- B. 清热利湿
- C. 化瘀止痛
- D. 补肾调经
- E. 清热解毒

【正确答案】 A

【答案解析】 月经病的治疗原则是重在治本调经。

22. 欲了解宫腔及输卵管开口情况, 需要做的检查是

- A. 宫腔镜检查
- B. 腹腔镜检查
- C. B型超声检查
- D. 宫颈黏液检查
- E. 阴道脱落细胞学检查

【正确答案】 A

【答案解析】 宫腔镜检查: 了解宫腔及输卵管开口情况。

23. 小儿生长发育最迅速的时期是

- A. 幼儿期
- B. 新生儿期
- C. 学龄期
- D. 学龄前期
- E. 婴儿期

【正确答案】 E

【答案解析】 婴儿期是小儿生长发育最迅速的时期。

24. 中度脱水时患儿失水量约为体重的

- A. 5%以下
- B. 5%左右
- C. 5%~10%
- D. 10%左右
- E. 10%以上

【正确答案】 C

【答案解析】 中度脱水: 失水量占体重的 5%~10% (50~100ml/kg)。轻度脱水: 失水量占体重 5%以下 (30~50ml/kg)。重度脱水: 失水量占体重的 10%以上 (100~120ml/kg)。

25. 幼儿哭吵不安, 两手捧腹, 应首先考虑的是

- A. 腹痛
- B. 久病体虚
- C. 欲食不遂
- D. 乳食内积
- E. 痰饮内伏

【正确答案】 A

【答案解析】 小儿望诊中望姿态: “阳主动, 阴主静”。喜伏卧者, 多为内伤乳食; 喜蜷卧者, 多为内寒或腹痛; 翻滚不安, 呼叫哭吵, 双手捧腹, 多为腹痛; 端坐喘促, 痰鸣哮喘, 多为哮喘; 气促鼻扇, 胸肋凹陷, 常为肺炎喘嗽。故正确的答案是 A。

26. 母乳喂养早吸吮的最合理时间是

- A. 出生后 30 分钟内
- B. 出生后 1~2 小时
- C. 出生后 2~6 小时
- D. 出生后 6~24 小时
- E. 出生后 24~48 小时

【正确答案】 A

【答案解析】 母乳喂养的方法: 主张正常足月新生儿出生半小时内就可开奶, 满月前坚持按需喂哺, 随着月龄增长逐渐定时喂养, 每次哺乳不宜超过 20 分钟。

27. 迁延性肺炎的病程为

- A. >1 个月
- B. 1~3 个月
- C. 1~4 个月
- D. 1~5 个月
- E. 1~6 个月

【正确答案】 B

【答案解析】 小儿肺炎病程分类: 病程 < 1 月者, 称为急性肺炎; 1~3 个月称为迁延性肺炎; > 3 月者称为慢性肺炎。

28. 小儿风热感冒的治法宜选用

- A. 辛温解表
- B. 辛凉解表
- C. 清暑解表
- D. 清热解毒
- E. 辛凉解毒

【正确答案】 B

【答案解析】 风热感冒的证候: 发热重, 恶风, 有汗或少汗, 头痛, 鼻塞, 鼻涕浊涕, 喷嚏, 咳嗽, 痰稠色白或黄, 咽红肿痛, 口干渴, 舌质红, 苔薄黄, 脉浮数或指纹浮紫。

治法: 辛凉解表。

方药: 银翘散加减。

29. 小儿肺炎风热闭肺的首选方剂是

- A. 三拗汤
- B. 桑菊饮
- C. 沙参麦冬汤
- D. 荆防败毒散
- E. 银翘散合麻杏石甘汤

【正确答案】 E

【答案解析】 肺炎之风热闭肺证。

证候: 初起证候稍轻, 发热恶风, 咳嗽气急, 痰多, 痰稠黏或黄, 口渴咽红, 舌红, 苔薄白或黄, 脉浮数。重证则见高热烦躁, 咳嗽微喘, 气急鼻扇, 喉中痰鸣, 面色红赤, 便干尿黄, 舌红苔黄, 脉滑数, 指纹紫滞。

治法: 辛凉宣肺, 清热化痰。

方药: 银翘散合麻杏石甘汤加减。

30. 引起鹅口疮的病原是

- A. 流感杆菌

- B. 葡萄球菌
- C. 白色念珠菌
- D. 柯萨奇病毒
- E. 链球菌

【正确答案】C

【答案解析】鹅口疮为白色念珠菌感染所致，多见于营养不良、慢性腹泻、长期使用广谱抗生素或激素的患儿。

31. 治疗小儿泄泻阴竭阳脱证的首选方剂是

- A. 当归四逆汤
- B. 参苓白术散
- C. 人参乌梅汤
- D. 附子理中汤合四神丸
- E. 生脉散合参附龙牡救逆汤

【正确答案】E

【答案解析】泄泻之阴竭阳脱证。

证候：泻下不止，次频量多，精神萎靡，表情淡漠，面色青灰或苍白，哭声微弱，啼哭无泪，尿少或无，四肢厥冷，舌淡无津，脉沉细欲绝。

治法：挽阴回阳，救逆固脱。

方药：生脉散合参附龙牡救逆汤加减。

32. 治疗小儿肾病综合征中水湿证的首选方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 六味地黄丸
- C. 知柏地黄丸
- D. 防己黄芪汤合五苓散
- E. 防己黄芪汤合己椒苈黄丸

【正确答案】E

【答案解析】肾病综合征标证中的水湿证。

证候：全身浮肿，肿甚者皮肤光亮，可伴见腹胀水臌，水聚肠间，辘辘有声，或见胸闷气短，心下痞满，甚有喘咳，小便短少，脉沉。

治法：一般从主证治法。伴水臌、悬饮者可短期采用补气健脾、逐水消肿法。

方药：防己黄芪汤合己椒苈黄丸加减。

33. 小儿急性肾小球肾炎水凌心肺证的治法是

- A. 清热解毒，行气利水
- B. 泻肺逐水，温阳扶正
- C. 益肾健脾，温阳化水
- D. 温运中阳，行气利水
- E. 益肾健脾，行气利水

【正确答案】B

【答案解析】水凌心肺证的证候：全身明显浮肿，频咳气急，胸闷心悸，不能平卧，烦躁不宁，面色苍白，甚则唇指青紫，舌质暗红，舌苔白腻，脉沉细无力。

治法：泻肺逐水，温阳扶正。

方药：己椒苈黄丸合参附汤加减。

34. 病毒性脑炎的病因治疗中对于单纯性疱疹病毒，可给与治疗的药物是

- A. 阿昔洛韦

- B. 更昔洛韦
- C. 干扰素
- D. 病毒唑
- E. 免疫球蛋白

【正确答案】A

【答案解析】病毒性脑炎病因治疗:对于单纯性疱疹病毒可给予阿昔洛韦治疗,每次 10mg/kg 于 1 小时内静脉滴注,每 8 小时用 1 次,疗程 1~2 周。

35. 小儿多发性抽动症痰火扰心证治疗首选方为

- A. 醒脾散
- B. 大定风珠
- C. 千金龙胆汤
- D. 礞石滚痰丸
- E. 黄连温胆汤

【正确答案】D

【答案解析】多发性抽动症之痰火扰心证。

证候:头面、躯干、四肢肌肉抽动,频繁有力,喉中痰鸣,怪声不断,甚或骂人,烦躁口渴,睡眠不安,舌质红,苔黄腻,脉滑数。

治法:泻火涤痰,清心安神。

方药:礞石滚痰丸加减。

36. 免疫性血小板减少症慢性型的病程是

- A. 病程 > 1 个月
- B. 病程 > 2 个月
- C. 病程 > 3 个月
- D. 病程 > 5 个月
- E. 病程 > 6 个月

【正确答案】E

【答案解析】免疫性血小板减少症病程超过 6 个月者为慢性型,多见于学龄前及学龄期儿童,约 10% 的病人由急性型转化而来。

37. 性早熟是指男孩、女孩分别在几岁以前出现青春期特征

- A. 8、7
- B. 9、8
- C. 10、9
- D. 11、10
- E. 12、11

【正确答案】B

【答案解析】性早熟是指女孩 8 岁以前、男孩 9 岁以前,出现青春期特征即第二性征的一种内分泌疾病。

38. 过敏性紫癜血热妄行证的首选方剂是

- A. 小蓟饮子
- B. 大蓟饮子
- C. 犀角地黄汤
- D. 清营汤
- E. 导赤散

【正确答案】C

【答案解析】过敏性紫癜血热妄行证。

证候：起病急骤，壮热面赤，咽干，心烦，渴喜冷饮，皮肤瘀斑瘀点密集或成片，伴鼻衄、齿衄，大便干燥，小便黄赤，舌质红绛，苔黄燥，脉弦数。

治法：清热解毒，凉血化斑。

方药：犀角地黄汤加减。

39.蛋白质-能量营养不良属于中医上“疳证”的范畴，其主要病变部位是

- A. 心脾
- B. 肝脾
- C. 脾胃
- D. 肺脾
- E. 心胃

【正确答案】 C

【答案解析】疳证病情复杂，虚实有别，主要病变部位在脾胃。故此题的正确选项是 C。

40.佝偻病肾虚骨弱型的治法是

- A. 补肾填精，健脾益气
- B. 健脾补肾，填精补髓
- C. 健脾助运，平肝息风
- D. 健脾益肺，调和营卫
- E. 平肝潜阳，健脾益气

【正确答案】 B

【答案解析】佝偻病之肾虚骨弱证。

证候：激期和后遗症期常见，有明显的骨骼改变，常见头颅方大畸形，肋骨串珠，手镯、足镯，甚至鸡胸、龟背，O型或X型腿，脊柱畸形等，并伴有面白虚烦，形瘦神疲，筋骨萎软，多汗，四肢乏力，舌淡苔少，指纹色淡。

治法：健脾补肾，填精补髓。

方药：补肾地黄丸加减。

41.流行性腮腺炎的肿胀部位以下列哪项为中心

- A. 颌下
- B. 颈下
- C. 耳后
- D. 耳垂
- E. 面颊部

【正确答案】 D

【答案解析】腮腺肿胀是以耳垂为中心，向前、后、下发展，边缘不清、触之有弹性感及触痛，表面皮肤不红，张口、咀嚼困难。腮肿约3~5天达高峰，1周左右逐渐消退。

42.治疗麻疹麻毒攻喉证的首选方剂是

- A. 宣毒发表汤
- B. 清解透表汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 清咽下痰汤

【正确答案】 E

【答案解析】麻疹之麻毒攻喉证。

证候：身热不退，咽喉肿痛或溃烂疼痛，饮水呛咳，声音嘶哑，咳声重浊，状如犬吠，喉间

痰鸣,甚则吸气困难,胸高肋陷,面唇紫绀,舌质红,苔黄腻,脉滑数。

治法:清热解毒,利咽消肿。

方药:清咽下痰汤加减。

43.治疗汗证之湿热迫蒸证首选方剂为

- A. 泻黄散
- B. 银翘散
- C. 玉屏风散
- D. 不换金正气散
- E. 黄芪桂枝五物汤

【正确答案】 A

【答案解析】 汗证之湿热迫蒸证。

证候:汗出过多,以额、心胸为甚,汗出肤热,汗渍色黄,口臭,口渴不欲饮,小便色黄,舌质红,苔黄腻,脉滑数。

治法:清热泻脾。

方药:泻黄散加减。

44.厌食的针灸疗法中,治疗脾胃气虚证的穴位不包括

- A. 脾俞
- B. 胃俞
- C. 阴陵泉
- D. 足三里
- E. 三阴交

【正确答案】 C

【答案解析】 厌食的针灸疗法中取脾俞、胃俞、足三里、三阴交,用补法。用于治疗脾胃气虚证。选项C中阴陵泉主要是用于治疗脾胃阴虚证。故此题的正确选项是C。

45.以下哪组经脉不属于表里关系

- A. 手太阴肺经、手阳明大肠经
- B. 足少阴肾经、足太阳膀胱经
- C. 手少阴心经、手少阳三焦经
- D. 足太阴脾经、足阳明胃经
- E. 足厥阴肝经、足少阳胆经

【正确答案】 C

【答案解析】 手少阴心经应该与手太阳小肠经相表里。

46.手少阳三焦经与足少阳胆经的循行交接部位是

- A. 鼻旁
- B. 目外眦
- C. 目内眦
- D. 无名指端
- E. 足小趾端

【正确答案】 B

【答案解析】 手足少阳经皆通于目外眦。

47.大肠的募穴是

- A. 下脘
- B. 中脘
- C. 梁门

- D. 水道
- E. 天枢

【正确答案】 E

【答案解析】 天枢为大肠的募穴。

48. 既是脾经络穴又属于八脉交会穴的是

- A. 公孙
- B. 丰隆
- C. 后溪
- D. 列缺
- E. 阴陵泉

【正确答案】 A

【答案解析】 公孙既是脾经的络穴，同时也是八脉交会穴，通冲脉。

49. 股骨大转子至腓横纹的骨度分寸是

- A. 13寸
- B. 14寸
- C. 16寸
- D. 18寸
- E. 19寸

【正确答案】 E

【答案解析】 股骨大转子至腓横纹的骨度分寸是：19寸。

50. 在小腿外侧，外踝尖上8寸，胫骨前肌外缘；条口旁开1寸的穴位是

- A. 丰隆
- B. 地机
- C. 解溪
- D. 上巨虚
- E. 下巨虚

【正确答案】 A

【答案解析】 丰隆

【定位】 在小腿外侧，外踝尖上8寸，胫骨前肌外缘；条口旁开1寸。

51. 屈肘，当时横纹内侧端与肱骨内上髁连经的中点处的腧穴是

- A. 曲池
- B. 曲泽
- C. 尺泽
- D. 少海
- E. 小海

【正确答案】 D

【答案解析】 屈肘，当时横纹内侧端与肱骨内上髁连经的中点处的腧穴是：少海。

52. 在颈后区，横平第2颈椎棘突上际，斜方肌外缘凹陷中的腧穴是

- A. 风池
- B. 天柱
- C. 风府
- D. 翳风
- E. 风门

【正确答案】 B

【答案解析】天柱

【定位】在颈后区，横平第2颈椎棘突上际，斜方肌外缘凹陷中。

53.足少阴肾经在腹部的循行是旁开前正中线

- A. 0.5寸
- B. 1寸
- C. 2寸
- D. 4寸
- E. 6寸

【正确答案】A

【答案解析】足少阴肾经在腹部的循行是旁开前正中线：0.5寸。

54.经脉循行“其支者，从耳后入耳中，出走耳前，过客主人，前交颊，至目锐眦”者是以下哪条经脉

- A. 足少阳胆经
- B. 足少阴肾经
- C. 手阳明大肠经
- D. 手少阳三焦经
- E. 手太阳小肠经

【正确答案】D

【答案解析】手少阳三焦经循行：“另一支脉，从耳后分出，进入耳中，再浅出到耳前，经上关、面颊到目外眦”。

55.下列腧穴中，不属于督脉的腧穴是

- A. 腰阳关
- B. 上星
- C. 水沟
- D. 承浆
- E. 素髎

【正确答案】D

【答案解析】承浆属于任脉的穴位。

56.斜刺是指进针时针身与皮肤表面的角度为

- A. 15°左右
- B. 25°左右
- C. 30°左右
- D. 45°左右
- E. 60°左右

【正确答案】D

【答案解析】斜刺：是针身与皮肤表面约呈45°刺入。此法适用于肌肉浅薄处或内有重要脏器，或不宜直刺、深刺的腧穴。

57.有关针刺部位消毒的叙述错误的是

- A. 用75%酒精棉球擦拭
- B. 先用2%碘酊涂擦，稍干后，再用75%酒精棉球擦拭
- C. 用戊二醛溶液擦拭
- D. 从腧穴部位的中心点向外绕圈消毒
- E. 消毒后要保持洁净，防止重新污染

【正确答案】C

【答案解析】戊二醛溶液常用来消毒直接和毫针接触的针盘、针管、针盒、镊子等，针刺部位的消毒一般采用75%酒精。

58. 下列哪项不属于艾条灸

- A. 温和灸
- B. 雀啄灸
- C. 回旋灸
- D. 无瘢痕灸
- E. 太乙针灸

【正确答案】D

【答案解析】无瘢痕灸属于艾炷灸，不属于艾条灸。

59. 具有镇静、止痛、缓解肌肉痉挛选用的电针波型是

- A. 疏波
- B. 密波
- C. 疏密波
- D. 断续波
- E. 锯齿波

【正确答案】B

【答案解析】连续波中的密波易产生抑制效应，常用于止痛、镇静、缓解肌肉和血管痉挛等。

60. 下列哪项不属于同名经配穴

- A. 耳鸣取中渚、足临泣
- B. 头痛取外关、阳陵泉
- C. 失眠取神门、三阴交
- D. 牙痛取合谷、内庭
- E. 便秘取天枢、合谷

【正确答案】C

【答案解析】同名经配穴法是将手足同名经的腧穴相互配合组成处方的方法。神门属于手少阴心经，三阴交属于足太阴脾经。所以不属于同名经配穴。

61. 治疗饮食伤胃型胃痛，除主穴外，还应加用

- A. 三阴交、内庭
- B. 膈俞、胃俞
- C. 胃俞、脾俞
- D. 下脘、梁门
- E. 气海、关元

【正确答案】D

【答案解析】胃痛的处方

主穴中脘足三里内关

配穴寒邪客胃配胃俞；饮食伤胃配梁门、下脘；肝气犯胃配期门、太冲；瘀血停胃配膈俞、三阴交。脾胃虚寒配关元、脾俞、胃俞；胃阴不足配胃俞、三阴交、内庭。

62. 针灸治疗遗尿，除相应背俞穴外，还应选取以下哪组经脉的腧穴

- A. 足太阳、足少阴
- B. 足太阳、手太阴
- C. 足太阳、手少阴
- D. 任脉、足太阳
- E. 任脉、足太阴

【正确答案】 E

【答案解析】 遗尿的治法: 调理膀胱, 温肾健脾。取任脉、足太阴经穴及膀胱的背俞穴、募穴为主。

63. 治疗耳鸣实证, 应选用以下哪组腧穴为主

- A. 合谷、外关、翳风、侠溪
- B. 百会、听会、风池、翳风
- C. 太溪、照海、听宫、肾俞
- D. 翳风、听会、中渚、侠溪
- E. 太冲、耳门、听宫、外关

【正确答案】 D

【答案解析】 耳鸣实证的针灸治疗:

主穴: 听会翳风中渚侠溪。

64. 十二经脉的别络从本经分出的部位是

- A. 腕踝关节以下
- B. 肘膝关节以下
- C. 肘膝关节以上
- D. 肩关节、髋枢周围
- E. 四肢末端的指、趾部

【正确答案】 B

【答案解析】 十二经络脉在四肢肘膝关节以下本经络穴分出。

二、A2

65. 一女性患者, 3天前外阴部发现囊肿前来就诊, 经检查发现囊肿位于大阴唇后部, 前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内, 最可能的诊断是

- A. 外阴肿瘤
- B. 外阴上皮内瘤样病变
- C. 外阴癌
- D. 外阴良性肿瘤
- E. 前庭大腺囊肿

【正确答案】 E

【答案解析】 前庭大腺开口于前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内, 性兴奋时分泌黏液, 起润滑作用。正常情况下不能触及此腺, 若腺管口闭塞, 易形成脓肿或囊肿。

66. 患者, 女, 31岁, 以往有多次刮宫史, 妊娠 33周出现无诱因、无痛性反复阴道流血, 该患者可考虑诊断为

- A. 胎膜早破
- B. 胎动不安
- C. 前置胎盘
- D. 异位妊娠
- E. 胎盘早剥

【正确答案】 C

【答案解析】 根据该患者的病史(多次刮宫)、妊娠的周数以及症状(无诱因、无痛性反复阴道流血)考虑该患者为前置胎盘。

67. 患者, 女, 29岁, 妊娠期间身目俱黄, 色鲜明如橘子色, 右胁胀痛, 恶心厌食, 口苦咽干, 胸胁痞满, 倦怠乏力, 尿黄便坚; 舌质红, 苔黄腻, 脉弦滑, 治疗首选

- A. 胃苓汤
- B. 逍遥散
- C. 茵陈蒿汤
- D. 犀角地黄汤
- E. 黄连解毒汤

【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠合并急性病毒性肝炎湿热蕴结证。

证候：妊娠期间身目俱黄，色鲜明如橘子色，右胁胀痛，恶心厌食，口苦咽干，胸胁痞满，倦怠乏力，尿黄便坚；舌质红，苔黄腻，脉弦滑或濡数。

治法：清热利湿，佐以安胎。

方药：茵陈蒿汤加金钱草、虎杖、寄生、续断。

68. 患者，女，26岁，新产后，突然阴道大量出血，血色鲜红，头晕目花，心悸怔忡，气短懒言，肢冷汗出，面色苍白；舌淡，脉虚数。选用的治法为

- A. 活血化瘀，调冲止血
- B. 活血化瘀，理血归经
- C. 补气固冲，摄血止崩
- D. 补脾益气，固冲摄血
- E. 养阴清热，安冲止血

【正确答案】 C

【答案解析】 产后出血气虚证的证候：新产后，突然阴道大量出血，血色鲜红，头晕目花，心悸怔忡，气短懒言，肢冷汗出，面色苍白；舌淡，脉虚数。

治法：补气固冲，摄血止崩。

方药：升举大补汤去黄连，加地榆炭、乌贼骨。

69. 患者，女，30岁，已婚。产后20天，乳汁甚少而清稀，乳房小而柔软。分娩时曾出血过多，面色少华，食欲不振，神疲乏力，头晕心悸。舌淡白，脉虚细。其中医证型是

- A. 气血虚弱证
- B. 肝郁气滞证
- C. 脾肾两虚证
- D. 肝胃不和证
- E. 肝经郁热证

【正确答案】 A

【答案解析】 此患者为产后缺乳的气血虚弱证。

证候：产后乳少或全无，乳汁清稀，乳房柔软，无胀感，面色少华，神疲乏力，食欲不振，或心悸头晕；舌淡白，脉虚细。

治法：补气养血，佐以通乳。

方药：通乳丹去木通，加通草。

70. 患者，女，45岁，已婚。外阴干燥瘙痒三年，夜间尤甚，伴腰酸乏力，双目干涩，检查：双侧大阴唇及阴唇后联合处色素减退，局部皮肤薄膜粗糙。治疗应首选的方剂是

- A. 归肾丸合二至丸
- B. 归脾汤
- C. 黑逍遥散
- D. 右归丸
- E. 人参养荣汤

【正确答案】 A

【答案解析】根据给出的题干信息，患者是外阴硬化性苔藓的肝肾阴虚证的表现。
证候：外阴干燥瘙痒，夜间尤甚，局部皮肤萎缩，色素减退或消失，变白或粉红，干燥薄脆，阴道口缩小，伴头晕目眩，双目干涩，腰膝酸楚；舌红，苔少，脉细或细数。

治法：补益肝肾，养荣润燥。

方药：归肾丸合二至丸。

71. 患者，女，36岁，带下量增多一个月，色黄，呈脓样，阴痒，口干口苦，小便黄赤，大便干结，舌苔薄黄腻，脉弦数。西医诊断为阴道炎，治疗应首选的方剂是

- A. 内补丸
- B. 完带汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 萆薢渗湿汤
- E. 仙方活命饮

【正确答案】C

【答案解析】此患者表现为阴道炎之肝经湿热证。

证候：带下多，色白或黄，呈泡沫状或黄绿如脓，甚或杂有赤带，有臭味，外阴瘙痒，头晕目眩，心烦口苦，胸胁、少腹胀痛，尿黄便结；舌质红，苔黄，脉弦涩。

治则：清热利湿，杀虫止痒。

方药：龙胆泻肝汤加苦参、百部、蛇床子。故此题的最佳选项是C。

72. 女性，30岁，婚后5年不孕，近6年开始痛经，进行性加重，曾做子宫输卵管碘油造影，提示双侧输卵管通而不畅。妇科检查：阴道后穹隆扪及触痛结节，子宫大小正常，右附件扪及4cm×4cm×3cm大小不活动的囊性包块。为明确诊断，首选的检查应为

- A. 腹腔镜检查
- B. 宫腔镜检查
- C. B超检查
- D. 剖腹产检查
- E. 盆腔CT检查

【正确答案】A

【答案解析】结合患者进行性加重的痛经以及妇科检查初步考虑该患者为子宫内膜异位症，腹腔镜检查是目前诊断子宫内膜异位症的最佳方法。

73. 患者，女，29岁，痛经4年，月经量多，有血块，已自然流产3次，伴有头晕耳鸣，腰膝酸软。1年前行腹腔镜检查，诊断为子宫内膜异位症。中医治疗的最佳选方是

- A. 五子衍宗丸
- B. 归肾丸合桃红四物汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 六味地黄丸
- E. 理冲汤

【正确答案】B

【答案解析】子宫内膜异位症之肾虚血瘀证。

证候：经行腹痛，痛引腰骶，月经先后不定期，经量或多或少，色淡黯质稀，或有血块，不孕或易流产，头晕耳鸣，腰膝酸软，性欲减退，盆腔可及结节或包块；舌淡黯或有瘀点，苔薄白，脉沉细而涩。

治法：补肾益气，活血化瘀。

方药：归肾丸合桃红四物汤。

74. 女性，25岁，结婚两年，因漏服避孕药后停经50天，尿妊娠试验阳性，阴道流血1周，

少于月经量,兼有腹痛,下列哪种处理措施最为理想

- A. 注射大量的安宫黄体酮保胎
- B. 镇静,卧床休息
- C. 人工流产
- D. 经保胎无效再人流
- E. 注射绒毛膜促性腺激素保胎

【正确答案】 C

【答案解析】 因患者停经 50 天,尿妊娠试验阳性,可做早孕诊断。但有阴道流血,间有腹痛,且为漏服避孕药所致早孕,故考虑采取人工流产。答案选择 C。

75. 患者正常宫内妊娠 45 天,曾多次人工流产,瘢痕子宫,要求终止妊娠,对手术流产恐惧。应采取的措施是

- A. 负压吸引术
- B. 药物流产
- C. 钳刮术
- D. 手术流产
- E. 输卵管绝育术

【正确答案】 B

【答案解析】 药物流产是应用药物终止早期妊娠的方法,目前临床常用米非司酮配伍米索前列醇。米非司酮具有抗孕酮特性,同时释放内源性前列腺素,促进子宫收缩及宫颈软化。米索前列醇有明显的收缩子宫作用。

适应证:

- (1) 正常宫内妊娠,孕龄 7 周以内,自愿要求药物终止妊娠的健康育龄妇女。
- (2) 高危人流对象,如瘢痕子宫、多次人工流产及严重骨盆畸形等。
- (3) 对手术流产有恐惧或顾虑心理者。

76. 女性,28 岁,孕 4 产 1,于产后 1 年停哺乳,月经来潮,月经干净 3 天后放置宫内节育器顺利。以下哪项不属于放置宫内节育器的并发症

- A. 节育器嵌顿
- B. 节育器移位
- C. 月经过多、经期延长
- D. 节育器下移
- E. 带器妊娠

【正确答案】 C

【答案解析】 放置宫内节育器的并发症:

- (1) 子宫穿孔、节育器异位。
- (2) 节育器嵌顿或断裂。
- (3) 节育器下移或脱落。
- (4) 带器妊娠。

77. 小儿,男,3 岁,站位测身高 91cm,体重 14kg。评价其生长发育状况最恰当的是

- A. 正常范围
- B. 身高体重低于正常
- C. 身高正常,体重低于标准
- D. 体重正常,身高低于标准
- E. 身高体重超过正常

【正确答案】 D

【答案解析】根据公式：2岁至青春前期体重： $\text{年龄} \times 2 (\text{kg}) + 8 (\text{kg})$ 。
2~12岁身高（长）的估算公式为： $\text{身高} (\text{cm}) = 7 \times \text{年龄} + 75$ 。

结合题干中给出的信息，此小儿的生长发育状况是在正常范围内。故正确的选项是 A。

78. 患儿，男，2岁。鼻塞流涕，咽部充血，兼见咳嗽较剧，咳声重浊，喉中痰鸣，舌苔厚腻。其诊断是

- A. 感冒夹滞
- B. 感冒夹惊
- C. 感冒夹痰
- D. 风寒感冒
- E. 时行感冒

【正确答案】 C

【答案解析】感冒夹痰的证候：感冒兼见咳嗽较剧，痰多，喉间痰鸣。

治法：辛温解表，宣肺化痰；辛凉解表，清肺化痰。

方药：在疏风解表的基础上，风寒夹痰证加用三拗汤、二陈汤加减。风热夹痰证加用桑菊饮加减。

79. 患儿，男，1岁，诊断为肺炎，症见：突然面色苍白，口唇紫绀，四肢厥冷，呼吸困难，脉细弱而数，指纹青紫达命关。其证型是

- A. 痰热闭肺证
- B. 风热闭肺证
- C. 风寒闭肺证
- D. 邪陷厥阴证
- E. 心阳虚衰证

【正确答案】 E

【答案解析】根据患儿的表现，此为小儿肺炎变证中的心阳虚衰证。

证候：骤然面色苍白，口唇紫绀，呼吸困难或呼吸浅促，额汗不温，四肢厥冷，虚烦不安或神萎淡漠，右肋下出现痞块并渐增大，舌质略紫，苔薄白，脉细弱而数，指纹青紫，可达命关。

治法：温补心阳，救逆固脱。

方药：参附龙牡救逆汤加减。

80. 患儿，男，6个月。口腔内白屑散在，周围红晕不著，形体消瘦，颧红，手足心热，舌红少苔，脉细，指纹紫。其首选方剂宜选用

- A. 知柏地黄丸
- B. 六味地黄丸
- C. 玉屏风散
- D. 清胃散
- E. 薏苡仁汤

【正确答案】 A

【答案解析】此为鹅口疮之虚火上浮证的表现。

证候：口腔内白屑散在，周围红晕不著，形体瘦弱，颧红，手足心热，口干不渴，舌红，苔少，脉细或指纹紫。

治法：滋阴降火。

方药：知柏地黄丸加减。

81. 患儿，女，2岁。腹泻2天，泄泻清稀，夹有泡沫，臭气不甚，恶心呕吐，发热，鼻塞流涕，苔薄白。应首先考虑的诊断是

- A. 脾虚泄泻
- B. 湿热泄泻
- C. 伤食泄泻
- D. 风寒泄泻
- E. 湿热痢疾

【正确答案】 D

【答案解析】 风寒泻证候：大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，或伴恶寒发热，鼻流清涕，咳嗽，舌质淡，苔薄白，脉浮紧，指纹淡红。

治法：疏风散寒，化湿和中。

方药：藿香正气散加减。

因此结合题干给出的信息，最佳的选项是 D。

82. 患儿，男，3岁。反复浮肿月余。尿蛋白(++++)，镜检(-)，尿蛋白定量 $>100\text{mg}/(\text{kg}/\text{d})$ ，血清白蛋白 $25\text{g}/\text{L}$ ，胆固醇 $10.4\text{mmol}/\text{L}$ ，血压正常。尿素氮正常。本病例应首先考虑诊断的是

- A. 单纯性肾病综合征
- B. 急性肾炎
- C. 尿路感染
- D. 肾盂肾炎
- E. 急进性肾炎

【正确答案】 A

【答案解析】 肾病综合征的诊断要点：大量蛋白尿(尿蛋白+++~++++，1周内3次测定24小时尿蛋白定量 $\geq 50\text{mg}/\text{kg}$)；血浆白蛋白低于 $30\text{g}/\text{L}$ ；血浆胆固醇高于 $5.7\text{mmol}/\text{L}$ ；不同程度的水肿。以上四项中以大量蛋白尿和低白蛋白血症为必要条件。根据题干给出的各项数值，此题最佳的选项是 A。

83. 患儿，6岁。西医诊断为病毒性脑炎。症见：表情淡漠，目光呆滞，喃喃自语，神识不清，口角流涎，纳差乏力，舌质胖嫩，苔白，脉弦滑。治法宜

- A. 豁痰化痰
- B. 泻火涤痰
- C. 涤痰开窍
- D. 健脾化痰
- E. 涤痰通络

【正确答案】 C

【答案解析】 此患儿为痰蒙清窍证的表现。

痰蒙清窍证的证候：起病稍缓，表情淡漠，目光呆滞，喃喃自语，神识模糊，或见痴呆，语言不利，或见失语，口角流涎，喉间痰鸣，纳差乏力，舌质胖嫩，舌苔白，脉弦滑。

治法：涤痰开窍。

方药：涤痰汤加减。

84. 患儿，女，6岁。症见：乳核增大、触之疼痛、阴道分泌物增多；伴胸闷不舒、心烦易怒、痤疮、便秘、舌红，苔黄，脉弦数。其治疗首选方剂是

- A. 知柏地黄丸
- B. 丹栀逍遥散
- C. 黄连解毒汤
- D. 黄连温胆汤
- E. 柴胡疏肝散

【正确答案】B

【答案解析】此患儿表现为性早熟之肝经郁热证。

证候：女孩乳核增大、触之疼痛、阴道分泌物增多；男孩阴茎勃起，变声。伴胸闷不舒、心烦易怒、暖气叹息痤疮、便秘、舌红，苔黄或黄腻，脉弦数或弦细数。

治法：疏肝解郁，清利湿热。

方药：丹栀逍遥散加减。

85. 患儿，男，8岁。既往有哮喘史，近1月来不咳不喘，但见形寒怯冷，四肢不温，腿膝酸软，尿清而频，舌淡，苔白，脉细无力。其证型是

- A. 寒性哮喘
- B. 热性哮喘
- C. 肺气虚弱证
- D. 肾虚不纳证
- E. 脾气虚弱证

【正确答案】D

【答案解析】支气管哮喘之肾虚不纳证。

证候：面白少华，形寒怯冷，四肢不温，腰膝酸软，动则心悸气促，遗尿或夜间尿多，小便澄清，舌淡，苔薄白，或舌红，苔花剥，脉沉细无力。

治法：补肾固本。

方药：金匮肾气丸加减。

86. 患儿，5岁。肢体虚胖、困重，疲乏无力，少气懒言，纳差，腹满，小便少，舌质淡红，苔白腻，脉沉缓。治疗首选方为

- A. 胃苓汤
- B. 泻黄散
- C. 实脾饮
- D. 归脾汤
- E. 苓桂术甘汤

【正确答案】A

【答案解析】此患儿表现为小儿肥胖症之脾虚痰阻证。

证候：肢体虚胖、困重，疲乏无力，少气懒言，纳差，腹满，小便少，舌质淡红，苔白腻，脉沉缓。

治法：运脾除湿。

方药：胃苓汤加减。

87. 患儿，3岁，一周前曾与患有手足口病的玩伴接触，前日，突然出现发热，流涕咳嗽，纳差恶心、呕吐泄泻，口腔内出现疱疹，破溃后形成小的溃疡，疼痛流涎，不欲进食，手掌、足跖部出现疱疹，分布稀疏，疹色红润，根盘红晕不著，疱液清亮，舌质红，苔薄黄腻，脉浮数。中医治疗首选方为

- A. 茵陈蒿汤
- B. 甘露消毒丹
- C. 清瘟败毒饮
- D. 普济消毒饮
- E. 黄连解毒汤

【正确答案】B

【答案解析】根据题干给出的信息，诊断该患儿为手足口病之邪犯肺脾证。

证候：发热轻微，或无发热，或流涕咳嗽、纳差恶心、呕吐泄泻，1~2天后或同时出现口

腔内疱疹，破溃后形成小的溃疡，疼痛流涎，不欲进食。随病情进展，手掌、足跖部出现米粒至豌豆大斑丘疹，并迅速转为疱疹，分布稀疏，疹色红润，根盘红晕不著，疱液清亮，舌质红，苔薄黄腻，脉浮数。

治法：宣肺解表，清热化湿。

方药：甘露消毒丹加减。

88. 患儿，男，6岁。腹痛剧烈，以右上腹为主，疼痛时时发凉，恶心呕吐，并吐出蛔虫。其诊断为

- A. 呕吐
- B. 蛔厥证
- C. 腹痛
- D. 虫瘕证
- E. 肠虫证

【正确答案】 B

【答案解析】 此患儿表现为蛔虫病之蛔厥证。

蛔厥证证候：具有蛔虫证的一般症状。突然右上腹阵发性绞痛，弯腰曲背，辗转不安，恶心、呕吐，肢冷汗出，常吐出蛔虫。重者腹痛持续，时轻时剧，畏寒发热，甚则出现黄疸。舌苔黄腻，脉弦数或滑数。

治法：安蛔定痛，继以驱虫。

方药：乌梅丸加减。

89. 某女，50岁。头部空痛10年，头痛隐隐，遇劳发作，兼头晕，神疲乏力，面色不华，舌淡，脉细弱。其辨证为

- A. 肾虚头痛
- B. 血虚头痛
- C. 痰浊头痛
- D. 瘀血头痛
- E. 肝阳上亢头痛

【正确答案】 B

【答案解析】 内伤头痛

主症头痛反复发作，时轻时重，常伴头晕，遇劳或情志刺激而发作、加重。头空痛、昏痛，兼神疲无力，面色不华，舌淡苔白，脉细弱者为血虚头痛。

90. 某男，25岁。3日来头痛如裹，痛无休止，一肢体困重，苔白腻，脉濡。针灸治疗除百会、太阳、风池、合谷外，宜取

- A. 风门
- B. 曲池
- C. 丰隆
- D. 阴陵泉
- E. 足临泣

【正确答案】 D

【答案解析】 根据题干症状诊断为：头痛之风湿头痛。针灸治疗宜配头维、阴陵泉。

91. 某男，30岁，体质素弱，近半年来，呕吐时作时止，食欲不佳，倦怠乏力，舌苔薄白，脉弱。治疗应选用

- A. 内关、足三里、中脘、丰隆、阴陵泉
- B. 内关、足三里、中脘、合谷、内庭
- C. 内关、足三里、中脘、梁门、天枢

D. 内关、足三里、中脘、太冲、阳陵泉

E. 内关、足三里、中脘、脾俞、胃俞

【正确答案】 E

【答案解析】 根据题干症状辨证为脾胃虚寒之呕吐。

呕吐的处方

主穴中脘足三里内关

配穴寒邪客胃配上脘、胃俞；热邪内蕴配合谷、金津、玉液；饮食停滞配梁门、天枢；肝气犯胃配期门、太冲；痰饮内停配丰隆、公孙；脾胃虚寒配脾俞、胃俞。

92. 治疗胃脘疼痛，或隐痛或胀痛或刺痛，针灸取穴是

A. 胃俞、脾俞、太冲

B. 期门、阳陵泉、中脘

C. 三阴交、膈俞、中脘

D. 合谷、太冲、中脘

E. 足三里、内关、中脘

【正确答案】 E

【答案解析】 胃痛的处方：

主穴：中脘足三里内关。

93. 某女，36岁，经血淋漓不净30天，血色淡，质稀薄，伴面色萎黄，神疲肢倦，舌淡，苔白，脉沉细无力。除气海、三阴交、足三里、肾俞外，应加取

A. 肾俞、命门

B. 然谷、太溪

C. 百会、脾俞

D. 隐白、血海

E. 隐白、地机

【正确答案】 C

【答案解析】 崩漏虚证的针灸治疗：

主穴：气海三阴交肾俞足三里。

配穴：脾虚配百会、脾俞；肾虚配肾俞、太溪。

94. 治疗月经周期提前10天左右，月经量多，色淡质稀，神疲肢倦，纳少便溏，舌淡，脉细，针灸治疗在关元、三阴交基础上，应加取

A. 足三里、脾俞

B. 血海、太冲

C. 肝俞、肾俞

D. 归来、子宫

E. 归来、命门

【正确答案】 A

【答案解析】 根据题干症状诊断为：月经先期。

月经先期针灸治疗：

主穴：关元三阴交血海。

配穴：实热配行间；虚热配太溪；气虚配足三里、脾俞。月经过多配隐白。

95. 治疗暴病耳聋，鸣声隆隆，伴畏寒，发热，脉浮，宜在翳风、听会、侠溪、中渚基础上，加取

A. 太冲、丘墟

B. 外关、合谷

- C. 风门、肺俞
- D. 丰隆、脾俞
- E. 足三里、三阴交

【正确答案】 B

【答案解析】 根据题干症状诊断为耳聋外感风邪证，针灸治疗配外关、合谷。

96. 治疗心前区刺痛，心痛彻背，心慌汗出，遇寒诱发，面色晦暗，唇甲青紫，舌质紫暗，脉涩，针灸取穴是

- A. 内关、阴郄、郄门、膻中、神阙、至阳
- B. 内关、阴郄、郄门、膻中、血海、太冲
- C. 内关、阴郄、郄门、膻中、中脘、丰隆
- D. 内关、阴郄、郄门、膻中、心俞、厥阴俞
- E. 内关、阴郄、郄门、膻中、心俞、脾俞

【正确答案】 A

【答案解析】 根据题干症状诊断为：心绞痛。

心绞痛的针灸治疗：

主穴：内关郄门阴郄膻中

配穴：气滞血瘀配太冲、血海；寒邪凝滞配神阙、至阳；痰浊阻络配中脘、丰隆；阳气虚衰配心俞、至阳。

遇寒诱发，唇甲青紫，心痛如刺，心痛彻背，舌质紫暗，脉涩者为寒邪凝滞；七情诱发，胸闷及心区压榨性疼痛，烦躁不宁，脉弦紧者为气滞血瘀。心绞痛气滞血瘀症状比较特殊，脉为弦紧。注意和寒邪凝滞区分。

97. 治疗睡中遗尿，精神疲乏，肢冷畏寒，舌淡，脉沉细，除相应的背俞穴外，应选取的经脉是

- A. 足太阳、足少阴
- B. 足太阳、手太阴
- C. 足太阳、手少阴
- D. 任脉、足太阴
- E. 任脉、足太阳

【正确答案】 D

【答案解析】 遗尿的治法：

调理膀胱，温肾健脾。取任脉、足太阴经穴及膀胱的背俞穴、募穴为主。

98. 某女，53岁，右上齿痛半年，隐隐作痛，时作时止，脉沉。针灸治疗在合谷、颊车、下关的基础上，应加取

- A. 外关、风池
- B. 内庭、二间
- C. 太溪、行间
- D. 风池、侠溪
- E. 风池、太冲

【正确答案】 C

【答案解析】 根据题干症状诊断为牙痛之虚火牙痛。

牙痛的针灸处方：

主穴：合谷颊车下关

配穴：风火牙痛配外关、风池；胃火牙痛配内庭、二间；虚火牙痛配太溪、行间。

三、A3/A4

初孕妇,既往体健,孕37周突发头痛,呕吐,入院查:神志清,瞳孔等大,对光反应好,血压150/110mmHg,浮肿(++),蛋白尿(++)。近日倦怠无力,气短,食欲不振,下肢逆冷,腰酸膝软,小便短少;舌淡胖边有齿痕,苔白滑,脉沉滑无力。

99. 首先考虑的诊断是

- A. 妊娠期高血压
- B. 子痫前期
- C. 子痫
- D. 慢性高血压并发子痫前期
- E. 妊娠合并慢性高血压

【正确答案】 B

【答案解析】 子痫前期: ①轻度: 妊娠20周后出现BP \geq 140/90mmHg; 尿蛋白 \geq 0.3g/24h或随机尿蛋白(+); 可伴上腹不适、头痛等症状。②重度: BP \geq 160/110mmHg; 尿蛋白 \geq 5.0g/24h或随机尿蛋白(+++); 血肌酐 $>$ 106 μ mol/L; 血小板 $<$ 100 \times 10⁹/L; 微血管病性溶血(血LDH升高); 血清ALT或AST升高; 持续性头痛或其他脑神经或视觉障碍; 持续性上腹部疼痛。故本题正确答案选B。

100. 该患者中医辨证为

- A. 脾虚肝旺
- B. 痰火上扰
- C. 气滞湿阻
- D. 脾肾两虚
- E. 肝风内动

【正确答案】 D

【答案解析】 脾肾两虚证: 证候: 妊娠中晚期, 面目及下肢浮肿, 甚或遍及全身, 肤色淡黄或白, 皮薄而光亮, 按之凹陷, 即时难起, 倦怠无力, 气短懒言, 食欲不振, 下肢逆冷, 腰酸膝软, 小便短少, 或大便溏薄; 舌淡胖边有齿痕, 苔白滑或薄腻, 脉沉滑无力。故本题正确答案选D。

101. 对应的方药首选

- A. 天仙藤散
- B. 白术散合五苓散
- C. 羚角钩藤汤
- D. 牛黄清心丸
- E. 半夏白术天麻汤

【正确答案】 B

【答案解析】 脾肾两虚证: 健脾温肾, 行水消肿。方药: 白术散合五苓散。故本题正确答案选B。

女, 32岁, 孕40周, 妊娠合并子宫肌瘤, 阴道分娩, 胎盘娩出后阴道出血量多, 暗红色, 检查: 宫底高, 子宫软, 产道无裂伤, 血自宫腔流出, 有血块, 胎盘完整, 血压100/90mmHg。舌有瘀点瘀斑, 脉沉涩。

102. 该患者产后出血最可能原因为

- A. 子宫收缩乏力
- B. 凝血功能障碍
- C. 胎盘残留
- D. 产道裂伤
- E. 胎盘粘连

【正确答案】A

【答案解析】产后出血常见病因有子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤和凝血功能障碍，以子宫收缩乏力最为常见，根据题干可除外其他选项，故答案选A。

103. 以下哪项治疗不适用于该患者

- A. 按摩子宫
- B. 应用宫缩剂
- C. 宫腔纱条填塞法压迫止血
- D. 结扎盆腔血管
- E. 钳刮术或刮宫术

【正确答案】E

【答案解析】如有胎盘滞留时应立即取出或徒手剥离胎盘后取出。胎盘和胎膜残留可行钳刮术或刮宫术。故E项不适用于该患者的治疗。

104. 该证型首选的方药为

- A. 升举大补汤
- B. 保阴煎
- C. 化瘀止崩汤
- D. 生化汤合失笑散
- E. 逐瘀止血汤

【正确答案】C

【答案解析】产后出血血瘀证证候：新产后，突然阴道大量下血，色黯红，夹有血块，小腹疼痛拒按，血块下后腹痛减轻；舌紫黯，或有瘀点瘀斑，脉沉涩。治法：活血化瘀，理血归经。方药：化瘀止崩汤。故答案选C。

女，32岁，子宫下段剖宫产术后6年，近6年痛经，已逐渐加剧。妇科检查：子宫后位，活动欠佳，正常大小，后穹窿可触及多个质硬小结节，触痛明显。

105. 诊断首先考虑

- A. 慢性盆腔炎
- B. 卵巢癌
- C. 盆腔结核
- D. 子宫内膜异位症
- E. 子宫腺肌病

【正确答案】D

【答案解析】根据患者进行性痛经及查体触及多个硬质小结节，可初步诊断为子宫内膜异位症，故答案选D。

106. 下列哪项是诊断该疾病的最直接依据

- A. 进行性痛经
- B. CA125测定值升高
- C. 超声检查
- D. 腹腔镜检查并做组织活检
- E. 子宫后方触及痛性结节

【正确答案】D

【答案解析】腹腔镜检查：是目前诊断内膜异位症的最佳方法，在腹腔镜下活检即可确诊，并确定临床分期，故答案选D。

107. 治疗子宫内膜异位症，需切除子宫保留卵巢功能的手术适用于

- A. 年龄在45岁以下，无生育要求者

- B. 年龄在 30 岁以下, 要求生育者
- C. 年轻患者病变严重者
- D. 年轻尚未生育的妇女
- E. 近绝经的症状较重的患者

【正确答案】 A

【答案解析】保留卵巢功能手术: 切除盆腔内病灶及子宫, 保留至少一侧或部分卵巢, 又称半根治手术。适用于Ⅲ、Ⅳ期、症状明显且无生育要求的 45 岁以下患者。故答案选 A。

一足月儿, 母乳喂养, 生后 3 天因黄疸住院, 血清总胆红素 $289\mu\text{mol/L}$ (16.9mg/dl), 母血型为 O 型、Rh 阳性, 父亲血型为 AB 型、Rh 阳性。

108. 该患儿最可能的诊断为

- A. 新生儿肝炎
- B. 新生儿败血症
- C. ABO 溶血
- D. 胆管阻塞
- E. 母乳性黄疸

【正确答案】 C

【答案解析】足月儿血清总胆红素超过 $221\mu\text{mol/L}$ (12.9mg/dl), 为病理性黄疸, 且 ABO 溶血主要发生在母亲 O 型而胎儿 A 型或 B 型, 可以发生在第一胎, ABO 溶血除引起黄疸外, 其他改变不明显。故最可能的诊断为 ABO 溶血, 故答案选 C。

109. 首先应采取的治疗措施是

- A. 光疗
- B. 抗生素应用
- C. 换血
- D. 输注白蛋白
- E. 口服鲁米那

【正确答案】 A

【答案解析】光照疗法: 简称光疗, 是降低血清未结合胆红素简单而有效的方法。故首选光疗, 答案选 A。

110. 首选用于治疗由湿热熏蒸导致的新生儿黄疸的是

- A. 茵陈理中汤加味
- B. 血府逐瘀汤加味
- C. 龙胆泻肝汤加味
- D. 小柴胡汤加味
- E. 茵陈蒿汤加味

【正确答案】 E

【答案解析】湿热熏蒸

证候: 面目皮肤发黄, 颜色鲜明, 精神疲倦或烦躁啼哭, 不欲吮乳, 小便短黄, 舌质红, 舌苔黄腻。重者腹胀, 呕吐, 甚或神昏、抽搐。治法: 清热利湿退黄。方药: 茵陈蒿汤加味。故答案选 E。

患儿, 男, 5 岁, 一周前流涕, 继之高热、头痛剧烈、恶心呕吐、嗜睡, 情绪异常。口唇有疱疹。查: 脑膜刺激征阳性, 白细胞正常, 实验室检查脑脊液基本正常。喉中痰鸣, 唇干渴饮, 舌质红绛, 舌苔黄腻, 脉滑数。

111. 首先应考虑

- A. 结核性脑膜炎

- B. 化脓性脑膜炎
- C. 病毒性脑膜炎
- D. 脑脓肿
- E. 脑栓塞

【正确答案】C

【答案解析】病毒性脑膜炎：前驱症状可有发热，头痛，上呼吸道感染症状，精神萎靡，恶心呕吐，腹痛，肌痛。神经系统症状体征主要为发热，颅内压增高，不同程度的意识障碍及反复惊厥发作等症状。故答案选C。

112. 治疗首选

- A. 更昔洛韦
- B. 病毒唑
- C. 干扰素
- D. 免疫球蛋白
- E. 阿昔洛韦

【正确答案】E

【答案解析】因感染病毒不同，临床伴有症状各有特点，如肠道病毒性脑炎，可出现皮疹；单纯疱疹病毒性脑炎常有口唇或角膜疱疹；腮腺炎病毒性脑炎常有腮腺肿大。对于单纯性疱疹病毒可给予阿昔洛韦治疗，每次10mg/kg于1小时内静脉滴注，每8小时用1次，疗程1~2周。故答案选E。

113. 中医治疗应选用

- A. 清瘟败毒饮加减
- B. 涤痰汤加减
- C. 指迷茯苓丸合桃红四物汤加减
- D. 柴葛解肌汤加减
- E. 银翘散加减

【正确答案】A

【答案解析】病毒性脑炎痰热壅盛

证候：高热不退，头痛剧烈，恶心呕吐，神识不清，或谵语妄动，喉中痰鸣，唇干渴饮，颈项强直，烦躁不安，四肢抽搐，舌质红绛，舌苔黄腻，脉数或滑数。治法：泻火涤痰。方药：清瘟败毒饮加减。故答案选A。

患儿4岁，发热3天伴流涕、咳嗽、流泪就诊。查：T40℃，球结膜充血，心肺检查阴性，口腔两颊黏膜近臼齿处可见少许灰白色斑点，周围红晕。

114. 该患儿应考虑为何病

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 幼儿急疹
- D. 猩红热
- E. 水痘

【正确答案】A

【答案解析】患儿是发热三天后出疹，口腔两颊黏膜近臼齿处可见麻疹黏膜斑，考虑是麻疹，故选A。

115. 以下哪项为该病最常见的并发症

- A. 喉炎
- B. 肺炎

- C. 脑炎
- D. 风心病
- E. 心肌炎

【正确答案】 B

【答案解析】 麻疹常见并发症有喉炎、肺炎、心肌炎、脑炎，其中肺炎为麻疹最常见的并发症，多见于5岁以下小儿。可发生在麻疹的各个时期，是麻疹死亡的主要原因之一。主要为继发细菌或其他病毒感染。故答案选B。

116. 若患儿疹点出齐后，发热渐退，咳嗽渐减，精神好转，首选中医治疗为

- A. 宣毒发表汤加减
- B. 清解透表汤加减
- C. 沙参麦冬汤加减
- D. 麻杏石甘汤加减
- E. 清咽下痰汤加减

【正确答案】 C

【答案解析】 麻疹阴津耗伤（收没期）

证候：疹点出齐后，发热渐退，咳嗽渐减，胃纳增加，精神好转，疹点依次渐回，皮肤呈糠麸状脱屑，留有色素沉着，舌红少津，苔薄，脉细数。治法：养阴生津，清解余邪。方药：沙参麦冬汤加减。故答案选C。

四、B

- A. 宫颈管柱状上皮
- B. 复层鳞状上皮
- C. 柱状上皮
- D. 柱状上皮与鳞状上皮交界处
- E. 鳞状上皮

117. 宫颈阴道部为何种组织覆盖

【正确答案】 E

【答案解析】 宫颈阴道部为鳞状上皮覆盖。

118. 宫颈癌好发部位是

【正确答案】 D

【答案解析】 柱状上皮与鳞状上皮交界处是宫颈癌好发部位。

- A. 2~3日
- B. 3~4日
- C. 10日左右
- D. 3周
- E. 4~6周

119. 产后血性恶露持续时间为

【正确答案】 B

【答案解析】 血性恶露：持续3~4日。

120. 产后浆液恶露持续时间为

【正确答案】 C

【答案解析】 浆液恶露：持续10日左右。

- A. 血热
- B. 气滞
- C. 痰湿

D. 肝郁

E. 血瘀

121. 月经周期提前多为

【正确答案】 A

【答案解析】 周期提前，多为血热或气虚。

122. 月经周期先后无定期多为

【正确答案】 D

【答案解析】 周期先后无定期，多为肝郁或肾虚。

A. 脾肾两虚证

B. 气滞湿阻证

C. 阴虚肝旺证

D. 脾虚肝旺证

E. 肝风内动证

123. 用杞菊地黄丸治疗的子痫证型为

【正确答案】 C

【答案解析】 子痫阴虚肝旺证。

证候：妊娠中晚期，头晕目眩，头痛耳鸣，视物模糊，颜面潮红，心烦失眠，口干咽燥，舌红或绛，少苔，脉弦细滑数。

治法：滋阴养血，平肝潜阳。

方药：杞菊地黄丸加天麻、钩藤、石决明。

124. 用半夏白术天麻汤治疗的子痫证型为

【正确答案】 D

【答案解析】 子痫脾虚肝旺证。

证候：妊娠中晚期，面浮肢肿逐渐加重，头昏头重如眩冒状，胸闷心烦，呕逆泛恶，神疲肢软，纳少嗜卧；舌淡胖有齿痕，苔腻，脉弦滑而缓。

治法：健脾利湿，平肝潜阳。

方药：半夏白术天麻汤。

A. 潜伏期延长

B. 活跃期延长

C. 活跃期停滞

D. 第二产程延长

E. 第二产程停滞

125. 宫口开大到 5cm 后，近 2 小时宫口扩张速度 $< 0.5\text{cm/h}$ 者为

【正确答案】 B

【答案解析】 从活跃期起点（4~6cm）至宫颈口开全称为活跃期。活跃期宫颈口扩张速度 $< 0.5\text{cm/h}$ 称为活跃期延长。

126. 初产妇宫口开全 3.5 小时，胎儿尚未娩出者称

【正确答案】 D

【答案解析】 初产妇 > 3 小时，经产妇 > 2 小时（硬膜外麻醉镇痛分娩时，初产妇 > 4 小时，经产妇 > 3 小时），产程无进展（胎头下降和旋转），称为第二产程延长。

A. 右归丸

B. 黑逍遥散

C. 龙胆泻肝汤

D. 人参养荣汤

E. 归肾丸合二至丸

127. 治疗外阴慢性单纯性苔藓肝郁气滞证首选

【正确答案】 B

【答案解析】 外阴慢性单纯性苔藓之肝郁气滞证。

证候: 外阴瘙痒、干燥、灼热疼痛, 局部皮肤粗糙、增厚或皲裂、脱屑、溃疡, 或色素减退, 性情抑郁, 经前乳房胀痛, 胸闷暖气, 两胁胀痛; 舌质黯, 苔薄, 脉细弦。

治法: 疏肝解郁, 养血通络。

方药: 黑逍遥散去生姜, 加川芎。

128. 治疗外阴慢性单纯性苔藓湿热下注证首选

【正确答案】 C

【答案解析】 外阴慢性单纯性苔藓之湿热下注证。

证候: 外阴奇痒, 灼热疼痛, 带下量多, 色黄气秽, 局部皮肤黏膜粗糙肥厚或破损溃疡, 渗流黄水, 胸闷烦躁, 口苦口干, 溲赤便秘; 舌红, 苔黄腻, 脉弦数。

治法: 清热利湿, 通络止痒。

方药: 龙胆泻肝汤去木通。

A. 4个月

B. 5个月

C. 6个月

D. 8个月

E. 10个月

129. 婴儿开始会爬的正常月龄一般是

【正确答案】 D

【答案解析】 一般小儿3个月抬头较稳, 4个月翻身, 6个月时能独坐, 8~9个月可用双上肢向前爬, 1岁能走, 2岁会跳, 3岁才能快跑。

130. 婴儿开始会独坐的正常月龄一般是

【正确答案】 C

【答案解析】 一般小儿3个月抬头较稳, 4个月翻身, 6个月时能独坐, 8~9个月可用双上肢向前爬, 1岁能走, 2岁会跳, 3岁才能快跑。

A. 人参五味子汤

B. 沙参麦冬汤

C. 小青龙汤

D. 麻杏石甘汤

E. 大青龙汤

131. 小儿肺炎肺脾气虚证的首选方剂是

【正确答案】 A

【答案解析】 肺炎之肺脾气虚证。

证候: 低热起伏不定, 面白少华, 动则汗出, 咳嗽无力, 纳差便溏, 神疲乏力, 舌质偏淡, 舌苔薄白, 脉细无力。

治法: 补肺健脾, 益气化痰。

方药: 人参五味子汤加减。

132. 小儿肺炎阴虚肺热证的首选方剂是

【正确答案】 B

【答案解析】 肺炎之阴虚肺热证。

证候: 病程较长, 低热盗汗, 干咳无痰, 面色潮红, 舌红少津, 舌苔花剥、苔少或无苔, 脉

细数。

治法: 养阴清肺, 润肺止咳。

方药: 沙参麦冬汤加减。

- A. 大量蛋白尿, 低蛋白血症, 水肿, 高脂血症
- B. 血尿, 水肿, 高血压, 程度不等的肾功能损害
- C. 血尿, 低白蛋白血症
- D. 高血压, 大量蛋白尿
- E. 高血压, 低白蛋白血症

133. 肾病综合征的临床特征是

【正确答案】 A

【答案解析】 肾病综合征是一组由多种原因引起的肾小球滤过膜通透性增高, 导致大量血浆蛋白自尿中丢失的临床综合征, 具有以下四大特点: 大量蛋白尿, 低蛋白血症, 高胆固醇血症(高脂血症)和不同程度的水肿。

134. 急性肾炎的临床特征是

【正确答案】 B

【答案解析】 急性肾小球肾炎典型表现: 起病时可有低热、疲倦乏力、食欲不振等, 肾炎症状主要表现为水肿、血尿和高血压。

(1) 浮肿、少尿浮肿为早期最常见的症状, 自颜面眼睑开始, 1~2日渐及全身, 呈非凹陷性。少数亦可有胸水、腹水。可伴尿量减少, 多在一周后随尿量增多而水肿消退。

(2) 血尿几乎所有病例都有镜下血尿, 约30%~50%的病例有肉眼血尿。中性或碱性尿呈鲜红色或洗肉水样, 酸性尿呈浓茶样。肉眼血尿通常在1~2周转为镜下血尿。镜下血尿一般持续1~3个月, 少数病例可延续半年或更久。

(3) 高血压病程早期约30%~70%的患儿有高血压。在1~2周后随尿量增多血压可逐渐下降, 少数可迁延1~2个月。

- A. 温补脾肾, 益精养血
- B. 健运脾胃, 益气养血
- C. 补脾养心, 益气生血
- D. 滋养肝肾, 益精生血
- E. 滋水涵木, 益气生血

135. 营养性缺铁性贫血脾肾阳虚证治法宜选用

【正确答案】 A

【答案解析】 营养性缺铁性贫血之脾肾阳虚证。

证候: 面白虚浮, 唇舌爪甲苍白, 精神萎靡不振, 发育迟缓, 凶门迟闭, 方颅, 鸡胸, 毛发稀疏, 畏寒肢冷, 纳谷不馨, 或有大便溏泄, 舌淡苔白, 脉沉细无力, 指纹淡。

治法: 温补脾肾, 益精养血。

方药: 右归丸加减。

136. 营养性缺铁性贫血心脾两虚证治法宜选用

【正确答案】 C

【答案解析】 营养性缺铁性贫血心脾两虚证。

证候: 面色萎黄或苍白, 唇甲淡白, 发黄枯燥, 容易脱落, 心悸气短, 头晕目眩, 夜寐欠安, 语声低弱, 精神萎靡, 注意力不集中, 食欲不振, 舌淡红, 苔薄白, 脉细弱, 指纹淡红。

治法: 补脾养心, 益气生血。

方药: 归脾汤加减。

- A. 疏风清热, 清肺利咽

- B. 清热泻火，解毒利咽
- C. 清热解毒，利湿化痰
- D. 益气养阴，兼清余热
- E. 清热凉营，解毒祛湿

137. 传染性单核细胞增多症之邪郁肺卫证，治法宜选用

【正确答案】 A

【答案解析】 传染性单核细胞增多症之邪郁肺卫证

证候：发热，微恶风寒，微有汗，咳嗽鼻塞，流涕，头身痛，咽红疼痛，颈部淋巴结肿大，舌边或舌尖稍红，苔薄黄或薄白而干，脉浮数。

治法：疏风清热，清肺利咽。

方药：银翘散加减。

138. 传染性单核细胞增多症之热毒炽盛证，治法宜选用

【正确答案】 B

【答案解析】 传染性单核细胞增多症之热毒炽盛证

证候：壮热烦渴，咽喉红肿疼痛，乳蛾肿大，甚则溃烂，口疮口臭，面红唇赤，皮疹显露，颈、腋、腹股沟处浅表淋巴结肿大，肋下痞块，便秘尿赤，舌质红，苔黄腻，脉洪数。

治法：清热泻火，解毒利咽。

方药：普济消毒饮加减。

- A. 清热解毒、通腑开窍
- B. 益气养阴、救逆固脱
- C. 益气回阳、救逆固脱
- D. 清热解毒、活血化瘀
- E. 益气养阴、通腑开窍

139. 脓毒性休克热毒内闭证的治则是

【正确答案】 A

【答案解析】 脓毒性休克热毒内闭证治法：清热解毒，通腑开窍。

140. 脓毒性休克气阴亏竭证的治则是

【答案】 B

【答案解析】 脓毒性休克气阴亏竭证治法：益气养阴，救逆固脱。

- A. 任脉
- B. 冲脉
- C. 带脉
- D. 阴脉
- E. 阴维脉

141. 具有维系六阴经作用的是

【正确答案】 E

【答案解析】 阳维脉主一身之表，阴维脉主一身之里，阴阳维脉具有维系一身阴经和阳经的作用。

142. 具有调节全身阴经经气作用的是

【正确答案】 A

【答案解析】 任脉妊养诸阴经，总调全身阴气和精血，为“阴脉之海”。

- A. 丘墟
- B. 绝骨
- C. 血海

D. 膈俞

E. 阳陵泉

143. 八会穴中的髓会是

【正确答案】 B

【答案解析】 髓会为绝骨（也称悬钟）。

144. 八会穴中的血会是

【正确答案】 D

【答案解析】 血会为膈俞。

A. 第 5 掌骨基底与三角骨之间的凹陷处赤白肉际

B. 微握拳，第 5 掌指关节尺侧近端赤白肉际凹陷中。

C. 腕背横纹尺侧缘，当尺骨茎突与三角骨之间的凹陷处

D. 以手掌面向胸，当尺骨茎突桡侧骨缝凹陷中

E. 掌心向胸，阳谷穴与小海穴的连线上，腕背横纹上 5 寸

145. 后溪穴的定位是

【正确答案】 B

【答案解析】 后溪穴位于：第 5 掌指关节后尺侧的远侧掌横纹头赤白肉际处。

146. 养老穴的定位是

【正确答案】 D

【答案解析】 养老穴位于：尺骨茎突桡侧骨缝凹陷中。

A. 内踝前下方凹陷中，当舟骨结节与内踝尖连线的中点处

B. 外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中

C. 外踝高点上 3 寸，腓骨前缘

D. 外踝高点上 4 寸，腓骨前缘

E. 外踝高点上 5 寸，腓骨前缘

147. 丘墟穴的定位是

【正确答案】 B

【答案解析】 丘墟

【定位】 在踝区，外踝的前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中。

148. 悬钟穴的定位是

【正确答案】 C

【答案解析】 悬钟

【定位】 在小腿外侧，外踝尖上 3 寸，腓骨前缘。

A. 瘰疬、初起的肿疡

B. 风寒痹痛、呕吐

C. 吐泻并作、中风脱证

D. 因寒而致的呕吐、腹痛

E. 疮疡久溃不敛

149. 隔盐灸的适应病证是

【正确答案】 C

【答案解析】 隔盐灸有回阳、救逆、固脱的作用，多用于治疗伤寒阴证或吐泻并作、中风脱证等。

150. 隔附子饼灸的适应病证是

【正确答案】 E

【答案解析】 隔附子饼灸有温补肾阳等作用。多用于治疗命门火衰而致的阳痿、早泄或疮疡

久溃不敛等病证。

