

全科主治医师《相关专业知识》模考试卷

一、A1

1. 腹股沟直疝环的底边为

- A. 腹股沟韧带
- B. 腹壁下动脉
- C. 腹直肌外侧缘
- D. 耻骨梳韧带
- E. 陷窝韧带

2. 严重吸气性呼吸困难最主要的特点是

- A. 呼吸不规则
- B. 发绀明显
- C. 呼吸深而慢
- D. 出现三凹征
- E. 广泛哮鸣音

3. 休克缺血性缺氧期微循环灌流的特点是

- A. 多灌少流，灌多于流
- B. 少灌多流，灌少于流
- C. 多灌多流，灌多于流
- D. 少灌少流，灌少于流
- E. 少灌少流、灌多于流

4. 前列腺增生时出现尿潴留，膀胱膨胀，尿液自尿道口溢出，称为

- A. 急迫性尿失禁
- B. 神经性尿失禁
- C. 充溢性尿失禁
- D. 痉挛性尿失禁
- E. 无阻力性尿失禁



5. 下列毒物经肝脏代谢后毒性增强的是

- A. 磷化锌
- B. 氰化物
- C. 阿司匹林
- D. 对硫磷
- E. 亚硝酸盐

6. 血性溢液最常见于

- A. 乳腺结核
- B. 急性乳腺炎
- C. 乳腺囊性增生病
- D. 正常月经期
- E. 乳管内乳头状瘤

7. 急性胰腺炎解痉镇痛不宜使用的药品是

- A. 吗啡
- B. 异丙嗪
- C. 哌替啶
- D. 阿托品
- E. 普鲁卡因

8. 非器质性心脏病患者一般不会出现

- A. 窦性心动过速
- B. 室性期前收缩二联律
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 一度房室传导阻滞
- E. 阵发性心房颤动

9. 某急诊创伤患者同时出现以下病情，应首先抢救的是

- A. 窒息
- B. 昏迷
- C. 骨折
- D. 心律失常
- E. 伤口出血

10. 视网膜深层出血呈圆点状，色暗红，位于

- A. 神经纤维层
- B. 内核层
- C. 外丛状层
- D. 外核层
- E. 外丛状层和内核层之间

11. 老年抑郁症与老年性痴呆的主要鉴别点是

- A. 痴呆
- B. 自杀倾向
- C. 失眠
- D. 躯体无名疼痛和不适
- E. 口干、出汗等自主神经功能紊乱

12. 结核病最主要的传染源是

- A. 浸润性肺结核患者
- B. 原发性结核病患者
- C. 结核性胸膜炎患者
- D. 急性血型播散型肺结核患者
- E. 慢性纤维空洞型肺结核患者

13. 确定胎儿安危最简便而较准确的方法是

- A. 缩宫素激惹试验
- B. 胎动计数
- C. 尿雌三醇测定
- D. 电子监护胎儿
- E. 羊膜镜检查

14. 循证医学的证据中质量最高的是

- A. 专家意见
- B. 多个质量可靠的大样本随机对照试验所做的系统评价或 Meta 分析
- C. 单个样本量足够的随机对照试验结果
- D. 设有对照组但未用随机方法分组的研究
- E. 无对照的系列病例观察

15. 下列疾病可引起先昏迷后发热的是

- A. 败血症
- B. 脑出血
- C. 流行性出血热
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 流行性脑脊髓膜炎

16. 青春期无排卵型功能失调性子宫出血的原因是

- A. 缺乏孕激素
- B. 缺乏雌激素
- C. 凝血功能异常
- D. 子宫内膜增生过度
- E. 子宫内膜发育不良

17. 老年抑郁症是老年人常见的精神问题，主要临床表现是

- A. 感知觉减退

- B. 情绪抑郁、思维障碍
- C. 痴呆
- D. 认知能力减低、失活
- E. 肢体活动不灵活

18. 下列哪一项属于卵巢良性肿瘤

- A. 内胚窦瘤
- B. 库肯勃瘤
- C. 颗粒细胞瘤
- D. 卵泡膜细胞瘤
- E. 无性细胞瘤

19. 咽壁非感染性咽痛的病因不包括

- A. 咽壁异物
- B. 恶性肿瘤
- C. 扁桃体炎
- D. 茎突过长
- E. 舌咽神经痛

20. “星烁征”也叫“灯塔征”，可见于

- A. 耳硬化症
- B. 慢性化脓性中耳炎
- C. 大疱性鼓膜炎
- D. 急性化脓性中耳炎
- E. 以上均是

21. 从病因角度看，龋病也可称为牙齿硬组织的

- A. 物理损伤性疾病
- B. 酸蚀破坏性疾病

- C. 细菌感染性疾病
- D. 免疫性疾病
- E. 化学溶解性疾病

22. 黄疸按发病机制分类，不包括

- A. 隐性黄疸
- B. 溶血性黄疸
- C. 肝细胞性黄疸
- D. 梗阻性黄疸
- E. 先天性非溶血性黄疸

23. 以下哪一项不属于凹陷性全身性水肿

- A. 肾性水肿
- B. 系统性红斑狼疮性水肿
- C. 肝源性水肿
- D. 妊娠水肿
- E. 心源性水肿

24. 女性，28岁，阴道分泌物增加，白带呈豆腐渣样，伴有外阴瘙痒。应考虑的诊断是

- A. 阴道毛滴虫病
- B. 淋菌性宫颈炎
- C. 衣原体性宫颈炎
- D. 细菌性阴道病
- E. 假丝酵母菌病

25. 下列哪项是躁狂发作患者睡眠障碍的特点

- A. 多梦
- B. 早醒

- C. 易惊醒
- D. 入睡困难
- E. 睡眠需要减少

26. 艾滋病急性期通常发生在初次感染 HIV 后 2~4 周，其临床表现不包括

- A. 恶心
- B. 咽痛
- C. 淋巴结肿大
- D. 发热
- E. 口腔真菌感染

27. 系统性红斑狼疮患者的典型皮肤损害是

- A. 多形性红斑
- B. 结节性红斑
- C. 网状青斑
- D. 面部蝶形红斑
- E. 环形红斑

28. 糖尿病患者失明的主要原因是

- A. 视网膜剥离
- B. 视网膜出血
- C. 青光眼
- D. 白内障
- E. 视网膜新生血管产生

29. 溶血最可靠的诊断指标是

- A. 骨髓幼红细胞显著增生
- B. 网织红细胞比例升高
- C. 外周血中出现少量幼红细胞

D. 红细胞寿命缩短

E. 血清结合珠蛋白减少

30. 支原体肺炎首选的抗菌药物是

A. 磺胺类

B. 链霉素

C. 青霉素

D. 红霉素

E. 庆大霉素

31. 下列关于卵巢巧克力囊肿说法错误的是

A. 较易发生卵巢囊肿蒂扭转

B. 囊肿直径一般为 5~6cm 以下

C. 囊肿常导致盆腔粘连

D. 囊肿内含暗褐色黏糊状陈旧血

E. 囊肿增大时，整个卵巢表面呈灰蓝色

32. 子宫内膜异位症大多数位于盆腔内，最常侵犯的部位是

A. 子宫骶骨韧带

B. 输卵管

C. 子宫直肠陷凹

D. 子宫膀胱陷凹

E. 卵巢

33. 内异症最常发生的部位是

A. 宫颈

B. 卵巢

C. 直肠子宫陷凹

D. 宫骶韧带

E. 膀胱子宫陷凹

34. 下列关于输卵管内异症说法正确的是

- A. 很常见
- B. 常造成盆腔粘连
- C. 一般为直接累及
- D. 输卵管内异症不影响其蠕动
- E. 多由于卵巢异位病变蔓延而来

35. 子宫内膜异位症患者最多见于

- A. 幼儿
- B. 生育期
- C. 青春期
- D. 围绝经期
- E. 老年人

36. 关于盆腔子宫内膜异位症，下列正确的描述是哪项

- A. 子宫内膜异位症的发病为异位内膜随卵巢激素变化而发生的周期性出血
- B. 子宫内膜异位症具有远处转移和种植能力，故为癌前病变
- C. 卵巢子宫内膜异位症较少见
- D. 卵巢巧克力囊肿最大不超过 8cm
- E. 卵巢子宫内膜异位囊肿，最恰当是治疗是手术切除

37. 下列关于子宫内膜异位症的说法错误的是

- A. 可形成卵巢巧克力囊肿
- B. 80%患者累及双侧卵巢
- C. 卵巢多固定在子宫的侧后方不活动
- D. 手术分离过程中容易发生囊壁破裂
- E. 卵巢内的异位内膜可形成单个或多个囊肿

38. 子宫内膜异位症最常见的临床表现为
- A. 疼痛可放射至会阴部、肛门和大腿
 - B. 持续性下腹痛，经期加剧
 - C. 无痛经
 - D. 疼痛于月经来潮时出现，并持续至整个经期
 - E. 经量增多，经期延长或月经淋漓不尽或经前期点滴出血
39. 下列关于子宫内膜异位症的描述中，正确的是
- A. 多发生于初潮前
 - B. 生育少、生育晚的女性发病少于多次生育者
 - C. 发病与社会经济状况无关
 - D. 约 25%患者无明显不适
 - E. 该病对孕激素不敏感
40. 子宫内膜异位症最常见的发生部位是
- A. 盆腔腹膜
 - B. 阑尾
 - C. 卵巢子宫内膜异位症
 - D. 盆腔子宫内膜异位症
 - E. 输卵管及宫颈内膜异位症
41. 对于卵巢子宫内膜异位囊肿，最佳的诊断和治疗方法是
- A. 假绝经疗法
 - B. 腹腔镜
 - C. 假孕疗法
 - D. 囊肿穿刺
 - E. 开腹手术

42. 子宫内膜异位症最好的检查方法是

- A. 诊刮
- B. 血清 CA125 检查
- C. β -hCG
- D. 腹腔镜检查
- E. 影像学检查

43. 子宫内膜异位症的典型症状是

- A. 阴道不规则流血
- B. 接触性出血
- C. 阴道分泌物增多
- D. 继发性痛经
- E. 月经量增多

44. 盆腔炎药物治疗，病情改善后，也应巩固治疗

- A. 1~3 天
- B. 5~7 天
- C. 10~14 天
- D. 15~20 天
- E. 一个月到两个月

45. 盆腔炎手术治疗的指征不包括

- A. 体温不降
- B. 脓肿破裂
- C. 输卵管积脓
- D. 包块减小
- E. 症状加重

二、A2

46. 患儿，5个月，母乳喂养，最近大便次数增多。其他没有明显异常，就诊医院，作为接诊医生，首先进行的化验检查为

- A. 大便常规
- B. 大便细菌培养
- C. 血常规
- D. 尿常规
- E. 红细胞沉降率

47. 某患儿，因为急性腹泻，导致脱水，脱水性质（如高渗性、等渗性等）的判断依据是

- A. 血钠+血钾
- B. 血钠+血氯
- C. 血钠
- D. 血钾
- E. 血氯

48. 患儿，4岁。夏季出现发热，惊厥，意识障碍6小时，对诊断中毒性痢疾最有帮助的是

- A. 血常规
- B. 尿常规
- C. 血细菌培养
- D. 便常规及培养
- E. 脑脊液检查

49. 患儿，女性，1岁。因腹泻3天来诊。实验室检查：血钠128mmol/L，血钙1.2mmol/L。ECG：ST段压低，T波低平，出现U波。该患儿存在的电解质紊乱为

- A. 低钠
- B. 低钙

- C. 低钾
- D. 高钾
- E. 低磷

50. 患儿，男，9个月，体重10kg，间歇性哭闹20小时，有规律性腹痛，伴呕吐，排果酱样便2次。查体腹部可触及包块。最可能的诊断是

- A. 肠套叠
- B. 过敏性紫癜
- C. 肠道肿瘤
- D. 蛔虫性肠梗阻
- E. 细菌性痢疾

51. 8个月婴儿，突然出现剧烈腹痛，面色苍白，汗多，随之出现呕吐即来就诊，腹部B超提示，同心圆图像，考虑为肠套叠，患儿一般情况好。最合适的处理方法是

- A. 暂输液观察
- B. 钡灌肠复位
- C. 空气灌肠复位
- D. 急诊手术
- E. 不处理

52. 患儿，3岁，突然哭闹不安，面色苍白，随之出现随呕吐，内容物是食物残渣，急诊来院，急诊医生考虑是肠套叠，婴儿肠套叠的三大典型症状为

- A. 腹痛、肿物、哭闹
- B. 腹痛、面色苍白、哭闹
- C. 腹痛、呕吐、血便
- D. 腹痛、呕吐、肿物
- E. 腹痛、血便、肿物

53. 患者, 男, 10 个月。阵发性哭闹 12 小时, 呕吐 3 次, 无腹泻, 无发热。体检: 精神萎靡, 腹软略胀, 哭闹使得触诊不满意, 肠鸣音略亢进。腹部 B 超提示: 右中腹部可见同心圆样结构。应诊断为

- A. 阑尾包块
- B. 急性出血性肠炎
- C. 肠套叠
- D. 肠梗阻
- E. 急性肠扭转

54. 患儿, 男, 9 岁, 眼睑水肿 3 天, 伴茶色尿, 血压 16/12kPa, 2 周前有发热、咽痛。尿常规: 蛋白 (++) , 红细胞: 40~50/HP, 白细胞 8~10/HP。该患儿最可能的临床诊断是

- A. IgA 肾病
- B. 狼疮性肾炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 肾炎性肾病
- E. 急性肾炎

55. 男孩, 7 岁, 因尿少、水肿、肉眼血尿诊断为急性肾炎入院, 入院当天出现头痛、呕吐, 惊厥 1 次, 嗜睡, 眼眶周围见针刺状出血点, 此时最可能的并发症是

- A. 心力衰竭
- B. 败血症
- C. 癫痫
- D. 高血压脑病
- E. 急性肾衰竭

56. 患儿男, 10 岁, 少尿、水肿 5 天。病前 2 周有发热、咽痛史。尿蛋白 (++) , 红细胞 15~20 个/HP, 血 Cr $170 \mu\text{mol/L}$ 。肾活检最可能的改变是

- A. 膜增生性肾小球肾炎
- B. 毛细血管内增生性肾小球肾炎
- C. 微小病变肾病
- D. 局灶节段性肾小球硬化
- E. IgA 肾病

57. 患者，女，7岁，曾发热伴咽痛，2周后眼睑浮肿，尿色如“茶”，近3天浮肿加重，尿量亦减少。诊断为急性肾炎。本病中哪种肾小球细胞增生最显著

- A. 肾小球囊壁层上皮细胞
- B. 肾小球囊球上皮细胞
- C. 肾小球毛细血管内皮细胞
- D. 肾小球血管间质细胞
- E. 肾小球足细胞

58. 8岁男孩，3周前曾患脓疱疮，现头晕、食欲减退，晨起有眼睑水肿，血压正常，怀疑急性肾炎。为明确诊断首先的检查是

- A. 尿培养
- B. 肾活检
- C. 肾功能
- D. 肾脏B超
- E. 尿常规

59. 7个月男孩，确诊川崎病后，经治疗症状缓解出院，2个月后又无明显诱因猝死家中，其死因最可能是

- A. 冠状动脉瘤破裂
- B. 心包炎
- C. 脑栓塞
- D. 心肌炎
- E. 颅内出血

60. 患者男，20岁。上前牙咀嚼时出现不适感1个月余。曾有过外伤史。半年前牙体变色。口腔检查：左右上1牙体变色，无明显龋损及其他牙体硬组织病变。牙髓活力测试无反应。叩诊(+)。X线片示：根尖部有圆形的透射影像，边界清晰，直径<0.5cm。可能的诊断是

- A. 根尖周囊肿
- B. 根尖周肉芽肿
- C. 慢性根尖周脓肿
- D. 根尖周致密性骨炎
- E. 牙髓坏死

61. 婴儿男，出生5天，啼哭拒食，口腔黏膜出现微凸的软白小点，擦去后可露出出血面，拟诊

- A. 早萌乳牙
- B. 白斑
- C. 婴儿雪口
- D. 角化上皮珠
- E. 以上都不是

62. 患者女，37岁。诉牙齿自发性剧痛3天。有放射痛、夜间痛。口腔检查：患牙无明显龋损及其他牙体硬组织疾病，牙周袋深达根尖，温度刺激有激发痛，松动II°。叩诊(+)。可能的诊断是

- A. 急性牙周炎
- B. 急性牙龈炎
- C. 逆行性牙髓炎
- D. 急性根尖周炎
- E. 残髓炎

63. 患儿男，2岁7个月，家长发现患儿上前牙“发黑”，要求治疗，检查左右上 I 近中邻面浅龋。治疗一般采用

- A. 药物治疗
- B. 充填治疗
- C. 修复治疗
- D. 根管治疗
- E. 观察随诊

64. 患儿男，9岁。上颌前牙外伤8小时。口腔检查：右上1已萌出，松动 I°，叩痛(+)，牙齿纵向冠根折裂，舌侧呈游离状。处理方法是

- A. 结扎固定
- B. 根管治疗
- C. 一次性根管治疗后钉固位修复
- D. 拔除
- E. 拔除牙冠，保留牙根

65. 患者男，50岁。口腔腭部破溃疼痛1个月余。有反复发作史。口腔检查：软腭部1个大而深的溃疡，直径1.5cm，似弹坑状，周边红肿隆起但整齐，底部微凹，表面有假膜，可见腭垂有缺损。初步诊断为

- A. 癌性溃疡
- B. 结核性溃疡
- C. 创伤性溃疡
- D. 复发性重型阿弗他溃疡
- E. 坏死性涎腺化生

66. 患者男，55岁。右侧唇红部出现白色斑块1年求诊。无自觉症状。患者有烟酒嗜好。口腔检查：右侧唇红部可见一白色斑块，均质状，不能被擦去，涂片镜检3次未找到芽孢或菌丝。不恰当的处理是

- A. 停止吸烟

- B. 口服维生素 A
- C. 0.2%维甲酸局部涂擦
- D. 硝酸银局部处理白色斑块
- E. 定期随访，如出现恶变指征应立即切除

67. 患者男，55岁。半年来感到右上后牙咬合不适，常有自发痛，检查：右上6牙体完整，颊腭侧牙龈退缩2~3mm，探诊可探入根分叉部位，X线示根分叉区阴影，近远中牙槽嵴顶水平吸收1/2。应该采用的治疗方案是

- A. 根管治疗
- B. 牙周手术
- C. 洁治，根面平整
- D. 调牙合
- E. 以上都是

68. 患者女，26岁。右上后牙龈肿痛1周，口服消炎药治疗无效。检查：右上6颊侧牙周脓肿形成，叩诊(+)，冷测敏感，牙周袋8mm。应急处理应是

- A. 局麻下开髓
- B. 龈上洁治
- C. 龈下刮治
- D. 脓肿切开引流
- E. 药物治疗

69. 患者女，50岁。上唇肿胀，剧痛2天。体格检查：上唇中部见紫红色肿块，局部可见1个脓头，诊断为唇痈。该患者最危险的并发症是

- A. 眶下间隙感染
- B. 海绵窦血栓性静脉炎
- C. 败血病
- D. 高热
- E. 鼻旁脓肿

70. 患者男，16岁。右下后牙咬硬物时略感不适1年余。口腔检查：牙列整齐，牙周检查(-)，右下5叩诊(+)，颊侧牙龈有窦道，松动I°，牙体未见明显龋坏，合面可见圆形黑环。最可能的诊断是

- A. 隐匿龋
- B. 牙隐裂
- C. 牙周炎
- D. 畸形中央尖
- E. 合面过度磨损

71. 患者女，20岁。左侧上颌后牙自发性肿痛，吸吮时出血3天。4天前曾有过鱼刺刺伤史。口腔检查左上6、7牙间探诊疼痛明显，牙龈乳头红肿，叩诊(+)，无松动，未探及牙周袋。恰当的应急处理方法是

- A. 去除患牙牙石等刺激因素
- B. 3%过氧化氢溶液及生理盐水交替冲洗牙间乳头
- C. 局部敷以2%碘甘油
- D. 用0.2%氯己定溶液含漱
- E. 以上均是

72. 患者男，40岁。患牙有自发剧痛2天。松动I°，叩诊(+)。近中颊侧牙周袋7mm，温度刺激试验有激发痛。患牙应急处理后最佳治疗方案是

- A. 牙周治疗
- B. 牙髓治疗
- C. 拔除
- D. 牙周牙髓联合治疗
- E. 根管治疗

73. 男，5岁，腹痛、腹泻半个月，大便4~8次/天，便量多，为暗红色，有腥臭味，肉眼可见血液及黏液，患儿无发热，左下腹隐痛。大便镜检：WBC 10~15/HP，RBC满视野。该患者最可能的诊断为

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 疟疾
- C. 细菌性痢疾
- D. 肠伤寒和病肠出血
- E. 阿米巴痢疾

74. 患者男，60岁。因昏迷3小时入院，查体发现该患者口有腥臭味，轻度黄疸。实验室检查：尿蛋白（-），尿糖（-），白蛋白/球蛋白=3：4。首先考虑

- A. 肺性脑病
- B. 肝性脑病
- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. 尿毒症
- E. 药物中毒

75. 患儿男，12岁。1周前出现乏力、食欲不振，既往体健，经常食用街边小摊食物，查体发现该患者巩膜黄染，肝区触痛。实验室检查：ALT 1500U/L，血清总胆红素 $100 \mu\text{mol/L}$ 。此次发病最可能的原因是

- A. 甲型肝炎病毒感染
- B. 乙型肝炎病毒感染
- C. 丙型肝炎病毒感染
- D. 丁型肝炎病毒感染
- E. 戊型肝炎病毒感染

76. 女孩, 4岁。夏季突然发病, 高热4小时, T 39.5℃, 惊厥1次, 无呕吐、腹泻。病前有可疑不洁饮食病史。实验室检查 WBC $21.0 \times 10^9/L$, N 0.86。最可能的诊断是

- A. 中毒型细菌性痢疾
- B. 流行性乙型脑炎
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 热性惊厥
- E. 流行性脑脊髓膜炎

77. 患者女, 43岁, 2小时前因车祸后昏迷, 查体所见: 压眶可见睁眼反应, 刺激肢体有回缩躲避反应, 能回话, 但失去定向力。按 Glasgow 昏迷量表评分, 该评分为

- A. 10分
- B. 11分
- C. 12分
- D. 13分
- E. 14分

78. 医生问患者为什么住院了, 患者答道: “我有2个孩子, 红桃代表我的心, 你放开手, 是计算机病毒, 保养自己……”, 这种症状属于

- A. 思维奔逸
- B. 病理性赘述
- C. 刻板言语
- D. 持续言语
- E. 思维破裂

79. 患者女, 26岁, 在受到精神刺激后, 表现为类似一般儿童稚气的样子, 称自己才3岁, 逢人就叫叔叔、阿姨。这种症状表现属于

- A. 双重定向

- B. 精神发育迟滞
- C. 完全性痴呆
- D. 甘瑟综合征
- E. 童样痴呆

80. 女性，35岁。人工流产后5年未避孕不孕，妇科查体：宫体正常大小，双侧附件区压痛明显，可触及不规则片状物。此患者不孕的原因最可能是

- A. 排卵障碍
- B. 子宫内膜病变
- C. 盆腔结核
- D. 输卵管因素
- E. 卵巢囊肿

81. 不孕患者，32岁，已知基础体温呈单相型曲线，于月经来潮前7日取出宫颈黏液，其特征应为

- A. 量少、黏稠、混浊
- B. 量少、透明、稀薄
- C. 量多、透明、稀薄
- D. 量多、黏稠、混浊
- E. 量少、粘稠、可拉丝

82. 患者，女，30岁，婚后3年未避孕未孕，月经规律，男方检查正常，为明确不孕病因，接下来应先做哪项检查

- A. 卵巢功能检查
- B. 输卵管通畅试验
- C. 性交后试验
- D. 宫颈黏液、精液相合试验
- E. 腹腔镜检查

83. 女，6岁。8月中旬以“发热、腹泻3天，抽搐、意识不清4小时”为主诉入院。查体：BP 90/60mmHg，P 90次/分，T 39.5℃，意识不清，呼之不应，双侧瞳孔不等大，颈强，心肺未见异常。化验末梢血 WBC $20 \times 10^9/L$ ，N 85%，L 15%。该患儿应立即给予下列哪种药物治疗

- A. 甘露醇
- B. 多巴胺
- C. 头孢菌素
- D. 糖皮质激素
- E. 哥拉灌肠

84. 患儿女，4岁，来自农村。7月份因发热、头痛4天，伴呕吐、抽搐住院。体检：神志欠清，压眶有反应，双侧瞳孔4mm，对光反射存在，颈有阻力，心肺无异常，腹软，腹壁反射未引出，四肢肌张力较高，克氏征、布氏征、巴氏征均阳性。最可能的诊断是

- A. 中毒性菌痢
- B. 病毒性脑炎
- C. 结核性脑膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 化脓性脑膜炎

85. 13个月患儿，发热3天后右下肢活动障碍，当地农村有类似病史，该患儿生后未接种疫苗，体检：体温38.5℃，神志清，心肺正常，右下肢肌力I级，膝反射未引出，病理反射阴性，最大可能为

- A. 格林-巴利综合征
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 流行性乙型脑炎
- D. 脊髓灰质炎
- E. 坐骨神经炎

三、B

A. 原发性痛经

B. 继发性痛经

C. 无排卵性功血

D. 围绝经期综合征

E. 有排卵性功血

86. 生殖器官无器质性病变所致的痛经

87. 由子宫内膜异位症引发的痛经

A. 1岁之内患儿患化脑

B. 结核性脑膜炎

C. 脑膜炎双球菌脑炎

D. 新生儿化脓性脑膜炎

E. 脑炎链球菌性脑膜炎

88. 硬膜下积液

89. 面神经受损

90. 皮肤瘀斑，涂片检菌阳性

A. 单纯性肾病

B. 肾炎性肾病

C. 紫癜性肾病

D. 肾小管性酸中毒

E. IgA 肾病

91. 血尿、高血压可见于

92. 选择性蛋白尿可见于

93. 总补体及 C3 降低可见于

A. 喘憋为突出表现

B. 咳频，喘憋，发绀

- C. 常见猩红热样或荨麻疹样皮疹
 - D. 全身中毒症状明显，重者意识障碍甚至休克
 - E. 刺激性咳嗽为突出表现
94. 肺炎支原体肺炎
95. 葡萄球菌肺炎
96. 腺病毒肺炎
97. 呼吸道合胞病毒肺炎

- A. 腺病毒
 - B. 支原体
 - C. 呼吸道合胞病毒
 - D. 柯萨奇 A 病毒
 - E. 鼻病毒
98. 急性咽结膜热的病原是
99. 毛细支气管炎的病原是
100. 疱疹性咽峡炎的病原是

2022 年全科主治医师《相关专业知识》考前模考大赛（二）答案解析

一、A1

1. 【正确答案】 A

【答案解析】 直疝三角由腹壁下动脉构成外侧边，腹直肌外缘构成内侧边，腹股沟韧带构成底边。

2. 【正确答案】 D

【答案解析】 吸气性呼吸困难吸气显著困难，气道高度狭窄使呼吸肌极度紧张，出现胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙在吸气时明显凹陷，即三凹征。

3. 【正确答案】 D

【答案解析】 微循环缺血期又称休克早期、休克代偿期，此期微循环灌流特点是：少灌少流，灌少于流，组织呈缺血缺氧状态。

4. 【正确答案】 C

【答案解析】 充溢性尿失禁是由于下尿路有较严重的机械性（如前列腺增生）或功能性梗阻引起尿潴留，当膀胱内压上升到一定程度并超过尿道阻力时，尿液不断地自尿道中滴出，因此本题答案选 C。

5. 【正确答案】 D

【答案解析】 毒物被人体吸收后，通过血液分布于全身，主要在肝内经氧化、还原、水解或结合等作用进行代谢转化。大多数毒物经代谢后毒性降低，这是解毒过程；但也有少数毒物代谢后毒性反而增加，如对硫磷氧化后变为毒性大得多的对氧磷。

6. 【正确答案】 E

【答案解析】 鲜红色血性溢液多见于导管内乳头状瘤。

7. 【正确答案】 A

【答案解析】 吗啡可引起 Oddi 括约肌收缩，不宜应用。

8. 【正确答案】 B

【答案解析】 室早二联律一般出现在器质性心脏病患者中，而其他几类心律失常在正常人中均可出现。

9. 【正确答案】 A

【答案解析】 若几种情况同时出现，应首先抢救的是窒息。

10. 【正确答案】 E

【答案解析】 小的圆点状出血，色暗红，是视网膜深层出血，位于视网膜内核层与外丛状层间。

11. 【正确答案】 A

【答案解析】 老年抑郁症与老年性痴呆的主要鉴别点是痴呆。

12. 【正确答案】 E

【答案解析】 慢性纤维空洞性肺结核是肺结核的晚期类型，多系浸润肺结核发展恶化的结果。病程长，病情的好转与恶化，空洞的形成与纤维修补交替出现，病灶广泛纤维化。此类病人经常大量排菌，为社会的重要传染源。

13. 【正确答案】 B

【答案解析】 胎动减少是胎儿窘迫的重要指标，所以每日监测胎动能预知胎儿安危。胎动消失后，胎心在 24 小时内消失，胎动过频是胎动消失的前驱症状，应予重视。

14. 【正确答案】 B

【答案解析】 循证医学的证据中质量最高的是多个质量可靠的大样本随机对照试验所做的系统评价或 Meta 分析。

15. 【正确答案】 B

【答案解析】 脑出血可引起先昏迷后发热。

16. 【正确答案】 A

【答案解析】 无排卵型功能失调性子宫出血是由单一雌激素刺激而无孕酮对抗而引起的雌激素撤退性出血或突破出血。

17. 【正确答案】 B

【答案解析】 老年期抑郁是老年人常见的精神问题，以情绪低落或抑郁为首发症状，还表现出少言寡语、反应迟钝，躯体不适和自主神经紊乱，其中情绪抑郁、思维障碍是最主要的临床症状。

18. 【正确答案】 D

【答案解析】 卵巢卵泡膜细胞瘤是罕见的卵巢肿瘤，多为良性。其他均属于恶性肿瘤。

19. 【正确答案】 C

【答案解析】 扁桃体炎属于感染性咽痛的病因，所以答案选 C。

20. 【正确答案】 D

【答案解析】 急性化脓性中耳炎可出现星烁征。

21. 【正确答案】 C

【答案解析】 从病因学角度，龋病称为牙齿硬组织的细菌感染性疾病。

22. 【正确答案】 A

【答案解析】 根据黄疸病因可分为：溶血性黄疸、肝细胞性黄疸、梗阻性黄疸，所以答案选 A。

23. 【正确答案】 B

【答案解析】 系统性红斑狼疮性水肿不属于凹陷性全身性水肿。其他选项均属于凹陷性全身性水肿。

24. 【正确答案】 E

【答案解析】 该患者外阴痒、阴道分泌物增多，白带呈豆渣样，阴道粘膜红肿并附有白膜，应考虑外阴阴道假丝酵母菌病。

25. 【正确答案】 E

【答案解析】 躁狂发作患者睡眠障碍的特点是睡眠需要减少。

26. 【正确答案】 E

【答案解析】 艾滋病急性期通常发生在初次感染 HIV 后 2~4 周左右，临床主要表现为发热、咽痛、盗汗、恶心、呕吐、腹泻、皮疹、关节痛、淋巴结肿大及神经系统症状，故选择 E 项。

27. 【正确答案】 D

【答案解析】 系统性红斑狼疮的临床表现以皮疹常见，约 40% 患者有面部典型红斑称为蝶形红斑。急性期有水肿、色鲜红，略有毛细血管扩张及鳞片状脱屑，严重者小现水疱、溃疡、皮肤萎缩和色素沉着。手掌大小鱼际、指端及指(趾)甲周红斑，身体皮肤暴露部位有斑丘疹、紫斑等。

28. 【正确答案】 A

【答案解析】 视网膜血管硬化、脆弱、出血、纤维增生，最终导致视网膜脱离，视网膜病变是致盲的主要原因之一。

29. 【正确答案】 D

【答案解析】 诊断溶血性贫血最可靠的指标是红细胞寿命缩短。

30. 【正确答案】 D

【答案解析】 支原体肺炎治疗首选大环内酯类抗菌药物，如红霉素，罗红霉素和阿奇霉素。因肺炎支原体无细胞壁，青霉素或头孢菌素类等抗菌药物无效。

31. 【正确答案】 A

【答案解析】 卵巢巧克力囊肿容易破裂，不容易扭转。

32. 【正确答案】 E

【答案解析】 卵巢子宫内膜异位症约 80%患者病变累及一侧卵巢，双侧卵巢同时波及者约为 50%。

33. 【正确答案】 B

【答案解析】 卵巢子宫内膜异位症最多见，约 80%患者病变累及一侧卵巢。

34. 【正确答案】 B

【答案解析】 输卵管常与周围病变组织粘连。多系直肠子宫陷凹蔓延而来。

35. 【正确答案】 B

【答案解析】 子宫内膜异位症的发生与雌激素有关，故生育期妇女多见。

36. 【正确答案】 A

【答案解析】 子宫内膜异位症的发病为异位内膜随卵巢激素变化而发生的周期性出血。

37. 【正确答案】 B

【答案解析】 80%累及一侧卵巢。

38. 【正确答案】 D

【答案解析】 疼痛是内异症的主要症状，典型症状为继发性痛经、进行性加重。疼痛多位于下腹、腰骶及盆腔中部，有时可放射至会阴部、肛门及大腿，常于月经来潮时出现，并持续至整个经期。少数患者可表现为持续性下腹痛，经期加剧。但有 27%~40%患者无痛经，因此痛经不是内异症诊断的必需症状。15%~30%患者有经量增多、经期延长或月经淋漓不尽或经前期点滴出血。

39. 【正确答案】 D

【答案解析】 子宫内膜异位症一般见于生育年龄妇女，以 25~45 岁妇女多见。生育少、生育晚的女性发病明显多于多生育者，近年来发病率明显上升趋势，

与社会经济状况呈正相关，与剖宫产率增高，人工流产与宫腹腔镜操作增多有关。临床表现常见有痛经、慢性盆腔痛、性交痛、月经异常和不孕。但有部分患者无痛经，因此痛经不是内异症诊断的必需症状。

40. 【正确答案】 C

【答案解析】 卵巢子宫内膜异位症最多见，约 80% 患者病变累及一侧卵巢，双侧卵巢同时累及者约为 50%。

41. 【正确答案】 B

【答案解析】 腹腔镜检查是目前国际公认的子宫内膜异位症诊断的最佳方法。在腹腔镜下见到大体病理所述典型病灶，诊断可基本成立，术中所见亦是临床分期的重要依据。腹腔镜也是治疗子宫内膜异位症最常用的方法。

42. 【正确答案】 D

【答案解析】 腹腔镜检查是目前国际公认的子宫内异位症诊断的最佳方法。

43. 【正确答案】 D

【答案解析】 疼痛是内异症的主要症状，典型症状为继发性痛经、进行性加重。

44. 【正确答案】 C

【答案解析】 盆腔炎药物治疗，病情改善后，也应巩固治疗 10~14 天。

45. 【正确答案】 D

【答案解析】 盆腔炎性疾病的手术治疗指征：①药物治疗 48~72 小时，体温不降、症状加重、包块增大者；②输卵管积脓或输卵管卵巢脓肿；③脓肿破裂。

二、A2

46. 【正确答案】 A

【答案解析】 粪便一般性状检查是临床最常用的检验之一，可初步了解消化系统有无炎症、出血、寄生虫感染，以及间接判定胃肠、胰腺、肝胆的功能状况。

47. 【正确答案】 C

【答案解析】 脱水性质：根据脱水时血浆渗透压（主要是血钠浓度）的高低，可分为等渗性脱水、低渗性脱水、高渗性脱水。

48. 【正确答案】 D

【答案解析】 对诊断中毒性痢疾最有帮助的是便常规及培养。

49. 【正确答案】 C

【答案解析】 低钾血症心电图示 T 波改变、ST 段下降，T 波低平，出现 U 波。

50. 【正确答案】 A

【答案解析】 对于健康儿童突然出现原因不明的阵发性哭闹、腹痛、呕吐，发作典型症状，间歇发作，渐进性加剧。腹部包块及随病程建站而出现血便，应高度怀疑本病。肠套叠典型表现是腹痛、腹部包块、果酱样血便。

51. 【正确答案】 C

【答案解析】 空气灌肠适应证：发病在 48 小时之内；全身状况良好；无腹胀。

52. 【正确答案】 E

【答案解析】 肠套叠是小儿肠梗阻的常见病因，肠套叠的三大典型临床症状是腹痛、血便和腹部肿块。

53. 【正确答案】 C

【答案解析】 当患儿出现阵发性哭闹不安、呕吐、果酱样血便，腹部检查触到腊肠样包块时，即可确定诊断肠套叠。

54. 【正确答案】 E

【答案解析】 患儿急性起病，水肿、肉眼血尿、血压偏高，有呼吸道感染史，尿常规符合急性肾炎的表现；尿蛋白（++），不符合肾病综合征大量蛋白尿的表现；既往无血尿史，无反复发作的表现，不符合 IgA 肾病；目前无发热、腰酸、腰痛，以血尿为主，尿白细胞大于 10/HP，不应考虑肾盂肾炎；患儿为男性，无多系统损害表现，不应考虑狼疮性肾炎。

55. 【正确答案】 D

【答案解析】 急性肾炎由于水、钠潴留，血容量增多，导致高血压，当血压骤升，超过脑血管代偿机制可出现脑水肿，出现头痛、呕吐、惊厥等症状；急性肾衰竭主要表现为无尿、高血钾等电解质紊乱症状；心力衰竭主要表现为气急、端坐呼吸、心率加快、咳嗽、吐粉红色泡沫痰；癫痫发作前一般无头痛、呕吐；患儿无发热及各种感染的征象，败血症的诊断无依据。

56. 【正确答案】 B

【答案解析】 急性肾小球肾炎光镜下肾小球是弥漫性毛细血管内增生性肾炎病变。

57. 【正确答案】 C

【答案解析】 为毛细血管内增生性肾小球肾炎。其特征是光镜下内皮、系膜细胞弥漫增生，中性粒细胞浸润；免疫荧光可见 IgG 及 C3 呈粗颗粒状沿毛细血管壁、系膜区沉积；电镜可见肾小球上皮细胞下有驼峰状大块电子致密物沉积。

58. 【正确答案】 E

【答案解析】 急性肾小球肾炎尿液检查尿红细胞增多，多为肾小球源性血尿，尿蛋白多为+~+++，可见多种管型，在疾病早期可有较多的白细胞和上皮细胞，并非感染所致。

59. 【正确答案】 A

【答案解析】川崎病大中小动脉均可累及，中等动脉尤以冠状动脉病变最严重，冠状动脉损害多发生于病程第2~4周，但也可发生于疾病恢复期。心肌梗死和冠状动脉瘤破裂可致心源性休克，甚至猝死。

60. 【正确答案】 B

【答案解析】慢性根尖周肉芽肿的根尖部有圆形的透射影像，边界清晰，周围骨质正常或稍显致密。透影区范围较小，直径一般不超过1cm。

61. 【正确答案】 C

【答案解析】雪口病，白念菌病，是由真菌传染，在黏膜表面形成白色斑膜的疾病，多见于婴幼儿。本病是白色念珠菌感染所引起。口腔黏膜出现乳白色，微高起斑膜，周围无炎症反应，形似奶块，无痛，擦去斑膜后，可见下方不出血的红色创面，斑膜面积大小不等，可出现在舌，颊，腭或唇内黏膜上。

62. 【正确答案】 C

【答案解析】逆行性牙髓炎是临床比较常见的。由于牙周袋内的细菌、毒素通过根尖孔或近根尖孔处的根管侧支进入牙髓，先引进近根尖处的牙髓充血和发炎，以后，局限的慢性牙髓炎可急性发作，表现为剧烈的自发痛等典型急性牙髓炎症状。临床检查时可见患牙有深达根尖区的牙周袋或严重的牙龈退缩，牙齿一般松动达Ⅱ度以上。牙髓有明显的激发痛等。

63. 【正确答案】 A

【答案解析】根据患儿年龄、患牙牙位以及龋齿的程度，宜采用药物治疗。

64. 【正确答案】 D

【答案解析】患牙已发生纵向冠根折，舌侧呈游离状，无保留价值，拔除患牙为最佳方式。

65. 【正确答案】 D

【答案解析】 重型阿弗他溃疡又称复发性坏死性黏膜腺周围炎、腺周口疮，该病占8%~10%，通常为单个溃疡，直径可达1~2cm。溃疡深而大，紫红色或暗红色，边缘隆起但不规则，伴有发热、淋巴结肿大。特点：早期发生在口角内侧，以后逐渐向后移动、发展。溃疡愈合慢，长达几个月，愈合后留下瘢痕。

66. 【正确答案】 D

【答案解析】 因为硝酸银对组织有腐蚀作用，用其局部处理白色斑块会造成局部组织的缺损。

67. 【正确答案】 E

【答案解析】 该诊断为中度牙周炎，存在根分叉病变，需进行牙周基础治疗以及牙周手术治疗，术后定期维护。

68. 【正确答案】 D

【答案解析】 牙周脓肿应急处理是切开排脓。

69. 【正确答案】 B

【答案解析】 该感染发生于口腔“危险三角区”，感染扩散易发生海绵窦血栓性静脉炎。

70. 【正确答案】 D

【答案解析】 畸形中央尖系牙体发育畸形之一，多见于下颌第二前磨牙，偶见于上颌前磨牙，在颌面颊舌尖中间突出一圆锥状尖锐的额外尖，其内有牙髓伸入，很易折断而继发牙髓和根尖周病。

71. 【正确答案】 E

【答案解析】 急性龈乳头炎局部处理应除去邻面的牙石、菌斑、食物残渣等。用1%~3%过氧化氢液冲洗牙间隙，然后敷以碘甘油等，炎症能很快消退。急性

症状消退后，应消除病因，如修改不良修复体，充填邻面龋洞等。在口腔临床的各种治疗中应注意防止对龈乳头的刺激。

72. 【正确答案】 D

【答案解析】 患牙附着丧失，为牙周病变，同时存在自发痛、湿度刺激痛等牙髓症状，考虑为牙周牙髓联合病变，最佳治疗方案为牙周牙髓联合治疗。

73. 【正确答案】 E

【答案解析】 急性阿米巴痢疾呈散发，起病缓慢，少有发热，无里急后重，大便次数少、量中等，为暗红色果酱样粪便，有腐败腥臭味。粪便镜检红细胞成堆，白细胞少，可找到溶组织阿米巴滋养体或包囊。

74. 【正确答案】 B

【答案解析】 患者轻度黄疸，白蛋白/球蛋白倒置（正常为 1.5~2.5: 1），提示长期肝功能受损，突然发生昏迷，首先考虑肝性脑病。

75. 【正确答案】 A

【答案解析】 甲型肝炎病毒主要通过粪-口途径传播，多见于儿童，常表现为急性肝炎。而乙型、丙型、丁型肝炎病毒主要通过血液传播，戊型肝炎多见于成人。

76. 【正确答案】 A

【答案解析】 中毒型细菌性痢疾起病急骤，突发高热、病情严重，迅速恶化并出现惊厥、昏迷和休克。多见于 2~7 岁儿童。

77. 【正确答案】 A

【答案解析】 Glasgow 昏迷量表评分：压眶睁眼 2 分，刺激肢体有回缩躲避反应 4 分，能回话但失去定向力 4 分。

78. 【正确答案】 E

【答案解析】 思维破裂表现为患者的言语或书写内容有结构完整的句子，但各句含义互不相关，变成语句堆积，整段内容令人不能理解。严重时，言语支离破碎，个别词句之间也缺乏联系，成了语词杂拌。

79. 【正确答案】 E

【答案解析】 童样痴呆以行为幼稚、模拟幼儿的言行为特征，常见于癔症。

80. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据题干可以判断病变原因在输卵管。

81. 【正确答案】 C

【答案解析】 基础体温呈双相型说明有排卵，呈单相型无排卵。

82. 【正确答案】 B

【答案解析】 月经规律不考虑卵巢因素。先考虑输卵管因素，所以先做输卵管通畅试验。

83. 【正确答案】 A

【答案解析】 患儿夏季发病，发热，有明显的神经系统症状和体征，考虑乙脑，双侧瞳孔不等大，抽搐，意识不清，出现脑疝，应给予脱水剂。

84. 【正确答案】 D

【答案解析】 7月下旬发病，起病急，病程3天后出现明显神经系统症状及病理反射阳性，结合脑脊液改变应考虑为乙脑。由于乙脑早期外周血象白细胞可升高，且以中性粒细胞为主，因此要排除细菌感染。化脓性脑膜炎脑脊液细胞数及蛋白应明显升高，糖、氯化物降低；流行性脑脊髓膜炎发病季节为冬春季，且临床特点为皮肤瘀点、瘀斑，脑脊液化脓性改变；结核性脑膜炎起病缓慢，

脑脊液生化改变蛋白升高明显，糖、氯化物降低明显；细胞分类以单核细胞为主；中毒性痢疾起病更急，多伴有休克表现及消化道症状。

85. 【正确答案】 D

【答案解析】 脊髓灰质炎又名小儿麻痹症，是由脊髓灰质炎病毒引起的一种急性传染病。临床表现主要有发热、咽痛和肢体疼痛，部分病人可发生弛缓性麻痹。流行时以隐匿感染和无瘫痪病例为多，儿童发病较成人为高，普种疫苗前尤以婴幼儿患病为多，故又称小儿麻痹症。格林-巴利综合征起病前1~6周可有前驱感染史，多为非特异性病毒感染。绝大多数急性起病。主要症状是肌肉无力，常从双下肢开始，2~3天内发展到上肢及躯干，1周左右达高峰。

三、B

86. 【正确答案】 A

【答案解析】 原发性痛经是指生殖器官无器质性病变所致的痛经。

87. 【正确答案】 B

【答案解析】 继发性痛经指由于盆腔器质性疾病如子宫内膜异位症、盆腔炎等所引起的痛经。

88. 【正确答案】 A

89. 【正确答案】 B

90. 【正确答案】 C

【答案解析】 结核性脑膜炎：颅底炎性渗出物的刺激、粘连、压迫，可致脑神经损害，以动眼、外展、面和视神经最易受累，表现视力减退、复视和面神经麻痹等。脑膜炎球菌性脑膜炎是由脑膜炎球菌引起的化脓性脑膜炎。致病菌由鼻咽部侵入血循环，最后局限于脑膜和脊髓膜，形成化脓性脑脊髓膜病变。主

要临床表现为突起发热、头痛、呕吐、皮肤有瘀斑、瘀点及颈项强直等脑膜刺激征。

91. 【正确答案】 B

92. 【正确答案】 A

93. 【正确答案】 B

【答案解析】 紫癜性肾炎，又称过敏性紫癜性肾炎。临床表现除有皮肤紫癜、关节肿痛、腹痛、便血外，主要为血尿和蛋白尿。IgA 肾病是最为常见的一种原发性肾小球疾病，是指肾小球系膜区以 IgA 或 IgA 沉积为主。

94. 【正确答案】 E

95. 【正确答案】 D

96. 【正确答案】 B

97. 【正确答案】 A

【答案解析】 肺炎支原体肺炎：主要表现为刺激性干咳。金黄色葡萄球菌往往会引起败血症，其临床特点起病急、病情严重、进展快，全身中毒症状明显。腺病毒肺炎主要呼吸道症状：咳嗽频繁，呈阵发性喘憋，轻重不等的呼吸困难和发绀。呼吸道合胞病毒肺炎主要表现为发热、呼吸困难等症状。

98. 【正确答案】 A

99. 【正确答案】 C

100. 【正确答案】 D

【答案解析】 咽结合膜热是腺病毒 3, 4, 7 引起的一种表现为急性滤泡性结膜炎伴有上呼吸道感染和发热的病毒性结膜炎。毛细支气管炎主要由呼吸道合胞病

毒引起，副流感病毒、腺病毒、肺炎支原体也可引起本病。疱疹性咽峡炎主要由病原肠道病毒 71 型和柯萨奇病毒 A16 型引起。



正保医学教育网

www.med66.com