

医学教育网口腔主治医师：《答疑周刊》2024年第07期

问题索引：

1. 抽样调查中，哪个概念表示抽样误差的大小？
2. 棘层内疱有什么病理表现？
3. 口腔软组织最常见的继发性结核损害是？
4. 翻瓣术手术纵形切口一般位于哪个位置？

具体解答：

1. 抽样调查中，哪个概念表示抽样误差的大小？

下列哪项能够表示抽样误差的大小

- A. 构成比
- B. 率
- C. 可信区间
- D. 标准差
- E. 标准误

【答案】E

【解析】抽样调查中，[医学教育网原创]使样本均数（或率）与总体均数（或率）之间出现差别的重要原因之一是存在抽样误差。标准误是用来表示抽样误差的大小。

2. 棘层内疱有什么病理表现？

疱在上皮的棘层内或在基底层之上，有棘层松解，为以下哪种病理表现

- A. 基层下疱
- B. 棘层松解
- C. 角化不良
- D. 异常增生
- E. 棘层内疱

【答案】E

【解析】棘层内疱：[医学教育网原创]疱在上皮的棘层内或在基底层之上，

有棘层松解，上皮细胞失去黏附力而彼此分离。见于天疱疮，也见于病毒性水疱。

3. 口腔软组织最常见的继发性结核损害是？

口腔软组织最常见的继发性结核损害是

- A. 结核初疮
- B. 结核性溃疡
- C. 寻常狼疮
- D. 感染性肉芽肿
- E. 硬化性肉芽肿

【答案】 B

【解析】 口腔软组织最常见的继发性结核损害是结核性溃疡[医学教育网原创]。

4. 翻瓣术手术纵形切口一般位于哪个位置？

翻瓣术手术纵形切口应位于

- A. 龈乳头中央
- B. 颊面中央
- C. 舌腭侧中央
- D. 颊面轴角处
- E. 以上均可

【答案】 D

【解析】 [医学教育网原创] 纵行切口也称垂直切口，是为了减小组织张力、更好地暴露术区。纵切口的位置应在术区近、远中侧比较健康的牙龈组织上，位于牙的颊面轴角处，一般将龈乳头包括在龈瓣内，以利于术后缝合。切忌在龈乳头中央、或颊面中央处作纵切口，以防止影响愈合，也尽量避免在舌腭侧作纵切口，因可能会伤及血管、神经，出血多、或影响愈合。