

医学教育网内科主治医师:《答疑周刊》2024年第8期

消化内科学在内科主治医师考试中占分比例是非常高的,要求的内容也比较繁杂,今天一起来复习几个消化道出血的知识点。

问题索引:

1. 上消化道出血的界线是什么?
2. 在补液与尿量足够时,上消化道出血患者血尿素氮持续升高提示什么?
3. 急性胃炎出血之后什么时候做胃镜检查?

具体解答:

1. 上消化道出血的界线是什么?

上消化道出血部位是

- A. 贲门以上出血
- B. 幽门以上出血
- C. Trietz 韧带以上出血
- D. 空回肠交界处以上出血
- E. 回盲部以上出血

【答案】C

【解析】上消化道出血是指屈氏韧带以上的消化道,包括食管、胃、十二指肠或胰胆等病变引起的出血。所以应该是以 Trietz 为界。[医学教育网原创]

2. 在补液与尿量足够时,上消化道出血患者血尿素氮持续升高提示什么?

在补液与尿量足够时,上消化道出血患者血尿素氮持续升高提示

- A. 急性肾功能不全
- B. 持续出血
- C. 肝肾综合征
- D. 心功能不全
- E. 既往有慢性肾功能不全

【答案】B

【解析】下列情况应考虑有消化道活动性出血,反复出血或黑粪(血便)次数增多、粪质稀薄、肠鸣音活跃;[医学教育网原创]周围循环状态经充分补液及输血后未

见明显改善，或虽暂时好转而又继续恶化；血红蛋白浓度、红细胞计数与血细胞比容继续下降，网织红细胞计数持续增高；补液与尿量足够的情况下，血尿素氮持续或再次增高。

### 3. 急性胃炎出血之后什么时候做胃镜检查？

急性胃炎的急诊胃镜检查应在上消化道出血后

- A. 一周内进行
- B. 5 天内进行
- C. 4 天内进行
- D. 3 天内进行
- E. 1~2 天内进行

【答案】E

【解析】强调急诊内镜检查宜在出血发生后 24~48 小时内进行，因某些病变（特别是 NSAIDs 或乙醇）引起者可在短期内消失，延迟胃镜检查可能无法确定出血病因。[医学教育网原创]