

医学教育网口腔主治医师：《答疑周刊》2024年第11期

问题索引：

1. 奶瓶龋好发于哪个牙位？
2. 后牙（牙合）运循环中形成的几类杠杆？
3. 口腔颌面部淋巴结检查时有什么顺序要求？
4. 临床检查牙隐裂不明显时，可以借助哪些方法辅助检查？

具体解答：

1. 奶瓶龋好发于哪个牙位？

奶瓶龋最常见于

- A. 上颌乳切牙
- B. 下颌乳切牙
- C. 上颌乳磨牙
- D. 下颌乳磨牙
- E. 全部乳牙

【答案】A

【解析】喂养龋：由于不良喂养习惯引起的早期广泛性龋齿，如含奶瓶入睡，睡前喝奶后不刷牙，[医学教育网原创]牙齿萌出后夜间喝奶，延长母乳和奶瓶喂养时间，过多进食含糖饮料饮食等。表现为好发于上颌切牙的唇面，而在下颌切牙却无龋齿，也称奶瓶龋。

2. 后牙（牙合）运循环中形成的几类杠杆？

后牙（牙合）运循环中生物力学杠杆作用，可形成

- A. 第 I 类杠杆
- B. 第 II 类杠杆
- C. 第 III 类杠杆
- D. 第 IV 类杠杆
- E. 第 V 类杠杆

【答案】B

【解析】在后牙（牙合）运循环中非工作侧髁突虽向工作侧移动，但仍为翼外肌、颞肌、舌骨上下肌群所稳定，[医学教育网原创]作为支点，工作侧的升颌肌群以咬肌与翼内肌收缩为力点，研磨食物处为重点，构成第Ⅱ类杠杆。

3. 口腔颌面部淋巴结检查时有什么顺序要求？

淋巴结检查的正确顺序应是

- A. 枕部、耳后、耳前、腮腺、颊、颌下、颏下
- B. 腮腺、颊、颌下、颏下、枕部、耳后、耳前
- C. 颌下、颏下、枕部、耳后、耳前、腮腺、颊
- D. 耳后、耳前、腮腺、颊、颌下、颏下、枕部
- E. 颊、颌下、颏下、枕部、耳后、耳前、腮腺

【答案】A

【解析】检查者手指紧贴检查部位，按一定顺序，由浅入深，滑动触诊。一般的顺序为：枕部、耳后、耳前、[医学教育网原创]腮腺、颊、颌下、颏下；顺胸锁乳突肌前后缘、颈前后三角、直至锁骨上凹，仔细检查颈深、浅淋巴结，颈部淋巴结的所在部位和引流方向。

4. 临床检查牙隐裂不明显时，可以借助哪些方法辅助检查？

牙隐裂隐裂线不明显时常采用的检查方法

- A. 咬诊
- B. 电活力检测
- C. 碘酊染色
- D. 探诊
- E. 冷热诊

【答案】C

【解析】咬诊、探诊、[医学教育网原创]染色法、透照法均可用于隐裂牙的检查。2.5%碘酊或其他染料类药物使牙面裂纹清晰可见。对无症状隐裂牙也能检查出来。